Carl von Linnés

Ungdomsskrifter

KALMAR STADSBIBLIOTEK
STIFTS- OCH GYMNASIEBIBLIOTEKET

ark. linné- bygda

KALMAR
STADSBIBLIOTEK

CARL VON LINNÉS
UNGDOMSSKRIFTER

SAMLADE

AF

EWALD ÄHRLING

OCH EFTER HANS DÖD

MED STATSUNDERSTÖD UTGIFNA

AF

K. VETENSKAPS-AKADEMIEN.

FÖRSTA SERIEN.

STOCKHOLM.
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

KALMAR
STADSBIBLIOTEK

N:o 1090.

m lf

Plac.
skifts - o. gymn. bibl.
(maj 1991)

STOCKHOLM 1888.
KONGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.

STADSBIBLIOTEK

Sedan D:r Ewald Ährling hade utgifvit och kommenterat en följd af arbeten från Linnés mognare ålder, fortsatte han sin lefnads uppgift med att samla vår store landsmans outgifna ungdomsskrifter. Han kopierade så många han lyckades öfverkomma här hemma och blef genom frikostigt understöd af Stiftelsen »Lars Hjertas Minne» satt i tillfälle, att under sommaren 1881 i Linnean Society's bibliotek i London taga en mängd fullständiga afskrifter af der förvarade originalmanuskript af Linné. Den mest svårlästa och omfångsrika af alla, »Iter Lapponicum», medhans dock icke, men kopierades af Ährling under sommaren 1882 på Vetenskaps-Akademiens bibliotek, hvarest Linnean Society välvilligt deponerat originalhandskriften, att af honom begagnas. Till offentliggörandet af alla dessa arbeten bereddes utväg 1884, då Riksdagen, på motion af sin ledamot af andra kammaren, D:r Ljungman, för det ändamålet beviljade ett anslag af 6,000 kronor. Denna summa ställdes till K. M:ts förfogande och K. Vetenskaps-Akademien fick befallning att inkomma med förslag till användandet. Hvad hon föreslog gillades och D:r Ährling fick i enlighet dermed uppdrag att under Akademiens inseende utföra arbetet. Förberedelserna till tryckningen började efter en af Ährling uppgjord och af Akademiens komitterade gillad plan. Men det blef icke D:r Ährling förunnadt, att redigera mer än de sju första tryckta arken af här föreliggande del. Efter hans död har tryckningen fortsatts i två serier, den första, nu färdiga, efter Ährlings afskrifter utgifven af Läroverksadjunkten D:r M. B. Swederus och den andra under utgifning af en af Vetenskaps-Akademiens komitterade Prof. G. Lindström.

Den första serien innehåller:

1. En sjelfbiografi af Linné, gående till år 1734, efter egenhändiga handskriften hos Linnean Society.
2. En förteckning öfver Skånes sällsyntare växter, författad 1728. Originalet på Leufsta bibliotek.
3. Spolia botanica, år 1729, hos Linnean Society.
4. Hortus Uplandicus efter Tourneforts System, hos Linnean Society.
5. Hortus Uplandicus efter Tourneforts System med tillägg och en ny indelning af Umbellatæ. 1730. Leufsta bibliotek.

6. Hortus Uplandicus efter egen method, sexualsystemet. 1731. Originalet eges af Kyrkoherden J. Johanson i Ifvetofta och af honom benäget meddeladt.
7. Adonis Uplandicus efter sexualsystemet. 1731. Leufsta bibliotek.

Den andra serien kommer att upptaga:

1. Iter Lapponicum 1732, nära 13 tryckta ark.
2. Iter ad Fodinas 1733, nära 2 ark.
3. Iter Dalekarlicum 1734, ungefär 10 tryckark.
4. Iter ad Exteros, 1735, ungefär 2 ark, dessa samtligen ur Linnean Society's bibliotek.

Johan Erik Ewald Ähring föddes i Stockholm den 18 September 1837. Fadern, Gustaf Erik Ähring, var då komminister i Maria församling derstädes och blef sedan kyrkoherde i Huddinge och Brännkyrka församling af Strengnäs stift 1840—63. — Modern, Maria Josephina Augusta Åbom, † 1870. — Redan i sin tidiga barndom visade Ähring afgjord håg för botanik, hvartill sannolikt en af hans lärare, D:r C. C. Ljunggren, gaf väckelse. Sin första skolundervisning åtnjöt han i Stockholm och afgick från Stockholms gymnasium till Upsala, der han blef student den 26 Maj 1856. I Juni—Aug. år 1858 företog han sin första, längre botaniska färd till Medelpads och Ångermanlands ådalar, med understöd af Botaniska Reseföreningen. Han erhöll 1859 det Kniggeska resestipendiet, samt understöd af Vetenskaps-Akademien och af sin högt vördade lärare, Prof. E. Fries, för en resa till Luleå Lappmarks högfjäll. Från 1863 till 1867 var han Amanuens vid Upsala Universitets Botaniska Trädgård. Af sina landsmän af Södermanlands och Nerikes Nation hedrades han med förtroendet att vara en af deras Curatorer. Philosophiæ Candidat blef han 1867 och utnämndes 1868 till Collega vid Elementarläroverket i Arboga. Till Philosophiæ Doctor promoverades han 1872. Han deltog i Skandinaviska Naturforskaremötena i Stockholm 1880 och i Christiania 1886. Efter några månaders sjukdom afled Ähring den 5 April 1888, efterlemnande maka, Anna Kindeström, och tre barn.

Att med elementarlärarens tunga kall — ännu på sista tiden med tjugoåtta timmars tjenstgöring i veckan — hafva förenat forskarens nit, hedrar hans minne och vittnar om den ifver, som eldade hela hans sträfvande och hvilken visserligen hejdades, när sjukdomen drabbade honom, men slocknade först med lifvet. När en gång den tiden kommer, då Linnés verksamhet blir skildrad fullständigare än hittills, skola de arbeten och mödor Ähring nedlagt dels i tryckta, dels i ännu outgifna, rikhaltiga anteckningar, komma till nytta och

långt efter hans bortgång gagna den sak, för hvilken han under de aderton sista åren af sitt lif offrat så mycket af helsa och krafter.

Hans af trycket utgifna arbeten äro följande:

1872. Studier i den Linneanska nomenclaturen och synonymiken. XVI + 49 sid. Örebro. Gradual disputat. 8:o.

1873. Caroli Linnæi Opera hactenus inedita. Flora Dalecarlica etc. Orebroæ. 130 sid. 8:o. På Ährlings förlag.

1878. Några af de i Sverige befintliga Linnéanska handskrifterna, kritiskt skärskådade. 28 sid. 8:o. Lund. Disp.

1878—79. Carl von Linnés Svenska Arbeten i urval och med noter utgifna. Första bandet. Bref till Svenskar, I. 471 sidor. 8:o. Stockholm. Ad. Bonnier.

1885. Carl von Linnés Brefvexling. Förteckning upprättad af E. Ährling och tryckt på K. Vetenskaps-Akademiens bekostnad. XVIII + 111 sid. Stockholm. 8:o.

1888. (posthumt) Carl von Linnés Ungdomsskrifter, samlade af E. Ährling och efter hans död med statsunderstöd utgifna af K. Vetenskaps-Akademien. Första serien, första häftet, 105 sid. Stockholm. 8:o.

Sidorna 88—105 kommentarier af Ährling och dessutom texten med talrika noter af honom.

I »Nordisk Familjebok» artiklarne:

Linné, Karl von, d. ä. och d. y., Linnéiska samlingarna, Linnéska institutet, Linnéiska samfundet, Linnean Society.

Vid Naturforskaremötet 1880 höll Ährling föredrag om Linnés brefvexling (Förh. p. 438, endast titeln), samt anförande i öfverläggningen om naturhistorien vid skolorna, l. c. p. 460—462. Vid mötet 1886 höll han föredrag om Linnés Samlingar i London (Forhandl. p. 87, endast titeln).

Innehåll.

	Sid.
Vita Caroli Linnæi	1.
Förklaringar	17.
Catalogus Plantarum rariorum Scaniæ & Smolandiæ	27.
Herbæ Scanenses	29.
Herbæ Smolandiæ propriæ	41.
Spolia botanica C. Linnæi	53.
Plantæ Smolandicæ	60.
Plantæ Scanenses	67.
Plantæ Roslagicæ	76.
Förklaringar och Anmärkningar	88.
Hortus Uplandicus, methodo Tournefortiana	107.
Hortus Uplandicus, meth. Tournef., nec non nova divisione Umbellatarum	151.
Hortus Uplandicus, secundum methodum propriam	205.
Adonis Uplandicus	271.

VITA
CAROLI LINNÆI

ENS ENTIUM MISERERE MEI!

I detta werldenes lius uplyfte jag förste gång mina ögon i Råshult, Stenbrohults sochn, Allbo härad, Kronobergs län, Småland och Swerige, natten emällan d. **12** och **13 Maj** h. 1 nocte **1707, 22 & 23 Maj st. n.** Född af fadren då Comminister i Stenbrohults församling Hr Nicolaus Linnæus [1] och modren Christina Brodersonia [2] primvia 18 genar. [primæva, 18 annorum generatrix?] Är altså aflad **5 à 6 Aug. 1706, 15 à 16 st. n.** Hwilka sedan läto mig döpas [3] i Stenbrohults kyrkia af Pastore Hr Samuel Brodersonio [4] **19 Maj.** Blef sedan flot till Stenbrohults Prästegård,[5] **1709,** då min fader

---

Originalet till denna uppsats, allt igenom egenhändigt af Carolus Linnæus, eges nu af Linnean Society i London och förvaras i dess arkiv. Det är inhäftadt i slutet af eller sammanbundet med ett interfolieradt och med många egenh. anteckningar af Linnæus försedt exemplar utaf Johannis Scheuchzeri Operis Agrostographici Idæa seu Graminum, Juncorum, Cyperorum, Cyperoideum iisque affinium Methodus Tiguri Typis Bodmerianis CIↃIↃCCXIX 8:vo min., med påskrift nederst på sjelfva titelbladet: Carl Linnæus Upsal: 1728 ℈j ʒvj (= 1 dl:r 6 öre silfver:m i inköp).

Handskriften innehåller 13 tätt skrifna sidor. Anteckningarne torde hafva börjats efter 1730 (jfr noten 7), hvaraf ock förklaras, att en och annan uppgift ur minnet ej kunnat blifva fullt noggrann; några senare tillägg hafva ock gjorts, att döma efter olika stil och bläck, såsom: Budæi å p. 4, integumenta universalia p. 5 samt Olof Fridrick, Alexander och Adolph Rudb. p. 8.

Då Linnæus vid dagbokens upprättande framhållit år, månader och dagar genom att ställa dem på sida om texten, har för utrymmes vinnande så kallade feta typer här användts. — De smärre siffrorna hänvisa till utgifvarens anmärkningar, hvilka återfinnas vid sjelfbiografiens slut.

där blef Pastor. Hwaräst jag sedan en tijd war upfostrad. Äntel. bekom privat Præceptor JEAN TELANDER,[6] **15 Febr. 1714**, hvilken mig hemma informerade till hösten. Då jag honom följde till Wexiö **Sept.** att af hans privata information blifwa underwist, men ombyttes **1717** för Gymnasisten GAB. HÖÖK,[7] nu magister och *swåger*. — Wadt omsider introducerat i Wexiö schola af Rect: Mag: Mag: KIELLBERG[8] uti nedra älr uti *3:ia classe*, Christi himmelsfärdsdag **1716.** Uti *3:ia classe* informerades jag 2 åhr af Hr BERO LEMNORIN[9] tills jag blef transfererad **1718.** Uti *2:da classe* 1 åhr af Hr HAMN,[10] och 1 åhr af Hr LEMNORIN till **1720.** Uti *1 classe* 1 åhr af Hr JACOB HAMN till **1721.** Uti *nedre ringen* 1 åhr och *öfre ringen* 1 åhr af Rect: Mag: DANIEL LANNERO[11] och Conrectore Mag: LAURENT: ODELIN[12] till **1723.** Änteligen transfererades på *Gymnasium*[13] **1723** under då warande fölliande Lectores: Doct: JOHAN ROTHMAN[14] Physices et Logices. Mag: MAGN: HIELMGREN[15] Primarius Theologiæ. Mag: JACOB FLACKSENIUS[16] Secundus Theologiæ. Mag: PETRUS HYLLENGREN[17] Græcus et p: t: Rector. Mag: NICOL: COLLIANDER[18] Mathematices. Mag: PETRUS FLODERUS[19] Historiarum et Moralium. Mag: NICOL: KROK[20] Eloqvent: et Poëseos. Blef flott till *nedre ringen* **1724** hwaräst jag war 1 åhr, till dess jag åhret äfter **1725** kom till *öfre ringen*, hwaräst jag wäntade twänne åhr. Och äfter som jag alla mina dagar hade haft ett särdeles nöje för Botaniken, begynte jag att något tänka på Medicinen, h:kn föll mig icke mindre fägnesam, ty ärhölt jag af mina föräldrar uti septembri månad **1726** [löfte] att få betiäna mig af Doct: et Assessoris Med: JOH: ROTHMANNI privata lection och information, då han med största lärdom läste för mig BOERHAAVENS[21] institutiones[22] uti physiologicis, h:kn alt sedan icke älskat mig såsom sin Discipel utan som son. Alt sedan slog jag min enda åhoga till Medicinen, såsom jag hoppades detta skulle blifwa med tiden min födekrok. Sedan valedicerade jag mina wänner **1 Maj 1727** och hölt med mine kamerader[23] en förnöglig ro, uti MUNTENS[24] huus natten emällan d. **1 och 2 Maj.** Dagen därpå[25] **2 Maj** reste jag från Wexiö till Stenbrohult, hafwandes med mig fölliande Testimonium, som jag af Rect: Mag: NIC: KROK bekommit.

Magnifice D:ne Rector!

Qvemadmodum in Regno Vegetabili jucundos edit ludos natura, plantas ab uno loco in alium transferendo, felicius illis maturiusqve accelerans incrementum; ita suum imperium blandissime exer-

cent musæ, dum præstantes ingenio Adolescentes sedem studiorum subinde migrare jubent, qvo citius dulce illorum nectar in sangvinem et succum vertere possint. Hoc consilio ornatissimum Adolescentem CAROLUM LINNÆUM honoratissima familia oriundum e nostro Gymnasio ad se evocarunt Musæ altiores Academicæ, qvibus ut acceptior adveniat, et majori cum gratia, semet illis sistere possit, in ipso accessus limine, studiorum et anteactæ vitæ testimonium exhibere conatur. Testor itaqve Eundem pie, probe atqve honeste apud nos vitam transegisse, literarum studiis operam indefessam navasse, et ab omni malorum sodalitia abhorruisse. Tibi itaqve Magnifice D:ne Rector, Tuæqve fidei, favori et benevolentiæ, illum de meliori nota commendo, officiose et qva decet observantia rogans, velis pro solita in ingenuos, modestos atqve virtutis amantes propensione, eum inter Clientes tuos receptum favore tuo beare. Cujus benefici et Paterni adfectus memoriam numqvam ipse e pectore suo elabi patietur et ego constanter retinebo, qvi dum vixero pro tua Magnifice D:ne Rector incolumitate pia semper faciam vota, mansurus

Tuæ Magnificentiæ

observantissimus cultor
NICOLAUS KROK
Regii Gymn: Vex: h: a: Rector.
(L. S.)

Dabam Vexioniæ pridie nonar. Maji Anni reparatæ salutis CIↃDCCXXVII:mi.[26]

Valedicerade sedan mine föräldrar och wänner i Stenbrohult,[27] begynnandes resan **14 Aug. 1727** och ankom till Lund **17 Aug.** Gick sedan under Examen för då Decano et Profess: Eloqv: PAPKE,[28] approberades **19 Aug.** samt remitterades Rectori Magn: Profess: Theol: 2:do HEGART;[29] aflade juramentum och inskrefs **19 Aug.** Men såsom jag satte mig i sinnet eij här öfwer 1 åhr förblifwa, hölt jag onödigt gå poenal och gifwa mig i någon nation, ty war jag opartisk. Och emädan jag tänkte här med alwara idka mina påbegynta studia Medica, lagade jag så att jag **21 Aug.** fick kammar hoos Doct: et Practicus nobilium Scaniæ KILIAN STOBÆUS,[30] hwars Privatissimus jag war, så länge jag blef i Lund. Här war tillfälle ganska godt, att giöra sig Mineralogien bekant, emädan hans favorit studium war Mineralogien, hwaraf han så wähl som [af] andra Curieusiteter hade en stor sambling. Uti privat colleg: läste han sitt eget collegium physiologicum äl:r sciagraphia, men privatissime VALENTINI Musæum musæorum.[31] Denne Herre är jag obligerad, så länge jag

lefwer, för den kärlek han hade för mig, i dett han älskade mig icke som en sin Discipel utan mehr än som sin son.[32] — Profess: Med. Döebel[33] läste här Miscellanea och hwad [som] kom före, utan någon profit för oss. Men följande åhr **1728** läste han likaledes, doch Physicam Budei.[34] — Här wart jag siuk **26 Maj 1728** af en stor böld i min arm, där icke D: Stobæi omsorg och Chirurg: Snellens[35] arbete hulpit mig, hade jag förgåts. Och emädan Doct: Rothman genom bref så mycket påyrkade att jag skulle resa till Upsala, tog jag straxt jag blef frisk afskedd från Lund **28 Jun.** och kom till Stenbrohult **29 Jun.** Skickandes äfter Testimonium till Lund, h:kt war följande

Candido Lectori.

S. & O.[36]

Non male sibi bonoqve publico consulere videntur, qvi talibus artibus se patriæ commoda cum tempore promovere posse confidunt. Ætas enim qvæ brevis admodum est eos rebus vel inanibus vel alienis et ad illud vitæ genus cui se addixere parum facientibus occupari non sinit. Hic qvi præsens exhibet literas, aliqvando professurus, Politissimus Ornamentissimusque [Ornatissimusqve] Dominus Carolus Linnæus Smolandus, statim post accessum suum ad Carolinam nostram, relictis aliis, animum ad Medicinæ studium applicuit, in qvo item Ducem felicissimum mox sortitus est Medicinæ Doctorem D:m Chilianum Stobæum. Nunc cum consilium ceperit ex hac Academia, [ad] qvam ante Annum accessit, ad Upsaliensem abeundi, ut studium suum Medicum hic incoatum, ibi ad justam perducat maturitatem, simulqve hoc suum propositum nostro muneri [muniri] Testimonio desideraverit, modestæ ejus petitioni, nostroqve officio deesse non voluimus, nec debuimus, qvin potius præsentium vigire [vigore] testatum facimus, D:m Linnæum, sic se in hisce musarum castris gessisse, ut non minus diligentiæ [diligentia], qvam innocentiæ [innocentia] vitæ se iis, qvibus innotuit, reddiderit amabilem. Qva de causa item abeunti, prosperos omnium rerum successus ab immortali Deo apprecamur et honesta ejus desideria litterarum patronis et fautoribus, qva possimus diligentia commendamus.

Dabam Londini Gothorum d. VI Sept. MDCCXXVIII.

Arvid Moller.[37]

Reg: Acad: Carol: h: a: Rector.

Tog afsked af mine föräldrar[38] och wänner samt reste från Stenbrohult **23 Aug. 1728** genom Ekesiö, Scheninge, Örebro, Arboga, Enkiöping [Kiöping], Westerås och Kiöpinge [Enkiöping], ankommandes

till Upsala **5 Sept.** Och emädan jag wäntade testimonium från Lund öfwerskickat, inskrefs jag[39] intet före **23 Sept.** under då warande Rect: M: Mag: Joh. Hermanson.[40] Här gaf jag mig och inskrefs i Smålänska nation. — Här hörde jag Profess: Anat: et Botan: Rudbeck[41] fil. läsa öfwer sina Swänska foglar,[42] som han så lifligen hade afritade, att dett war undranswärt, med sine egne coleurer, publice. Likaledes Profess: Theoret: et Pract: D: Roberg,[43] låtandes oss explicera på Swänska Langii Theses Physiologicas,[44] giörandes här wid få annotationer, men privatim, ty publice läste han denna termin intet. Här wid Upsala war ett förträfligt Bibliotek och på dett fins ett dyrbart och härligt konst-cabbinet, h:kt jag beså **16 X:br** [= **Dec.**] Här fick jag och stipendium reg: medicum uti nedersta classen[45] **16 X:br.** — Och såsom jag eij tillförna sedt Stockholm, reste jag tit **14 Jan. 1729** att giöra min upwachtning hoos Arch: Bromel,[46] Nordenheim,[47] Ass: Soem[48] och Alstrin;[49] men reste straxt till Upsala igen **19 Jan.** Men såsom en Anatomia[50] skulle ske på en uphängd qwinnes person, reste jag åter tit **29 Jan.** och hörde på följande och samtelige lectioner. 1. Arch. Bromel ett förtahl, integumenta universalia samt musc: abdom: et manus **31 Jan.** 2. Stadsph. Boij[51] de Situ partium naturali et vulneribus. Docte. **4 Febr.** 3. Ass. Soem Contentis abdominis. Eleganter **7 Febr.** 4. Hofm. Ribbe[52] de Cerebro et Oculo. Doctissime. **11 Febr.** 5. Ass. Alstrin de Corde et Pulmonibus. Mediocriter. **14 Febr.** 6. Lifm. Nordenheim de Genitalibus. Egregie. **18 Febr.** Här war en god Prosector Möller.[53] Jag reste så till Upsala igen **23 Febr.** Besåg jag Theatrum anatomicum Upsaliense **7 Mart. 1729,** h:kn är mycket wähl conditionerad med 7 omgångar. — Emällan Distingen och Midsommarstijd läste Prof: Roberg för påsk 4 lectiones publicas om några frågor utdragne af Aristotelis problemata.[54] Jag söchte och då att få ga till samma Professor uti ett collegio casuali, då Profess: dicterade 5 lectioner af de casus som stå uti Henrici Regii Ultrajectini Praxis Medica edit: 3:ia Traject: 1668. 4:to. Men såsom de andre blefwo misnögde, hållandes före wara bättre kiöpa boken, öfwergofwo de honom, och jag allena fick icke lof betiäna mig där af. Och sedan eij mehr den termin. — Samma termin läste Profess: Rudbeck för påsk öfwer sin Ornithologia 3 lectioner de Avibus rapac: och äfter pingest 2 lectioner uti horto academico, då jag war till Dannemora. — Denna termin hade varit för mig mycket slätt, där äst icke Doct: et Profess: Theol: O. Celsius[55] wist mig en särdeles gunst, genom dett han kallade mig till sig **8 April,** då han begynte arbeta på Flora Uplandica, så att jag altid fick wara tillstädes, då dett hades för

händer. — Opponerade jag **26 Mart. 1729** under en Disputation pro stipendiariis Regiis h:kn Prof: Roberg höll de motu sangvinis[56] på Acad. Gustaviana Resp. Petr: Sandel.[57] — Reste jag **24 Maj 1729** till Dannemora med Med: stud: Johanne Humble,[58] att öfver helgen informera honom uti botanicis. Här såg jag några rara örter* såsom Dentaria hept: Orchis fl: viridi. Orobanche rad: dentata. Viola mart: alb: et Viola palustris martia fl: glauco. Gram: Miliac: Laureola off: Bistorta media. Sanicula. Stratiotes foliis Asari. Ophiogloss: Triental: Campan: serp: Rudb: [fil. lap. p. 96 f. 1] Veronica serpyllif: fl: prorsus albo. Saxifraga verna annua hum: [Tournef: Inst. Rei Herb: T. 1. p. 252.] Gram: miliaceum. Här såg jag ock järnbrytningarnas och grufvornas stora diup, med malm och instrumenter. Här såg jag dett som rarast war, den Eld Machin som Trivald[59] uprittat i full gång, som gick älr drifs af watnets och atmosphæræ tryckning, h:kn är den endasta som warit och är i Sverige. Ett litet stycke här ifrån såg jag Österby bruk, hwaräst järn hamrar woro, hwad arbete! Här gå operantes i blotta skiortan, med säckar på föttren och toflor etc. Reste där ifrån till Upsala **10 Juni.** — Fick jag **20 Juni** stipendium regium in facultate medica uti andra classen näml: 20 dl:r s:mt hwart halfwa år. — Reste jag **24 Juni** till Roslagen [detta sista ord är dock i texten utsuddadt, utan något annat i stället], då Doct: Celsius mig följde dit, allenast till den ändan att wisa mig Sceptrum Carolinum Rudb: f: som dock eij då stod i blomma, då wij gingo genom den stenigaste ort som war i Swerige utan twifwel. — Reste jag **30 Juni** från Upsala åht hafsbrädden till att uppspana de örter, som wij eij förr uti Upland hade sedt, h:ka komma att insättias uti Flora Uplandica [62] och [87]. Denna resan bestod mig Academia regia Scientiarum, hwarför jag fick 18 dl:r kp:mt, då siälfwa resan eij kom mig öfwer 12 dl:r kp:mt.[60] På denna resa

---

* De här uppräknade växterna återfinnas i Linnés Species plantarum ed. II. Holmiæ 1762—63 under följande namn; numrerna angifva sidan: D. bulbifera p. 912, jfr L. Hort. Cliff. p. 335. Satyrium viride 1337. Lathræa Squamaria 844. V. odorata β 1324. (Tidigare torde L., att döma efter hans Fl. Lapp. p. 226 sp. 277, hafva härmed afsett den art, som sedan af honom kallades V. canina). V. palustris 1324. Milium effusum 90. Daphne Mezereum 509. Polygonum viviparum 516. S. europæa 339. Str. Aloides 754. O. vulgatum 1518. Tr. europæa 488. Linnæa borealis 880. V. serpyllifolia 15. S. tridactylites 578.

I Linnæi bref till K. Stobæus 1729 $^{23}/_{6}$ (se »Linnés Svenska Arbeten» h. 5 (1881) s. 17 omnämnas ock såsom funne af L. vid Dannemora: Fragaria vesca β pratensis 709, Taxus baccata 1472 och Hypnum alopecurum 1594.

observerade jag fölliande [wäxter] som tilförne här uti Upland eij warit sedde. N:o 26.* VI/30 a. Gr: spica orizæ [brizæ] majus C. B. [Casp. Bauhini Pinax. p. 9.] VII/1 b. Cracca sylvat: alis dentatis, fl: alb: c. Myosotis s. Echium scorpioid: arv: fl: carneo. varietas wid Dannemora 2. d. Gr: spicat: folio asp: Sch: [J. Scheuchzer, Agrostographia p. 299.] staminibus cæruleis. 3. e. Ranunculus erect: acris floribus viridibus. forsan varietas. 4. f. Gram: typhoid: asp: alt: stamin: cærul. g. Cyperoides polystachyon lanuginos: Sch: [Scheuchzer p. 478.] die 6. h. Gr: paniculat: odorat: Sch: [Scheuchzer p. 236.] i Helleborine latifol: mont: T: C. B: [Tournefort Inst. Rei Herbariæ I. p. 436; C. Bauh: Pin p. 186.] k. Hippuris fœtida Dill: [Dillenii Cat. pl. circa Gissam p. 105.] item l. Hippuris muscosus caulic: spinis [spinulis] crebris exasp: sub aqv: rep: Moris: [Rob. Morison, Hist. pl. univ. T. III p. 621.] 7. m. Centaurium minimum. n. Cyperus panicula sparsa e spicis longioribus, tenuioribus, teretibus composita Sch: [Scheuchzer; p. 398.] o. Spergula maritima [marina J. Bauh:, Hist. T. III p. 772.] alias Alsine Spergulæ facie media C. B: [C. Bauh: Pin. p. 251.] Plantago maritima major tenuifolia T: [Tournef: I p. 127.] p. Somolus [Samolus] valerandi T: [Tournef: I p. 143.] på Karöen wid Östhammar. q. Filum maritimum [marinum. Joh.] Loesel: [»Plantæ in Borussia sponte nascentes» (ed. I) 4:to Regiom. 1654 p. 23, ed. II 4:o Regiom. 1703 p. 74] wid Östhamar. 8. r. Fucus marit: l. qverc: marit: foliorum extr: [= extremis] [tumidis] glandiferam vocant T: [Tournef: I. p. 566.] s. Fucus ms [maritimus] l. qvercus marit: vesiculas habens T: [Tournef: I p. 566.] t. Veronic: spicat: major foliis angustioribus wid Öregrund. 9. u. Cepa sectilis juncifolia perennis T: [Tournef: I. p. 383.] x. Polygonum marit: erec-

* De 26 stycken, på denna resa insamlade, för Upland nya växterna, återfinnas enligt anförda synonymer i Linnés Species plant. ed. II under följande namn å anförda sidor: **Juni 30** *a.* Bromus pinnatus p. 115 (jfr »Plantæ Roslagicæ» i den särskilda uppsatsen »Spolia Botanica» här nedan.) **Juli 1** *b.* Vicia sylvatica var. 1035; *c.* M. scorpioides *α* arvensis 188 (Obs.! vägen togs öfver Dannemora). **Juli 2** *d.* Dactylis glomerata 105. **Juli 3** *e.* R. acris var. 779. **Juli 4** *f.* Phleum nodosum 88 [Phalaris phleoides *β* L. Fl. Sv. (ed. I) sp. 49, ed. II sp. 54; Celsii Catal. p. 24]; *g.* Carex hirta 1389. **Juli 6** *h.* Holcus odoratus 1485; *i* Serapias Helleborine *α* latifolia 1344; *k.* Chara vulgaris 1624; *l.* Chara hispida 1624. **Juli 7** *m.* Gentiana Centaurium var. 332; *n.* Scirpus maritimus *δ* 75; o. Arenaria rubra *β* marina 606; Pl. maritima 165; p. S. valerandi 243; *q.* ? Fucus Filum 1631. **Juli 8** *r.* F. vesiculosus *β.*; *s.* F. vesiculosus 1626; *t.* V. maritima 13. **Juli 9** *u.* Allium rotundum 423 (eller snarare enligt L. Fl. Svec. A. Schoenoprasum 432); *x.* P. maritimum 519 enligt synon., men här snarare

tum majus latifol: y. Salix oleæ sylv. folio alpina Rudb: f: [Index plant. lapp. p. 99] z. Gr: caninum maritimum spica triticea nostras Sch: [Scheuchzer, p. 6.] α Plantago in Fl: Upl: [Ol. Celsii Catal. pl. Upl.] dicta Coronopus maritima foliis ab interna parte sicut Orchidis species qvædam nigris punctulis adpressis [adspersis] flosculis luteis. β. Caryophyllus sylv: vulg: angust: carneo flore. γ. Orchis odorata moschata. β. Monorchis C. B: [C. Bauh: Pin. p. 84] på Gräsöen. — D: Celsius och jag reste **7 Sept.** till Börie sochn och sågom Sceptrum Carolinum[61] uti full mognad med des capsulæ, då jag fant att dett revera war en Pedicularis, doch i fruchtan för Prof: Rudbeck holt jag detta dolt och gaf beskrifning på Sceptrum Car: Mesomora och Dortmanna uti Flora Uplandica.[62] **8 Sept.** — Doct: Celsius war så resonabel att han böd mig **16 Jul. 1729** till få spisa hoos sig en tid för intet, h:kt och kom mig till pas ifrån Midsommarsdagen till Mickaël mässo då han reste till Stockholm, och detta 2 gånger om dagen gratis.[63] När han **24 Sept.** reste till Stockholm lämnade han mig kammar i sin gård, utan huuslega. — Fant jag **18 Octobr.** Cimices sylvestres dorso faciem humanam repræsentantes.[64] — Fick jag **16 X:br [Dec.]** stipendium regium uti öfwersta classen[65] för medelst Prof: Rudbecks pådrifwande, emot alla Prof: Robergs intriger. — **4 Maj 1730** begynte jag Lectiones publicas in Horto academico Upsaliensi att föreläsa, emädan Prof: Rudbeck mig där om anmodade, som han siälf denna termin war nog occuperad, och hade ofta 200 à 300 auditores.[66] — **1 Jan.** skref jag min Exercitatio de Sexu et Nuptiis plantarum 4:to och dedicerade den Doct: Celsio för Nyahrsgåfwa.[67] — **13 Jun.** som war dagen för jubelfästen[68] flotte jag från Doct: Celsii gård[69] till Profess. Rudbecks, som war då så gunstig och lätt mig få condition med sina 3 små herrar att informera Olof Fridrick, Alexander och Adolph Rudb:[70] [**29 Juli**] som war Wälb: Profess: Rudbecks namnsdag, hopskref jag min Hortum Uplandicum 4:to och dedicerade den åht professoren.[71] — Opponerade **23 Juni** ordinario loco på Dan: Bonge de Natura Salmonum[72] under Prof: Robergs præsidio. — Uti Octobr. tillböds mig condition af Arch: Nordenheim att tilträda wid påsk, h:kn jag fuller

---

P. aviculare var. 519; y. S. caprea β 1448; z. Elymus arenarius 122; α. Pl. maritima var. 165 (jfr L: Fl. Lapp. sp. 63); β ? Dianthus. (Synon., hemtadt från J. J. Dillenii Catalogus plant. circa Gissam nascentium p. 153 och från Casp. Bauh: Pinax p. 209 samt senare infördt i Celsii Catal. p. 15, återfinnes ej i något af Linnæi förut tryckta arbeten. Möjligen skulle enligt Dillenius dermed kunna menas en varietet af D. Carthusianorum L: Spec. pl. ed. II p. 586); γ Ophrys Monorchis 1342.

emot tog, men revocerade den där på följande war. — **27 April 1731** opponerade SOLBERG[73] och LETSTRÖM[74] under min Responsion publice pro stipendiariis regiis sub Præside ROBERGI.[75] — **3 Maj** begynte jag Lectiones publicas uti Hort: Acad: Upsaliensi, läsandes hwar annor tima theorien.[76] — **5 Maj** såg jag funambulones[77] uti Upsala. — **25 Maj** opponerade jag extraordinarius på en Diss. de Cuculo ingrato[78] præsid. GRÖNVAL[79] resp. THOM. JERLIN[80] Suderm. så att de aldrig glömat, och dett på bägge sidor med största häftighet och hastighet. — Reste till Stockholm[81] **24 Jun.** medan Prof: RUDBECK drack brunnen och hade frist vivere hoos apot: WARMHOLTZ[82] samt den tiden reste till Wickbergs [Wicksbergs][83] brun och besökte flitigt trägårdarne[84] i Stockholm och reste till Upsala **24 Jul.** — Men som min mor war träffeligen siuk [desisterade] jag min condition **18 Dec.** och reste åht Stenbrohult, curerade min mor och drog min syster lilla[85] uhr döden. Reste sedan till Lund **2 Febr. 1732** att af STOBÆO lära mehra lithographien och kom hem igen **14 Febr.** Reste åht Upsala åter och ankom **1 April.** Blef **14 April** slutet uti Societ: Reg: lit: et scient: att försända mig öfwer somaren till Lapmarken att där dilucidera historiam naturalem.[86] — Skref **23 April** Disputation de Corno herba, men som D: CELSIUS wiste mig att DILLENIUS funit des genus[87], wille jag ej förekoma, fastän disputationen war halftryckt, ty blef hon revocerad. — Reste till Stockholm **Maj 4.** Kom till Upsala igen **10.** Reste **12** från Upsala åht Lapmarken[88] genom Giefle, Hudvicksvald, Sundsvall, Hernösand, Umeå, hwar ifrån jag steg af landswägen åht Umeå Lapm., h:kn jag anträdde och kom till Lyksele, för 12 mihl ofwan Lycksele, men för stor möda war att längre koma, ty steg jag tillbakas, kom till Lycksele igen, så Umeå. Reste sedan åht Pitheå, dit jag äntel. ankom d. [**15 Juni**] och där ifrån till Luleå, där ifrån till Qvickjock, här ifrån till fiällen, hwaräst alt gick till fots, gick öfwer Isbärgen älr fiellryggen och ankom sama dag till Norrige älr finmarken, wid pas 70 grad: elev: poli, reste 5 mihl aht stranden till Past: RASK i Rörstad, tillbakes, öfwer fiellen åht Qvickjock, Purkijaur, Jockmock, Lule, Tornea änteligen till Kemi, Maxianemi, tillbakes till Torneå [och] Calix där jag lärde af Bergm. SVANBERG Proberkonsten, sedan åht Tornea, Ulea, Brahestad, Gambla och Ny Carleby, Wasa ankom till Åbo reste från Åbo åht Åland, öfwer Ålands haf, Grisselhamn, ankom till Upsala **d. 10 Oct.** Upwiste **3 Nov.** min Relation för Kongl. Wettenskaps Societeten, som där med war wähl nögd. — Fick **18 Nov.** öfwerskotsmedlen i WREDIANSKA stipendio[89] till beneficium, att uphalla mig wid Upsala med. — Lärde **i Septembr.** proberkonsten på 8

dagar af SVANBERG gratis.[90] — Intimerade **16 Maj 1733** till Colleg: privat. Botanic: fick några och 20 auditores, peningar 49 dl:r s:mt. Blef **26 Maj** pronuncierat senior uti natione Smolandica.[91] Såg **27 Maj** Mora stenars gambla antiqvitet. — **6 Juni** kläck: 6 äfter middagen afsomnade min käresta och fromma Moder, mig i min bortwaro till en obeskrifwelig ängslan, sorg och skada. — Begynte **29 April** skrifwa de Diæta naturali.[92] Skref **4 Aug.** Disp: aug: de Febribus intermitt.[93] Höstterminen **i Oct.** intimerade till collegium Docimasticum a 10 dl:r s:mt personen, hwarigenom jag **i Dec.** förtiente wid pas 200 dl:r s:mt.[94] — Reste **20 Dec.** till Dalarna,[95] **1734** besåg allehanda ut Garpenberg, Avestad, Stiernsund, Biurfors, Norberg, Nyshytte, Bitsberg, Sahlberg. War [**26 Jan.**] nedre i Fahlu grufwa, en rätt copia af helwete. Kom till Upsala **1 Mars.** — Såg **31 Maj** en siuk med största fasa agera en fördömd menniskia. — Reste från Upsala till Fahlun Kongsg[ården] **3 Jul.** äfter kallelse och [på] Landsh. REUTERHOLMS depance i Fahlu. Reste **23 Jul.** öfwer Österdalarne och Fjellen Röros i Norrige och des ♀ grufwa, Wästerdalarne. Kom till Fahlun[96] **17 Aug.**

Förklaringar af och anmärkningar till texten.

1 Nicolaus Linnæus föddes i Stegaryd af Hvittaryds församling och Wexiö stift d. 1 Juli 1674. Föräldrarne bondfolk. Underhölls i Wexiö skola och gymn. jemte egna söner af morbrodern, kyrkoherden Sv. Tiliander i Pjetteryd. Afreste till Carolinska academien i Lund år 1699 och hade ej mer än 1 dlr 8 öre s:mt till respengar från hemmet utan tanka om transporter. Sedan han academien freqventerat 4 år, reste han till Wexiö, undergick examen sacerdotale och, som ingen constituerad Biskop då var, blef han sänd år 1703 till Stenbrohult att hjelpa kyrkoh. Sam. Brodersonius med predikande. Ordinerades i Wexiö d. 14 Oct. 1705 och blef capellan i Råshult d. 22 Nov. s. å., tillträdde genast; 1708 d. 12 Aug. kyrkoherde i Stenbrohult. Afled den 12 Maj eller Christi Himmelsfärdsdag år 1748, ætatis 74 år. Blef begrafven d. 1 Juni bredvid altaret på södra sidan, der hans förut aflidna hustru sjelf utsett deras gemensamma hvilorum. — »Sitt ombetrodda embete uträttade hr kyrkoherden alltid troliga och redeliga, hade ett godt förstånd, starkt minne, så att man deröfwer måtte sig förundra, lätt wid att sjunga och tala, hörde ganska wäl och talade rent, fast han bortmist alla tänder. Till utseendet war han wacker. Eget brunt, men sist grått hår, något krusigt ned på ändarne, bred panna och hög, bruna ögon, klyft, brunt skägg, men sedan grått, det war ock bredt och stort, det han höll wäl; medelmåttig till wäxten. Till sitt sinne war han mycket redelig och förtrogen, wisste ej af denna werldenes falskhet, föraktade dess moder och flärd, alltid wänlig, lustig och glad samt ock mycket skämtsam. Aldrig hämndgirig. Såg han någon lida nöd, på hwad sätt det war, war han så blödig, att han ej förmådde hålla sina ögon från tårar. — War ganska sorgfällig om Guds huses reparation och är kyrkan genom hans omsorg målad inuti till tak och wäggar, en ny altartafla anskaffad, twenne de främsta ljuskronorna köpte, stolar gjorde och målade, i hwilkas ställe förr woro allenast bänkar, predikstolen renoverad, kuren öfwer ditsatt, choret hwitmenadt utanpå, alla fönstren på östra, westra och södra sidorna omgjorda, att de nu äro stora, i stället för det de förr woro små, hwadan kyrkan nu är ljus. Kyrkotaket spänt på södra sidan; kyrkogårdsmuren låtit uppsätta hög, som förr war ett stenrör, bårhus och benhus låtit uppbygga, klockan och stapeln ofta upplaga, förutom mycket annat, allt wäl och ordentligt. — Prestgården äfwen mycket förbättrat, uppodlat twenne humlehagar, en skön trädgård, der förr ej war en qwist, hwilken han upptog med egen hand och i det stånd satte, att han öfwergick alla trädgårdar i Småland. En hwälfd källare anlade här, nya eller westra byggningen låtit på egen kostnad twenne gånger uppsätta, hwilka första med de andra husen natten till den 20 April 1746 i aska lades. Åker och äng har

han utwidgat och förbättrat. Wittne är allt detta, att han warit en god hushållare. — I sin diæt war han måttelig, alltså till sin helsa stark. För 17 år sedan hade han fått en förkylning eller fluss i hufwudet, som årligen honom plågade; men den 3 Maj sistl. blef han hårdt ansatt i bröstet, då han den 6 tog Herrans Hel. Nattward, lät läsa för sig många böner och psalmer, tackade Gud för all den nåd honom wederfaren war hela lefnaden igenom, men erkände för största nåd, att han nu kunde med godt förstånd antwarda sin själ i Guds hand. Dagen före sin död befallde han alla sina hemmawarande barn ställa sig upp för hans sjuksäng Wi måste alla fyra ställa oss efter åldern, men Carls rum skulle stå ledigt och öppet. Dernäst Anna Maria [Höök] pastorska i Wirestad, dernäst Sophia Juliana [Collin] pastorska i Ryssby, så Samuel Adjunctus Pastoris et Patris och sist Emerentia, [sedan] befallningsman Brantings fru. Salig gubben ställde ögonen länge på sina barn; sade sedan: Carl är borta. Han har gjort mig stor glädje! Gud har wälsignat mig med fem barn, som alla gjort mig stor glädje och aldrig sorg. Nu will jag lemna eder barn! Min faderliga wälsignelse förr än jag går från eder! Carl är borta! Sedan önskade han wälsignelse öfwer honom och hela hans hus och familj. Derefter wälsignade han med händers påläggning en hwar af oss andra, önskande ett gladt möte af alla i himmelen. Sedan wille han icke mycket tala med barnen.» Nicolai Linnæi egna och sonens Samuel L:i anteckningar, förvarade i Stenbrohults kyrka samt i afskrift i Wexiö allmänna läroverks bibliotek äfvensom delvis tryckta af P. Wieselgren i *De la Gardieska Arkivet* Bd. 9. Lund 1837. 8:vo s. 199—209. — Stenbrohults nuvarande kyrka byggdes åren 1828—30 på samma plats som den gamla. Se Es. Tegnérs invigningstal d. 2 Juni 1833. Supplement-band till hans samlade skrifter, 8:vo, Stockholm 1851, s. 272—284. De gamla prestgårdsbyggnaderna, hvilka uppbyggdes efter branden 1746, äro nu bofälliga och delvis nyligen nedrifna. Nya byggnader uppföras i närheten. Af den verldsberyktade trädgården finnes nu intet spår.

2 Christina Brodersonia, äldsta dotter af kyrkoh. Samuel B. och hans hustru Maria Skee, föddes i Stenbrohults prestgård d. 10 Nov. 1688; gift d. 6 Mars 1706 med komministern, sederm. kyrkoh. Nicolaus Linnæus. Död d. 6 Juni 1733 och begrafven d. 13 s. m. i Stenbrohults kyrka. — »Hon har lefwat med sin man i äkta kärlek och sämja med förnuft 27 år och 3 månader, aflat 5 barn, dem uppfostrat på berömligt sätt. Skickat sig alltid mot höga och låga, fattiga och rika, utom sochnen så wäl som inom, att alla kunde icke annat än henne berömma. Alltid war hon gudfruktig och sitt hus wäl förestod, gauska flitig och försigtig, gifmild och aktsam, med högt förstånd begåfwad; haft en god helsa till ett och ett halft år förr än hon afled, i hwilken tid hon, med tålamod, stundom flere, stundom ringare weckor, låg till sängs och omsider ett halft år, alltid längtandes efter den himmelska glädjen, som hon ock säkerligen bekom. Ætas 44 år och 6 månader.»

3 »Döptes af sin morfader. Dess Faddrar: Sigf. Londerberg, H. Lisken Lindelia. Jöns i Södra Warpshult, Jungfru Maria Brodersonia. Jon i Borshult, H. Gyret i Taxåhs. Germund i Taxåhs, H. Elin i Elmhult. Germund i Gemöen, H. Berita i Ståckanäs. Erick i Bergöen, H. Christa i Såganäs.» »Barsöhl giordes effter honom d. 24 Junii och blef i faddergåfwa då och förr sampt sedan 50 ₰ Sm:t, för hwilka en förgylt silfkanna, som kommer honom med rätta till, köptes.» Anteckningar af N. Linnæus, nu förvarade i Stenbrohults kyrkoarkiv.

4 Samuel B. kyrkoherde i Stenbrohult från år 1682 till sin död d. 31 Dec. 1707.

5 D. 31 januari 1709 flyttade föräldrarne från komministersgården Södra Råshult till Stenbrohults kyrkoherdeboställe.

6 Johannes Telander född år 1694 på Diö i Stenbrohults s:n; fadren dannemannen Samsing Gudmundsson och modren Brita Svensd:r. Fullföljde studierna i Wexiö från år 1708 med mycken tidspillan i anseende till Danska kriget och grasserande pest i Wexiö, i anledning hvaraf skolan var resignerad och obrukad i ett om ej två år; flyttades till gymnasium 1714 och 1721 till Upsala. Prest 1735, kyrkoherde i Korsberga 1745, prost 1754, död 1763. *Archiv Smol.* B. 3. Sid. 84. Handskrift i Wexiö gymn. bibl. — Om denne säger L. i »*Egenhändiga Anteckningar af* Carl Linnæus *om sig sjelf*», utgifne af Adam Afzelius Upsala 1823, 4:to, sid. 6, »föga tjenlig att uppföda Barn». Den *autobiografi* af L., hvilken Afzelius i företalet till nyssnämnda arbete under N:o III omtalar såsom honom till låns lemnad af L:s *döttrar och måg* och hvilken handskrift Afz. uppgifver ligga till grund för »*Andra Stycket*» s. 101—123 i arbetet, såldes år 1867 till *British Museum* i London af Linnés dotterdotterson ingeniör M. Ridderbjelke genom lektor N. P. Ödman. Deri begagnar L. starkare uttryck om Telander: »en hård informator, som ej med låckande, utan med stryck lärde honom läsa». Måhända hafva just för denne T:s skull lärarne i Wexiö trivialskola fått sitta så hårdt emellan, då L. senare i »*Egenh. Anteckn.*» om dem fällde det omdömet »rude Lärmästare med lika rude method gåfwo Barnen hog för wettenskaper, att håren måste resas på deras hufwud» och att »Gossen fåt största fasa för studier».

7 Hök eller Höök såsom tillnamnet ock skrefs, föddes den 15 Februari 1698 i Nöbbeled. Scholaris i Vexiö 1712, gymnasist 1716, student 1721 i Lund, der han blef fil. mag. 1726. Bataljonspred. vid K. Kronobergs reg:te, apologist i Wexiö 1734 och lektor i grekiska 1739, kyrkoh. i Wirestad 1742, död 1769. Gift d. 14 Juni 1730 med C. Linnæi äldsta syster Anna Maria. Häraf framgår ungefärliga tiden för autobiografiens nedskrifvande, mellan 1730 och 1735.

8 N. Kjellberg, rector scholæ i Wexiö 1710—1719. Utnämnd 1719 till kyrkoh. i Elghult, afled han samma år.

»In scholam Vexion. introductus, rectore Nicolao Kiellberg: 1716 Maj 10 Carolus Nicolai Linnæus pl. R:di D:ni Pastoris in Stenbrohult filius 9 fere annorum in cl. inf.» Wexiö skola hade den tiden sexårig kurs, hvaraf fyra år för klasserna och två år för »ringarne».

9 Bero Limnorin blef, efter flera års tjenstgöring vid Wexiö skola, der 1721 anställd såsom apologist och slutligen kyrkoh. i Sandsjö, död 1740.

10 Jacob Hamn, född 1676, kollega i Wexiö 1709, domkyrkosyssloman 1731, kyrkoh. i Dädesjö 1741, död 1755. Liksom Limnorin var han graduerad.

11 Daniel Lannerus, född 1679, rector scholæ 1719—1729, kyrkoh. i Nöbbeled och kontraktsprost, död 1761.

12 Lars Odelin, född 1686, konrektor 1721—1725, lektor i grekiska 1725, förste teol. lektor 1735 samt kyrkoh. 1739 i Elmeboda, der han afled 1755.

13 »Anno 1723 Rectore Gymnas. Petro Hyllengrehn examine anniversario habito diebus 8, 9 & 10 Julii juxta constitutiones Reg. consensu et approbatione eorum, quorum interest, translati sunt sequentes in Gymnasium e schola triviali die 11 ejusdem mensis: Isacus Lindberg (Comminister in Forsheda). Nicolaus Krok (studiis ineptus dimissus sine Testimonio). Samuel Almelin

(Comminister in Björkö). Petrus Magni Rosbeck (Pastor & Præp. in Pjetteryd). Johannes Jonæ Elgærus (Obiit Upsaliæ). Johannes Collin (Pastor in Ryssby), [C. Linnæi svåger, gift med Sophia Juliana L.]. Carolus Starck (Lector Eloqu Vexion. — Pastor & Præp. in Elmeboda). Isacus Petri (ad genus vitæ politicum se adplicavit). Samuel Haquini (obiit). Carolus Linnæus (Med. D:r Upsaliæ, Prof., Archiat.; Eques, Nobilis). Nicolaus Spelin Pastor in Urshult). Sveno Svanstedt (propter vitia relegatus. Mönsterskrifware). Johannes Andreæ (Obiit Upsaliæ). Steno Haraldi Ljungwall (magister factus obiit Upsaliæ). Nicolaus Jacobi Wernell (Pastor in Åhs). Nicolaus Grönqvist (Collega Sch. Vexion. obiit 1741). Postea accessit Andreas Ingevaldi Elmgren (Comminister in Skärstad)». Ur Wexiö gymnasii matrikel.

14 J. Stensson Rothman, född å Wexiö hospitalsgård d. 24 Febr. 1684, »logices et physices lector» 1719—1763, titul. assessor i K. kollegium med. 1722, blind sedan 1749, tjenstledig 1751, död d. 20 Juli 1763.

15 M. Hjelmgren, »histor. & moral. lector» 1712, förste teol. lektor 1721, död 1729.

16 J. Flachsenius, född 1683 i Åby, »eloquentiæ lector» 1719, andre teol. lektor 1721, kyrkoh. i Rydaholm 1725 och kontraktsprost, död 1733.

17 P. Hyllengrehn född 1677, lektor i grekiska 1714, andre teol. lektor 1725, förste teol. lektor 1730, död 1734.

18 N. Colliander, född 1680, »mathematices lector» 1720, andre teol. lektor 1730, kyrkoh. i Elghult 1732 och kontraktsprost, död 1762.

19 P. Floderus, född 1683, »historiarum & moral. lector» 1721, kyrkoh. i Skatelöf 1726 och kontraktsprost, död 1741.

20 N. Krok, född 1688, »eloquentiæ lector» 1721, kyrkoh. i Hultsjö 1728, död 1729. »Han skall hafva varit en lärd och gudfruktig man». — Oriktigt uppgifves senare af L. sjelf, då minnet svek, att han 1717 introducerades i Wexiö trivialskola samt att han 1722 flyttades till »Ringarne». Denna benämning begagnades dels för hvardera årsflyttningen i nederskolans rektorsklass dels för gymnasii båda högre afdelningar. I rektorsklassens »ringar» undervisades L. 1721—23 och på gymnasium 1723—27.

21 Herman Boerhaave, född d. 31 Dec. 1668 i Voorhout nära Leyden, blef från år 1701 såsom lector i teor. medicin fästad vid universitetet i Leyden, hvars ära och stolthet han blef, då han icke ens genom de mest lysande anbud kunde förmås öfvergifva sitt fädernesland. År 1709 blef han professor (»Hoogleeraar») i hygieni och botanik samt 1718 i kemi vid samma univ.; kallades till ledamot af l'Académie Royale des Sciences i Paris 1715 och af Royal Society i London 1730. Död af bröstvattensot d. 23 Sept. 1738.

22 *Institutiones medicæ* in usus annuæ exercitationis domesticos digestæ Leidæ 1708, 1713 och 1720, 8:vo. — »Hunc ad librum fere in omnibus universæ Europæ scholis multos per annos prælectum est.» A. v. Haller: Biblioth. Anatomica, Vol. I. Tiguri 1774. 4:o, p. 757.

23 Ur *Wexiö gymnasii matrikel:* »Rectore Nicolao Krok alio se contulerunt legitima impetrata venia ac condignis Testimoniis discesserunt hinc infra notati. In Majo 1727». Inom parenthes angifvas senare lefnadsöden. »Fridericus Ernesti Seidenzopf (Apologista Scholæ Junecop., deinde Vexion.). Canutus Wigelius (Comminister in Bexheda död 1778). A. Carolus Wigelius (post reditum domi mortuus). Carolus Magni Nydelius (Upsaliæ mortuus). Jonas Ljung (Pastor et Præpositus in Wrigstad mortuus 1771). Samuel

Lindstorphius (Londini eodem anno febri exstinctus). Samuel Allmelin (Comminister in Björkö obiit 1752), Johannes Elgerus (obiit Upsaliæ 1728). Samuel Haquini (O.-gothus). Petrus Trivallius (O.-gothus, Carolus Linnæus (Dr. Med. Prof. Upsal. Archiater Reg. Eques. Nobilis). Sveno Petri Lundgrehn (Comminister in Hultsjö obiit 1769). Sveno Johannis Ljungberg (Comminister in Angelstad död 1769). Nicolaus Spelin (Pastor in Urshult obiit 1755). Johannes Collin (Pastor in Ryssby död 1766). Steno Haraldi Ljungwall (Phil. Mag. Obiit. Upsaliæ 1740). Omnes ex decreto Testimoniis ornati academicis.» — Af de 18 lärjungar, som år 1723 intagits i lägsta flyttningen på Wexiö gymnasium, hade en blifvit från läroverket utan betyg skild såsom »till studier icke fallen», en annan »för förseelser derifrån afvisad», tvenne (Lindberg och Grönqvist) erhållit vanliga afgångsbetyg till univ. år 1726, åtta afgingo nu samtidigt och åtminstone fem dröjde ännu ett år vid läroverket. Bland de 16 år 1727 dimitterade kamraterne hade L. följt sju från skolan; de öfriga åtta synas hafva tidigare intagits på gymnasium. I kamratkretsen intog L. elfte platsen såväl vid uppflyttningen på gymnasium som vid afgången derifrån. L. räknades således af lärarne bland »medelmåttorne.»

24 Isac Munthe f. 1691 på Skårby prestgård, kom upp till Wexiö, der han före 1724 nämnes boende, var handlande och borgare derstädes 1732, kämnär 1734 och en af stadens 12 äldste 1744. Rådman blef han före 1758 och dog af ålderdomssvaghet 1782 $^{10}/_{10}$ 91 år gammal. Rådman M. var en en af Wexiö stads den tiden mest ansedde borgare. Gift 1723 med Catharina Lind, som dog $1728^{28}/_{5}$ i Wexiö; sedan blef M. omgift tvenne gånger. Enligt Ludvig W:son Munthe: »Muntheslägten», 8:vo Helsingborg 1884, s. 64.

25 Dagen för afresan och uppgiften, att L. hade med sig till Stenbrohult sitt afgångsbetyg, strider emot dato för detta. Antingen dröjde L. några dagar till i Wexiö i afvaktan på betyget, eller sändes detta efter honom till hemmet. Var det postdateradt eller föreligger här en misskrifning af nonarum i st. f. Calendarum?

26 Lektor N. J. W. Scheutz i Wexiö har förslagsvis lemnat en Svensk öfversättning i följande ordalag: Herr Rector Magnificus! Likasom naturen inom växtriket erbjuder behagliga skådespel, då den genom växters flyttning från ett ställe till ett annat mera påskyndar deras lyckliga och tidiga tillväxt; så utöfva Muserna på ett särdeles behagfullt sätt sitt välde, i det de bjuda ynglingar med utmärkt begåfning stundom byta om lärosäte, på det att de desto hastigare må kunna omsätta studiernas ljufva nektar i blod och saft. I denna afsigt kalla Högskolans Muser till sig från vårt Gymnasium Carl Linnæus, en synnerligen utmärkt yngling af aktad familj; och på det han hos dem må vara mera välkommen och redan vid första inträdet må kunna ställa sig under deras ynnestfulla hägn, söker han förete intyg öfver sina studier och sitt lefverne. Till den ändan betygar jag, att han i sin vandel här ådagalagt ett gudfruktigt, godt och hedrande uppförande, på sina studier användt oförtröttad flit samt afhållit sig från allt dåligt umgänge. Derföre anbefaller jag hos dig, Herr Rector Magnificus, och i ditt beskydd, i din ynnest och välvilja denne välartade yngling, tjenstvilligt och vördsamt anhållande, att du, på grund af din vanliga bevågenhet emot alla ädla, beskedliga och dygdälskande, behagar upptaga honom bland dina skyddslingar och hugna honom med din ynnest. Din välvilliga och faderliga ömhet skall han aldrig förgäta; håg-

komsten af densamma skall ock jag städse bevara, likasom jag, så länge jag lefver, skall uppsända fromma önskningar för din välgång. Jag förblifver Eders Magnificens' tillgifnaste tjenare

Nils Krok,
Wexiö Kongl. Gymnasii n. v. Rektor.

Wexiö den 6 Maj i frälsningens år 1727.

Att L. sjelf i senare år ur sitt svikande minne lemnat en friare öfversättning häraf i för honom så förklenliga ordalag, att han menade sig vid ankomsten till Lund ej hafva vågat framvisa detsamma (se »Egenhändiga Anteckningar s. 9), är lika väl bekant, som att Wexiö läroverks d. v. lektorer fått med anledning deraf offentligen och enskildt uppbära hårda tillvitelser för sitt sätt att behandla och bedöma sina lärjungar. På samma gång rättrådighet och billighet i fordringarna med skäl framhållas bland lärares främsta pligter, kräfver deras minne ett på omutlig sanningskärlek grundadt domslut. Då dessa L:i lärare visat sig hafva med heder bestått profvet, torde ock de oförtjenta beskyllningarne tystna! — Mot en möjlig invändning, att detta betyg är hållet i så allmänna ordalag, att detsamma blifvit så godt som intet sägande, må det vara tillåtet upplysa, att detta skrifsätt är just det vanliga i den tidens intyg af detta slag, hvarå tydliga bevis finnas uti ännu i original bevarade sådana i Upsala univ:s bibl. Såsom prof må för den deraf intresserade tjena det af Wexiö läroverks d. v. Rektor P. Floderus d. 18 Maji 1726 utfärdade afgångsbetyget till academien för P. Uhr. Utrymmet nekar dock dess återgifvande.

27 »Ifrån 1724 till 1727 var Carls syssla, då han vistades i Stenbrohult, att läsa samt samla örter och insekter. Örterna inlade han i böcker och skref några nota vid dem. Insekterna hade han i ett litet skåp på nålar. I en kista hade han stenar. Mor var dock glad, att han med flit använde tiden på dygd och ej på hvad lastbart var. Fadren befordrade hos henne den tanken. Dels Carls nog hastiga sinne, dels ock att ej hindra honom från hans studium, befriade honom från undervisningen för brodren Samuel.» Sam. Linnæi bref d. 26 Febr. 1778 till Jonas Hallenberg, tryckt af P. Wieselgren i *De la Gardieska Archivet*, Bd. 9. Lund 1837. 8:vo.

28 Carl Papke, född $1681^{1}/_{10}$ i Lund, 1716 prof. i romersk vältalighet vid univ. i Lund, 1730 i logik och metafysik, 1731 tredje, 1733 andre, 1735 förste teol. prof. och domprost, 1738 biskop och prokansler, död $1740^{1}/_{2}$ i Lund. M. Weibull och El. Tegnér *Lunds Univ:s Hist.* B. 2. Lund 1868, sid. 32.

29 Martin Hegardt, född 1685 i Malmö, 1706 fil. mag. i Rostock, 1708 teol. baccalaureus i Greifswald, 1714 der t. dr, 1710 e. o. prof. i hist. ecclesiastica och chronologica sacra vid univ. i Lund, 1716 tredje, 1718 andre och 1728 förste teol. prof., död $1732^{4}/_{4}$ i Lund. M. Weibull och El. Tegnér anf. st. s. 72.

30 Kilian Stobæus d. ä., född 1690 $^{6}/_{2}$, med. d:r 1721, förestod medicinska professionen i Lund 1722 och 1723 under prof. von Döbelns sjuklighet, kallades 1724 till stadsmedicus i Göteborg, men flyttade 1725 tillbaka till Skåne, på Skånska adelns och Malmö stads begäran, hvilka förbundo sig att lemna honom ett årligt läkararfvode; e. o. fil. nat. och fys. experim. prof. vid univ. i Lund 1728, erhöll archiaters namn äfvensom fullmakt såsom ordinarie hist. prof. derstädes 1732, död 1742 $^{13}/_{2}$ i Lund. J. Fr. Sacklén: *Sveriges Läkarehistoria.* Del. I. 8:o. Nyköping 1822, sid. 632—34.

»K. Stobæi hus var n:o 111 vid Storgatan i Lund; i detta hus såg man, ända till dess det för några år sedan ombygdes, en fönsterruta, deri L. med en flintsten skrifvit sitt namn. Namnet, utskuret ur rutan, finnes ännu i en samlares ego». G. Ljunggren, *Inbjudningsskrift till den Minnesfest öfver* Carl von Linné, som *det Carolinska Universitetet firar i Lund den 10 Januari 1878*, Lund 1878, 4:o, sid. 3 noten 1.

31 Michael Bernhard Valentini (Med. Prof. Giess. * 1657 † 1729) *Museum Museorum*, oder der vollständigen Schaubühne frembder Naturalien Th. I—III mit Kupfertafeln fol. Frankf. am Mayn 1704—14. — En handskrift i 4:to, förvarad i Linnean Soc. i London arkiv, med titel: »Caroli Linnæi *Manuscripta Medica* Tom III. *Anatomica continens*», innehåller bland annat Linnæi egenh. anteckningar från Stobæi kollegier, nemligen: *γ Prælect: anatom:* Bromeli, Ribbe et *aliorum* (se nedan not. 46—52); *δ Sciagraphia* Stobæi; *ε Prælect: privatiss:* Stobæi; *ζ Experimenta physiologica* (troligen efter Rothmans föredrag.)

32 Förhållandet emellan St. och L. afspeglas bäst i de åtta originalbrefven från den senare i Lunds univers. bibl. och tryckta af P. Wieselgren i *De la Gardieska arkivet* Del. 9, Lund 1837. 8:vo sid. 213—234 och af utg. häraf i Carl von Linnés *Svenska Arbeten* h. 5. Stockholm 1880. 8:vo s. 8—46.

33 Johan Jacob Döbelius, adl. von Döbeln, född 1674 $^{29}/_{3}$ i Rostock, prof. i medicin vid univ. i Lund 1710, död 1743 $^{14}/_{1}$ i Lund. Sacklén anf. st. D. I. s. 626—32.

34 *Physicam* Budei =? Augustini Buddæi *De musculorum actione & antagonismo.* 4:o Leidæ 1721.

35 Carl Christopher Schnell, Akademi-kirurg i Lund, död år 1771, inemot 83 år gammal, på Snogeholm i Skåne. Sacklén anf. st. D. II. 2. s. 170.

36 Salutem & obseqvium.

37 Arvid Moller, född 1674 nära Dorpt, juris & math. prof. vid gymnasiet i Reval, juris naturæ och moralium prof. vid univ. i Lund 1717, död 1758 $^{6}/_{4}$ i Lund. — M. Weibull och El. Tegnér anf. st. Bd. 2. s. 219. — Enligt G. Ljunggrens förut åberopade *inbjudningsskrift* har Moller i Lunds universitets matrikel vid Linnæi namn antecknat: »Parochi filius in Stenbrohult, annorum XX, Gymnasium frequentavit Wexionense, Musis Carolinis valedicentem testimonio Academico munivit Arvid Moller a. 1728 d. 6 Sept.» — L:i i texten intagna afskrift af detta testimonium lider af åtskilliga skriffel, hvilka för menings vinnande blifvit med så lätt hand som möjligt ändrade; det lyder i öfversättning: »Gunstige Läsare. Helsa och Tjenstvillighet. Icke illa synas de se till godo sitt eget och det allmännas bästa, hvilka tilltro sig kunna genom dylika vetenskapliga sysselsättningar befrämja fäderneslandets fördelar. Den nog korta lifstiden tillåter nemligen icke dem att sysselsätta sig med fåfängliga eller främmande och för det lefnadskall, hvartill de bestämt sig, föga gagneliga arbeten. Denne, som nu härifrån företer detta bref och framdeles ämnar offentligen undervisa, den väl öfvade och synnerligen begåfvade Hr Carolus Linnæus Småländing, vände genast efter sin ankomst till vår Carolinska akademi, lemnande annat å sido, sin håg åt medicinens studium, i hvilket han äfven till ledare gjorde det lyckliga valet af Hr Medicinæ Doctor Kilian Stobæus. Då han nu har beslutat att från denna akademi, dit han förra året ankom, afgå till den i Upsala, för att bringa sitt här började medicinska

studium der till rätt mognad och tillika önskat denna sin föresats bekräftad med vårt intyg, hafva vi icke velat och icke bort afslå hans höfliga begäran och brista i vår skyldighet, utan fast mer betyga vi i kraft af vår närvaro (vårt nuvarande embete eller såsom åsyna vittne), att Hr Linnæus så uppfört sig vid denna högskola, att han icke mindre genom flit än sedligt lif gjort sig älskvärd för dem, med hvilka han blifvit bekant. Till följd häraf utbedja vi af den odödlige Guden äfven åt honom vid hans afgång lycka och framgång i alla företag och hans aktningsvärda sträfvanden anbefalla vi så kraftigt vi förmå hos vetenskapernas målsmän och gynnare. Lund d. 6 Sept. 1728. Arvid Moller. Kongl. Carolinska Akademiens n. v. Rektor.»

38 »Föräldrarne undsätta sin son med 100 daler silfverm:t, med ett för alt, som de sedermera icke vidare kunde bispringa honom.» Det torftiga fädernehemmet med fyra yngre, delvis ännu alldeles ouppfostrade, syskon förmådde ej göra större uppoffringar, och fadren sjelf hade »vid sin afresa till Carolinska academien i Lund år 1699 ej haft mer än 1 daler 8 öre silfverm:t till respengar från hemmet, utan tanka om transporter.»

39 I *Upsala Univ. Matrikel* 1711—1744 finnes antecknadt: (trol. af d. v. Rektor Prof. J. Hermansson): »1728 Sept. 23 Carolus Linnæus Smolandus ex Academia Lundensi.» — Den vid universitetet i Upsala studerande »*Nationis Smolandicæ Acta* 1706—1760» innehålla:

»A:no 1728 Den 25 Sept. anmälte sig Studiosus från Acad. Carolina i Lund D:nus Carolus Linnæus at blifwa antagen, h:ket wan sin fulbordan, sedan han 27 d:r kopp. til Fiscum nat. contribuerat.»

»A:no 1728 den 13 November — — Blef D:nus Carolus Linnæus med de öfrige Messiurs Stålhös, Kielman, Klintin, Fontén, Tegnelin, Rosbeck och Alanus i nations albo immatriculerade, hwar på de alfwarl. til alt dygdigt lefwerne och flit i Studier blefwo af Högädle Hr Inspectorn förmante.» — Enligt vedertagen praxis fick Linnæus räkna sig till godo studietiden i Lund, hvarigenom han ock enligt beräkning slapp ifrån det genom penalismen för novitierne synnerligen betungande besväret att passa upp de äldre landsmännen. — I nationens album eller matrikel återfinnas ock af L:i egen hand: »14. Carolus Linnæus *antea civis Lundensis Upsaliam accessit die 5 Sept. 1728.*» Detta är inflickadt emellan »Johannes Elgdahl Upsaliæ obiit 1728», hvilken inskrefs 1727 Aug. 30 och »Andreas Hagerth Corporal vid gardet obiit 1738», inskrifven [1727] Nov. 16. Den 19 Aug. 1727 inskrefs Linnæus af rektor i Lunds universitets och egenhändigt i fil. fakultetens matriklar. Hvilken månad 14 före Carolus Linnæus i *Smål:s nations i Upsala album* har afseende på, kan derföre ej bestämmas.

40 Johan Hermansson, född 1679 $^{23}/_{12}$, Skytteansk prof. i vältalighet och statskunskap vid univ. i Upsala, inspektor för Smålands der studerande nationsförening från 1718 till sin död 1737 $^{9}/_{2}$ i Upsala.

41 Ol. Rudbeck d. y., född 1660 $^{15}/_{3}$, med. d:r i Utrecht 1690, utnämnd 1692 till medic. och botaniees prof. vid univ. i Upsala, i survivance efter sin vidtberömde fader, vid hvars död 1702 han blef ordinarie, upphöjd i adligt stånd 1719, arkiater, död 1740 $^{23}/_{3}$ i Upsala.

42 Om Ol. Rudbecks *Fogelbok* se »Carl von Linnés *Svenska Arbeten*» häft. 1, Sthlm. 1878 8:o, brefvet n:o 53 noten 4 och häft. 5, Sthlm 1880, brefvet n:o 249.

43 Lars Roberg, född 1664 $^{24}/_{1}$ i Stockholm, med. d:r i Leyden 1689, prof. i praktisk medicin vid univ. i Upsala 1697, erhöll nådigt afsked 1740, död 1742 $^{21}/_{5}$ i Upsala.

44 Christian Johan Lange: *Opera omnia medica theoretico-practica*, a Rivino edita Lipsiæ 1704. fol.

45 10 daler silfvermynt hvart halfår.

46 Magnus Bromelius adl. von Bromell, född 1679 $^{26}/_{3}$ i Stockholm, med. dr. i Rheims 1703, medlem af collegium medicum i Stockholm 1705, anatom. prof. derstädes 1716, assessor i bergskollegium 1720, arkiater och præses i colleg. med. 1724, död 1731 $^{26}/_{3}$ i Stockholm. Sacklén: Bd. 1. s. 35.

47 Johan Christopher Heyn adl. Nordenheim, född 1681 $^{15}/_{12}$ i Stockholm, med. dr. i Harderwik i Holland 1704, fältmed. vid Svenska armén, hemkommen 1707 blef han genast assessor i coll. med., informator för barnmorskorna 1724, k. lifmedikus 1731, död 1740 $/_{5}$ i Stockholm. Sacklén: Bd. 1. s. 77.

48 Constantin Soëm, född i Amsterdam, med. dr. i Harderwik 1721, assessor i coll. med. 1723, k. hofm. 1731, stadsfysikus i Stockholm 1739, död derst. 1748 $^{28}/_{3}$. Sacklén: Bd. 1. s. 91.

49 Carl Alstrin, född 1686 i Leksand i Dalarne, med. dr. i Angers, assessor i coll. med. 1725, k. hofm. 1734, lifmed. 1741, höll sedan några år föreläsningar för Stockholms barnmorskor, död 1750 i Stockholm. Sacklén: Bd. 1. s. 92.

50 Att likköpningar då voro en sällsynthet, visar sig ej blott af L:i extra resa till hufvudstaden, der han för den skull oaktadt sin svaga kassa uppehöll sig nära en månad, utan af sjelfva collegii medici protokoller, då man var mån om, dels att få materialet färskt, dels att deraf draga all möjlig nytta vid undervisningen. Härom d. 9 Dec. 1728: »Orsaken til sammanträdet war, at man skulle komma öfwerens, huru anatomien skulle indelas och hwad partes hwar och en skulle företaga sig at demonstrera, och som man war underrättad, at dommen nu war fallen för syndaren och samma i anledning deraf skulle komma at exsequeras för helgen, ty kom man öfwerens, at bref till Kongl. Maj:t skulle afgå med underdånig begiäran, at med exsecutionen måtte innehållas til efter nyåhret, på det man då anatomien så mycket beqvämare måtte kunna förrätta»; och d. 8 Jan. 1729: »Hwad poletter anbelangar, skulle alla mäster fältskiärer få fripoletter med Collegii stora sigill i antahl til 18, hwilka sändas til Directeuren Riben, dessutom skulle alla doctorer få frisedlar. Om den publica anatomien skulle publiceras. Priset sättes uht til 16 dl:r.»

51 Nils Boy, född 1683 i Stockholm, med. dr. i Harderwik 1709, fältmedicus i Skåne, prov. med. i Nerike 1715, stadsfysikus i Stockholm och assessor i coll. med. 1724, amiralitetsmedikus i Sthlm 1737 till sin död 1739 $^{1}/_{1}$. Sacklén anf. st. Bd. 1. s. 89.

52 Evald Ribe, född 1701 $^{25}/_{7}$ i Stockholm, med. dr. i Rheims 1725, k. hofmed. 1726; såsom prof på sina under vidsträckta utländska resor förvärfvade kunskaper höll han i 2 års tid i Stockholm enskilda föreläsningar i anatomien, äfvensom på stadshuset några offentliga öfver hjernan och ögat; k. lifmed. 1731, arkiater och præses i coll. med. 1740, adlad 1746, död 1752 $^{8}/_{10}$ i Stockholm. Sacklén: Bd. 1. s. 40.

53 »Kirurgen Möller fick 300 dl:r kp:mt för sitt omak». Collegii medici protokoll d. 27 Febr. 1729. — I Sacklens *Läkarehist.* I. s. 866 kallas han

Ernst Fredrik Müller, var bördig från Schlesien, blef ledamot af kirurgiska societeten i Stockholm 1728 och dog i Stockholm 1741.

54 Aristoteles. *De Historia Animalium* lib. 9 latine, Theodoro Gaza *interprete; una cum libris de partibus et generatione Animalium, problemata*, et Theophrasto *de historia et causis Plantarum.* fol. Venetiis, 1513.

55 Olof Celsius d. ä., född 1670 $^{19}/_{7}$, teol. dr. och domprost, död 1756 $^{24}/_{6}$ i Upsala. — Någon *Flora Uplandica* af Celsius är icke utgifven, men väl en »*Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium Catalogus*», införd i *Acta Literaria et Scient. Suec.* Tom. III för år 1732. 4:to Upsala 1735. s. 9—44 med ett tillägg i Vet. Akad:s Handl. 1740 s. 299—303. — Celsii hufvudverk är: *Hierobotanicon sive de Plantis Sacræ Scripturæ* T. I—II 8:vo Upsaliæ 1745—47.

56 »*Disputatio Medica de duplici Progressivo & Intestino* Sangvinis Motu *habita coram Alumnis Regiis, Magnatum aliorumque Civium.* Anno 1728 die 30 Oct. Upsaliæ.» Måhända upptogs samma disp. till förnyad ventilering d. 29 Mars 1729.

57 P. Sandel, född 1709 i N. Amerika (son till pastorn vid Svenska förs. i Wicacao, slutl. prosten och kyrkoh. i Hedemora A. Sandel), regementspastor vid Dalreg:tet, död 1752 $/_{5}$.

58 Johan Humble, född 1707 $^{22}/_{11}$ i Upland, regementsfältskär i Finland och Pommern, död 1774 i Wasa. Sacklén: Bd. 2. 1. s. 389.

59 Mårten Triewald, född 1691 $/_{11}$ i Stockholm, kapten-mekanikus vid fortifikationen, död 1747 $^{8}/_{8}$ i Stockholm. — *En af k. vetenskapsakademiens stiftare.*

60 K. Vetenskaps Societetens i Upsala protokoll för den 1 Octobr. 1729 § 3 lyder: »Proponerade Hr Dr Celsius at man kunde af Societetens medel lemna til Studiosus Medicinæ Linnæus, thet han påkostat sig på resan til Gräsön at upsöka rara örter ther sammastädes, hwilket af Societeten blef bewiljat til 3 plåtar eller 18 dl:r kp:mt.»

61 Följande år, i Augusti 1730, besökte L., åtföljd af prof. Ol. Rudbecks yngste son i andra giftet Johan Olof, åter Börje för att få tillfälle noga iaktta denna växt i både blomma och frukt i och för en akad. disputation »*de Planta Sceptrum Carolinum*», hvilken under prof. L. Robergs præsidium af denne J. O. Rudbeck offentligen försvarades i Upsala d. 19 Juni 1731, hvarvid han ock uppgifver sig såsom författare. En i senare tid återfunnen, nu i Upsala univ:s bibl. förvarad, egenh. handskrift af L. på svenska, ehuru under titel: »Caroli Linnæi *Dissertatio Botanica de Planta Sceptro Carolino dicta*», bevarar dock å titelbladets baksida följande märkliga anteckning: »*Denna Disputation hafwer jag på en dag samman-skrifwet för 30 dl:r kp:mt, därför har en annor fåt hedren*».

62 Såsom förut nämts utkom aldrig någon annan *Flora Uplandica*, än Ol. Celsii i *k. vet. societetens acta* för år 1732 p. 9—44 tryckta »*Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium Catalogus*», men någon beskrifning på dessa trenne växter finnes ej der. Sådana äro införda i Linnæi *Flora Lapponica* för *Sceptrum Carol.* p. 197—201. sp. 243 tab. IV. f. 4, för *(Mesomora) Cornus herbacea* p. 36—41. sp. 65. t. V. f. 3. och för *(Dortmanna) Lobelia* p. 227. sp. 279. — Om *Mesomora* jfr noten 87.

63 I bref till K. Stobæus d. 23 Juni skrifver L.: »jag har haft att beställa hoos Doctor Celsius dagl., förutan nu sista weckan dubbelt, då han gifte bort sin dotter.» — »Pastoren wid Kongl. Maij:ts lif-guardie den ärewördige

och höglärde herren, herr mag. ISRAEL BIÖRCK, ingick med den högäreborna och dygdädla jungfrun, jungfru MARGARETA CELSIA, ett christeligit ächta förbund i Upsala den 19 Juni 1729.»

64 Den 25 Mars 1730 äfven i bref till STOBÆUS: »Jag skickar ock innelyckt ett litet insectum, som jag håller rätt sälsamt, hwilket är fuller ett species af de gambles *Cimices sylvestres*, fast dett icke har några wingar. Jag kallar dett själf *Orsodachna* dorso faciem humanam repræsentans. I förstone fant jag bara ett, men sedan jag lärde, att dett war så godt sambla insecta om wintren under muscis arboreis som om sommaren har jag fått många.»

65 30 daler silfver:mt hvart halfår.

66 Jfr »*Egenhändiga Anteckningar* af CARL LINNÆUS om sig *sjelf med anmärkningar och tillägg*» (af ADAM AFZELIUS). Upsala 1823 4:to s. 15 och 104 samt »LINNÉS *Svenska Arbeten*» h. 5 s. 25.

67 Den här angifna titeln och formatet öfverensstämma ej med den egenhändiga handskrift af L. med tillegnan till OL. CELSIUS d. ä. den 1 Jan. 1730, hvilken i original förvaras å Upsala univ:s bibl. och hvarom TH. M. FRIES lemnade en redogörelse i Bil. M. *til Förhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres syvende Möde i Christiania* 1856, Christiania 1856 8:vo s. 283—288. — Jfr LINNÉS *Svenska Arbeten* h. 5. s. 22, 24, 29 och 31.

68 Dagen före »Jubelfesten till Åminnelse af den Augsburgiska Trosbekännelsens öfverlemnande till kejsar Carl V firades och begecks öfwer hela Sweriges Rike then $^{14}/_{25}$ Juni 1730.»

69 OL. CELSII d. ä:s gård, ett arf efter fadren, math. prof. MAGN. C., låg i hörnet af Nya Brogatan och Gamla Långgatan enligt en copia af »Geom. Delineation öfver Upsala Stadh af STEFFAN BOOMANN 1671» med senare tillägg. Den skulle således varit belägen i närheten af den nuvar. Jernbrogatan öster om ån, ej långt från den gamla akad. trädgården, der väl OL. RUDBECK d. y. bodde, sedan han blifvit fadrens ordinarie efterträdare och då deras egen gård i nuvar. Kungsängen nära Stora torget nedbrändes 1702.

70 Söner i tredje giftet. I Upsala univ:s »Album Studiosorum» inskrefvos 1731 den 7 Augusti:

»ALEXANDER RUDBECK
ADOLPHUS RUDBECK } Nobiles Fratres.
Sub moderamine D:ni CAROLI LINNÆI Smol:»

71 Införd här nedan.

72 Q. F. F. Q. S. *De* SALMONUM NATURA *Eorumque apud Ostro-Bothnienses Piscatione Quam Consensu Ampl. Fac. Med. in Reg. Upsal. Acad. Præside Experientissimo & Amplissimo Viro* D:no LAURENTIO ROBERG, Med. Doct., Theor. & Pract. Profess. Ord., Publico Eruditorum examini modeste submittit Alumnus Regius DANIEL BONGE, Uloa-Ostrobothniensis. In Audit. Gust. Maj. ad diem 23 Juni MDCCXXX Upsaliæ, Literis WERNERIANIS. p. 8 + 27 + 1. 4:to.

73 CLAES SOHLBERG, född 1711 $^{13}/_{4}$ i Falun, LINNÆI följeslage först på resan genom Dalarne 1734 och följande år till Holland, med. dr. i Leyden 1735, stadsfysikus och bergslagsläkare i Filipstad, död 1773 $^{22}/_{9}$ på Östanäs i Wermland.

74 PETER LEETSTRÖM, född 1712 $^{1}/_{3}$ i Carlskoga, med. dr. i Harderwik 1733, assessor i coll. med. 1739, k. hofmed. 1747, död 1748 i Stockholm.

75 ? Theses miscellaneæ disceptatæ coram Alumnis Regiis, Magnatum aliorumqve Civium Anno 1731 die 14 Aprilis Upsaliæ. 7 sid. 12:mo.

76 I Linnean Society i London finnes: »Caroli Linnæi Smol. Demonstr. pl: in Horto Ups. *Prælectiones Botanicæ Publicæ Institutæ in Horto Botanico Academico et publico Upsaliensi* a *3 Maji ad 24 Jun. Anni 1731. Ventilatæ singulis horis a meridie 4:tis, exceptis diebus lectionibus publicis destitutis. Loco Generos: Professoris D:ni* Olavi Rudbeckii.» Mss. in 4:to.

77 Lindansare.

78 B. C. D. *Dissertatio Gradualis* de Ingrato Cuculo *Quam Suffragante Ampliss. Senatu Philos. In Athenæo Upsaliensi Sub Præsidio Viri Amplissimi Celeberrimique Mag.* Andreæ Grönwall Phil. Pract. Prof. Reg. & Ordin. Publicæ censuræ subjicit S:æ R:æ M:tis Alumnus Thomas Jerlinus Sudermannus die 24 Maji Anni MDCCXXXI Loco & horis consvetis. Holmiæ Typis Wernerianis.» Titelblad, 7 sid. tillegnan, 16 sid. text i 8:vo min.

79 Andr. Grönwall, född 1671 $^{29}/_{7}$ i Dalarne, 1719 eth. & polit. prof. i Ups., död derst. 1758 $^{20}/_{2}$.

80 Thomas Jerlin, fil. mag. i Upsala 1731, kyrkoh. i Ytter-Sellö (Selaö) förs. af Strengnäs stift 1738, död 1766 $^{11}/_{2}$.

81 Efter föreläsningarnes slut åfreste L. med prof. Rudbecks postjakt till Stockholm, dit ankomsten torde hafva skett midsommardagen. Jfr »Linnés *Svenska Arbeten*», h. 5 s. 41.

82 Johan Conrad Warmholtz, född 1673 i Halberstadt, fick 1705 genom gifte med apotek. Allmachers dotter apoteket Markattan i Stockholm, död derst. 1745 $^{1}/_{9}$. — L. hade 1730 i Upsala lemnat enskild undervisning åt deras son, Carl Gustaf, det som bokkännare senare beryktade Hofrådet. I Linnean Society finnes följande egenh. anteckning af Linnæus:

»Collegiæ pg:r per somarterminen 1730.

H:r Baron	StiernCrona	18	
Wälborne	Blixenstierna	3	hårpung.
		18.	
Wälb:	Olaus nep. Rudbeck	9.	2 alnar swart kläde.
		9	1 p. halfarmar, skor, handskar.
		2.	1 armkläde.
		6	pengar.
D:nus	Stromer	8.11.	contant.
	Elvius	8.11.	
	Warmholtz	18	C. Bauhini pinax.
		18.	contant.
	Solberg	8.	Alberti semiologia.
		6.	1 par strumpor.
	Letström	6	1 hatt.
		16	1 granat knappar.
		1	1 petsier.
		9	
	Galle	9.12.	
	Voitlender	24	Essent. en gång.
		18	♀
	Olaus fil. Celsius	1.16	essen. en gång.»
		152	

Linnæi svaghet i räknekonsten framgår häraf, som ofta annars; jfr för öfrigt L:i bref till K. Stobæus d. 1 Sept. 1730, der L. säger: »I November höll jag *collegium uti botanicis* och hade många af adelsmännerne och baroner, förutan många andra. Jag fick mest 1 Sp. Ducat af hwar.»

83 I Salems socken, ett par mil sydvest om Stockholm. Bekant är ass. Joh. Linders *Flora Wiksbergensis*, Stock. 8. 1716, omtryckt 1728.

84 Häraf vill det synas, som L. antedaterade företalet till sin »*Adonis sive Hortus Uplandicus*» till d. 23 Maj 1731, då han först nu hade rätt tillfälle göra sig mera bekant med trädgårdarne i Stockholm och dess omgifningar.

85 Om denna Linnæi yngsta, minst kända syster Emerentia finnes i Stenbrohult följande biogr. uppgifter: född 1723 $^{27}/_{6}$, döpt $^{7}/_{7}$, gift 1749 $^{29}/_{9}$ med kronobefallningsmannen i Sunnerbo härad eller häradsfogden Carl Ammon Branting, död efter barnsäng 1753 $^{11}/_{5}$. Hennes enda öfverlefvande barn, dottren Christina Regina blef gift med qvartermästaren Hultstein.

86 Jfr »Linnés *Svenska Arbeten*» h. 1. s. 77—89; h. 5. s. 41—46 och s. 71—77.

87 *Cornus herbacea* L. *Fl. Lapp.* sp. 65. p. 36—41. tab. V. fig. 3, *Cornus suecica* L. *Spec. pl.* ed. II p. 171. — Någon annan uppsats häröfver af L., än i *Fl. Lapp.*, eller någon särskild sådan af honom finnes icke i tryck och har icke i handskrift kunnat uppspåras. Consist. Acad. Ups. protokoll 1732 $^{17}/_{4}$ bestyrker dock planen: »Angaf Hr Doctor Roberg materias disputandas — — — de *Cornus herba* af Linnæus.» Ej heller har någon annan utförligare beskrifning deraf utaf Joh. Jac. Dillenius kunnat framletas, än i hans *Hortus Elthamensis*, Lond. 1737 fol., p. 108 med tab. 91 fig. 107: *Cornus pumila herbacea, Chamæpericlymenum dicta.* Der lemnas ock utdrag ur ett bref 1731 $^{29}/_{7}$ från Ol. Celsius, som på begäran meddelar sina iakttagelser: »Flos quatuor petalis majoribus albis, flosculos perplurimos, suis singulos pediculis insidentes, continet, eosque tetrapetalos, obscure purpureos, suis cum staminibus, apices luteolos gerentibus, & pistillo in medio nigello, unde fructus formatur, in *Catalogo* meo descriptus.» Scripsit nempe Clar. vir *Floram Uplandicam*, sed typis nondum exscriptam, cujus etiam ante aliquot annos pro humanitate sua copiam fecit, in qua sequentia habet: »*Mesomoræ* flos est tetrapetalus, regularis, nudus, rosaceus» (perianthium olim cum Clusio & Rajo pro flore habuit) »embryones in medio continens, qui in baccas excrescunt plurimas, simplices, globosas, singulas singulis petiolis insidentes. Cuivis fructui ossiculum inest unicum, cordiforme, septo intermedio osseo in duo loculamenta, singula unicum nucleum continentia, divisum.» Ex quibus quis *Corni* esse speciem amplius dubitet? Accedunt folia, quæ figura & venis suis *Cornum* non male repræsentant. Porro non tantum hujus plantæ specimina belle siccata cum floribus & fructu, sed & imaginem præterea idem misit, quam, quoniam Clusii figura fructum male repræsentat, flore autem plane destituitur, æri ut incidatur, eo magis dignam judicavi. — Då Linnæus enligt anteckningen härofvan »gaf beskrifning på *Sceptrum Car: Mesomora* och *Dortmanna* uti *Flora Uplandica* 1729 $^{8}/_{9}$», torde den till Dillenius lemnade diagnosen vara Linnæi och ej Celsii.

88 Jfr L:i dagbok öfver *Lappska resan* härnedan.

89 Consist. Acad. majoris i Upsala protokoll 1732 $^{18}/_{11}$ lemnar om omröstningen till dessa stipendiimedels erhållande följande upplysning:

»Prof. Beronius voterade på Studenten Carl Linnæus Smol. så för des stora medellöshet, som des ogemena progresser uti studio Botanico och de

öfrige delar af Medicinen, hwarföre han och redan af experientissima facultate medica fått veniam publice docendi».

Proff. Winbom och Klingenstierna = Beronius.

Prof. Herrmansson »faller med sit voto på Linnæus 1) såsom ganska fattig och medellös 2) såsom den der med beröm förrättat Prof. Rudbecks Lection i Botaniquen 3) nyl. giort en resa op til Lapmarken och derifrån hämtat mycket så i physiqven som andra saker, som märkel. kunna illustrera Historiam Patriam.»

Proff. Nesselius och Wallrave = Herrmansson.

Dr Schyllberg hade tänkt rösta på en annan, »men som Linnæus finnes wara ingenio singulari och så til säjandes seculari, är derhos ganska fattig och så wida avancerat i sina studier, at experientissima facultas medica erkänt honom god at någon tid förwalta i Wälborne Pr. Rudbecks ställe des Profession, så kan han intet annat än bifalla des begiäran.»

D:r Wallin, Celsius och Rektor [Prof. E. M. Melander] = Schyllberg.»

Linnæus fick sålunda pluralitet. Hans medsökande, Cand. Murén Gestr. fick blott 3 röster. — 1733 $^{14}/_{2}$ »Murén beswärar sig i en otidig inlaga, hwarför han af consistorium skall skrapas.»

I »*Egenhändiga Anteckningar*» omtalas s. 20, att L. fick detta stipendium »igenom prof. Wallraves gunstiga bemedlande, hwarigenom L. för första året åtnjöt 30 plåtar, men sedermera intet»; s. 106 uppgifves beloppet »första halfwa året 8 Ducater, men sedermera intet för betjenternas otrohets skull.» Detta omdöme af L. var så mycket mer förhastadt, som enligt »Wredianska» stipendiistiftelsens urkund årliga mindre afdrag skola göras å beloppen för de så kallade hemrummen, för att derigenom tillfälle må beredas stipendiaterne till utländska resor. Detta tillfälliga understöd får ej heller lemnas åt någon annan, än den, som förut innehaft hemrum, och utbetalas på en gång hela den gjorda besparingen. Orätt var således, såsom stridande emot donationsbrefvet, att L. fick någon andel af dessa »öfverskottsmedel», då han icke innehaft hemrum och icke nu ens reste utrikes. Att de måhända tillerkändes honom såsom ersättning för enskilda penninguppoffringar under Lappska resan, hjelper således ej heller saken. Förmodligen fans ingen ledighet till någotdera af de två hemrummen. — Om L:i stipendier under hans Upsalatid se »Linnés *Svenska Arbeten*» h. 5. s. 26 och 27.

90 Enligt »*Egenh. Anteckningar*» s. 19 »lärde L. af Bergmästar» [Seger] »Swanberg i Calix på 2 dagar och en natt Proberkonsten.» — I Linnæi *Iter Lapponicum* uppgifves, att L. den 4 Sept. »kom till Biörknäs» (i Neder Kalix socken) »att lära proberkonsten» och den »14 uti kulit och regnachtigt wäder reste från Biörkenäs.»

91 Såsom »secretarius nationis» förde L. protokollen 1733 $^{4}/_{4}$—$^{21}/_{10}$, hvilka ännu finnas i nationens ego och förvar. Af »Nationis Smolandicæ Cassa Räckning från den 23 Juni 1732 til den 16 Junii 1733» framgår, att »Herr Linnæus emot Silfwerpant fått låna 30 dl:r kp:mt» och i räkenskaperna närmast före d. 15 Maj 1734 läses: »Herr Carl Linnæus inlöst sin obligation på 30 —». *Festen till* Carl von Linnés *Minne i Upsala den 10 Januari 1878. Smålands Nations Minnesfest*, af G. A. Aldén, s. 179 noten.

92 Under detta namn förcligga i Linnean Society's i London arkiv tvenne särskilda egenhändiga handskrifter af Linnæus. Den äldre och sannolikt här åsyftade omfattar 16 onummererade sidor + 160 talmärkta + 3 onum. och är på

många ställen interfolierad med dubbla blad, hvarjemte en hel mängd lösa sådana finnas. Den är i 8:vo min. och bär följande titel: »CAROLI LINNÆI *Dicta Naturalis comprehensa.* Regulis 70 aphoristice cum scholiis et demonstrationibus autopticis, principiis Zoologicis deductis, composita; in qva hominem animal esse demonstratur et agnoscitur, eumqve animalium more vivere debere docetur et probatur; hinc staturæ naturalis et fere integritatis cujusdam rudera possibilia docentur. Ex principiis Zoologicis variorum animalium, Staticis SANCTORII, KEILLI, Oeconomicis variarum gentium, Experimentalibus longævorum, Naturalibus detectorum, Mechanicis medicorum, Theologicis veteris et novi testamenti.» Den är icke dagtecknad men tillegnad »Sacræ Regiæ M:tis Summo Fidei Viro Illustrissimo Excellentissimoqve D:no GUSTAVO CRONHIELM Regni Sveciæ Senatori Regiæ Cancellariæ et Justiciæ Comissionis Præsidi Academiæqve Upsaliensis Cancellario magno.» (Grefve G. CRONHIELM dog år 1737). — Den andra handskriften från en senare tid bär titeln: »CAROLI LINNÆI Med. & Botan. Profess. Upsal. *Lachesis Naturalis*, qvæ tradit DIÆTAM NATURALEM innixam observationibus et Experimentis desumtis ex historiis, casibus, observationibus, populis, itineribus, physiologia, therapia, physica Zoologica, ubi omnes demonstrationes innituntur observationibus» (Sigill med omskrift: »Tantus Amor Florum» i rödt lack) »*Philosophia Humana. Nosce te ipsum.*» Handskriften, som är odaterad, omfattar 330 sid. i folio.

93 »*Dissertatio Medica Inauguralis, in qva exhibetur Hypothesis Nova de Febrium Intermittentium Causa.*» Harderovici 1735, 24 sid. 4:to. — Märkligt är, att L. redan i Aug. 1733 hade valt detta ämne för och började utarbetandet af den disputation, han »pro gradu doctoratus summisque in Medicina honoribus & privilegiis rite & legitime consequendis» först d. 23 Juni 1735 offentligen försvarade i Harderwik.

94 Uti J. G. ACRELS præsidiital i k. vet. akad. 1796 »om läkarevetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala.» Sthlm 1796 8:vo s. 139 säges: »År 1733 började L. hålla *föreläsningar i Proberkonsten* med et ansenligt antal studerande och förtjente derigenom sit nödtorftiga underhåll», samt i en not å samma sida: »Ibland dess åhörare voro unge KLINGENSTIERNA och OELREICH, Adjunct. ROSÉN, bägge grefvar FERSEN, Mag. MENNANDER, Mag. Docens STAF, Vice Adj. P. PREUTZ, Guldsmeden SILFVERLING, utom Studerande; med detta och följande årets *Docimastiska Collegium* förtjente han, enligt sin egenhändiga annotation, 413 Riksdaler.» De anteckningar, en af dessa åhörare, magist., sedan prof. och biskopen i Åbo slutl. erkebiskopen CARL FREDRIK MENNANDER, förde, finnas nu i kongl. bibl. i Stockholm: »*Manuscripta Mennandriana*» Vol. I 4:o. Huruvida dessa förskrifva sig från L:i enskilda lektioner för M. ensam, eller från ett allmänt kollegium, kan ej afgöras. Dessa anteckningar gjordes nemligen d. $^{31}/_{7}$, $^{2}/_{8}$, $^{6}/_{8}$, $^{10}/_{8}$, $^{13}/_{8}$, $^{18}/_{9}$, $^{20}/_{9}$ 1733, då L. åter säger sig hafva hållit sitt *Collegium Docimasticum* i Upsala Oct.—Dec. s. å. — De anteckningar, L. utarbetat och nu (1733) följde, förvaras i original i Linnean Society's arkiv. Egenh. handskriften, 68 sid. 4:o, bär följande titel: »CAROLI LINNÆI *Vulcanus Docimasticus. Collegium Docimasticum*, in qvo *Ars Docimastica* vulgo *Prober-Konsten* dicta brevissime & dilucide proponitur cum instrumentis, materialibus et processibus generalibus ac specialibus nec non cautelis, observationibus et variationibus cum Appendice de Re Nummaria habitum coram curiosissimis naturæ indagatoribus Upsaliæ 1733. Ju simplare, af lika usu, ju bätre.» — Att L. följande år (1734) på

särskild uppmaning höll ett liknande kollegium i Falun är af hans *»Egenh. Anteckningar»* p. 22 bekant. En egenhändig handskrift i 4:to, af L. för detta ändamål särskildt nedskrifven, finnes ock i Linnean Society's ego under följ. nu något förändrade titel: »Caroli Linnæi *Vulcanus Docimasticus*, hwilken föreställer *Prober-Konsten* kort och tydeligen till des Instrumenta primaria et secundaria, Materialia simplicia et præparata, Processus generales et speciales med Cauteler, Observationer och Variationer 1734 Octobr. Fahlun»; och på titelbladets baksida: »Catalogus eorum qvorum impensis ab auctore conscriptus est Vulcanus hic Anno 1734.

Geometr. subterraneus	Hartman Albrecht	Nericius	13	dl:r ☽mynt
Studiosus Metallurg.	Junkhaus Christoph.	Norvegus	13	
— Medicin.	Sohlberg Claud.	♀mont.	12	
— Numer.	Sohlberg Jonas	♀mont.	12	
— Philos.	Fahlstedt Ingel	♀mont.	13	
— —	Hedenblad Petrus	♀mont.	13	
— —	Bergström	♀mont.	13	
— Metallurg.	Uhr Andr.	♀mont.	12	
		Suma	101.»	

Under ett lekande företal står: »Dabam Fahlun 1734 Carl Linnæus.» Häraf finnas i vårt land åtminstone tvenne afskrifter: en i Wexiö gymnasii- och stiftsbibliotek förvarad handskrift N:o 211 i 4:to 85 sid. (utan företal) och en från senare tid (sedan L. år 1747 blifvit led. af vetensk. akad. i Berlin) 100 sid. 4:o i Bergii till k. svenska vetensk. akad. skänkta boksamling.

Ännu en *egenhändig* Linnéansk *handskrift* i *mineralogi* 196 sid. 8:vo min. förskrifver sig från denna tid, nemligen första utkastet till *Regnum Lapideum* i *Systema Naturæ*. Titeln är: »Caroli Linnæi *Pluto Svecicus*, qvi e Regno Subterraneo supra mille Naturalia Lapidea per Provincias Svecicas præsertim collecta promit. Qvæ omnia Systematice digessit in Classes, Ordines, Genera, Species cum characteribus, divisionibus, definitionibus, differentiis additis. Synonymis Auctorum, Proprietatibus Vulcani, Usibus Oeconomi, Locis Geographi. Dalekarl. Fahlun 1734 Sept. 2.» Den eges af Upsala universitets bibliotek. Om dess förvärfvande och dess innehåll se Th. M. Fries: *»Om några nyligen upptäckta* Linnéanska *Manuscripter»*. Bil. M. *til Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres syvende Möde i Christiania* 1856, Christiania 1856. 8:vo, sid. 282, 292, 293; samt Eug. Svedmark: *»Om* Linné *såsom mineralog», Festen till* Carl von Linnés *Minne i Upsala den 10 Januari 1878*, Upsala 1878. 8:vo, s. 142—157.

95 och **96** Berättelser eller dagböcker, förda af Linnæus under dessa båda resor till och uti Dalarne, skola inflyta i en senare del af detta arbete.

CATALOGUS
PLANTARUM RARIORUM
SCANIÆ

ITEM

CATALOGUS
PLANTARUM RARIORUM
SMOLANDIÆ

CONSCRIPTUS

A

CAROLO LINNÆO, SMOLANDO,

BOTANOPHILO.

Kort upsats på de species, som jag funnit uti Skåne, mäst på Slätbygden kring Lund, i somras, då jag där war. Jag kan eij näka med mindre många äro utelämnade, som jag dels icke haft tillfälle komma om, dels warit och äro mig ännu obekanta; eij häller tänkte jag på någon Catalog, då jag där war.

Jag tors icke näka, att några Errata inkommit, ty dett kan eij annorledes ske, hälst som jag aldrig warit så lyckelig, att jag ägt någon information uti Botanicis, eij häller har jag nu någon Botanicum till hands, att rådfråga mig med.

På dett detta må blifwa så mycket kortare, utelämnar jag alla dem, som tillika både wäxa i Småland och Skåne.

Upsal: d: 8 Decembr: 1728.

Carolus Linnæus.

HERBÆ SCANENSES.

Cl. 1. HERBÆ FLORE CAMPANIFORMI.

1. POLYGONATUM angustifolium non ramosum *C. B:* alterum *Dod.*

2. CONVOLVULUS minor arvensis flore roseo *T: C. B:* Helxine cissampelos multis, sive Convolvulus minor *J. B:* Volubilis arv: *Tab:* In campis copiose.

3. TITHYMALUS rotundus foliis non crenatis *T:* Peplus sive Esula rotunda *C. B: J. B:*

4. TITHYMALUS maritimus, folio obtuso aurito, rubro perinde ac caule *Tourn:* Peplis *J. B:* maritima folio obtuso *C. B:*

5. MALVA vulgaris flore majori, folio sinuato *T: J. B:* sylv: folio sinuato *C. B:*

Originalet, helt och hållet egenhändigt af L., omfattar 27 sidor 8:o, eges af slägten De Geer, förmodligen allt ifrån den berömde entomologen, hofmarskalken Charles De Geers tid, och förvaras i biblioteket å fideikommissegendomen Leufsta i Norra Uppland.

Den första afdelningen »*Herbæ Scanenses*» i denna Catalogus är uppställd hufvudsakligen efter J. P. Tourneforts *Institutiones Rei Herbariæ* Tom I—III 4:o Parisiis 1700 och 1719. — Till grund åter för uppställningen i den senare afdelningen »*Herbæ Smolandiæ Propriæ*» ligger Aug. Quir. Rivini, i J. H. Ruppii *Flora Jenensis* 8:vo. Francof. a. M. et Lipsiæ (ed. I) 1718, ed. II 1726, tillämpade system. I båda framträder Linnæi sjelfständighet genom redan nu afvikande meningar och förtydligande uttryck.

1 Convallaria verticillata Caroli Linnæi *Flora Svecica* ed. II (1755) species 293; jfr Joh. Leche: »*Disputatio Medico-Botanica exhibens Primitias Floræ Scanicæ.* Anno MDCCXLIV die 19 Maji», 4:o Lund, p. 24. **2.** C. arvensis. L: sp. 181. **3.** Euphorbia Peplus L: sp. 426; Leche p. 40. **4.** Euph. Peplis L: *Amoen. Acad.* Vol. III p. 115, *Species plant.* (ed. I. 1753) p. 455. — Snarare torde väl här afses Euph. Helioscopia L: sp. 425 eller Euph. palustris L: sp. 427. **5.** M. sylvestris L: sp. 627; Leche p. 26.

6. BRYONIA alba, baccis nigris *T:* *C. B:* Vitis sive Bryonia nigris baccis *J. B:*

7. ASPERULA s. Rubeola montana odorata [odora] *C. B.* Aparine latifolia humilior montana *T:* In sylvis copiosissime.

[Cl. 2.] H: F: INFUNDIB: HYPOCRAT: ROTATO.

8. CENTAURIUM minus *T:* *C. B:* minus flore purpureo *J. B:* copiose inter Malmö et Landskrona.

9. ANDROSACE vulg: latifolia annua *T:* Matthioli [altera] *J. B:* [Coronopus] Alsine affinis Androsace dicta major *C. B:*

10. PRIMULÆ veris species, ni fallor Tournefortio, sed specif: differentia me latet. Verbasculum umbellatum alpinum minus *C. B:*

11. PLANTAGO latifolia incana *T:* *C. B:* major hirsuta, media a nonnullis cognominata *J. B:*

12. PLANTAGO maritima major tenuifolia *T:* [Coronopus] maritima major *C. B:* maritima nostras *J. B:* wid hafsstranden.

13. PLANTAGO maritima, Coronopifolius. wid hafsstränderna.

14. VALERIANA minor *Riv:* palustris minor *T:* *C. B:* minor pratensis l. aqvatica *J. B:*

15. LOCUSTA minor *Riv:* Locusta herba *J. B:* Valerianella arv: præcox, humilis, semine compresso *T:* Valeriana campestris inodora major *C. B:*

16. BUGLOSSUM angustifolium majus, flore coeruleo *C. B:* *T:* vulgare majus *J. B:*

17. BUGLOSSUM angustif: maj: flore albo *T:* *C. B:*

18. ECHIOIDES flore albo *Riv:* Buglossum arv: annuum Lithospermi folio *T:* Lithospermon arv: radice rubra *C. B:* ibland wintersäden kring Lund.

19. ASPERUGO vulgaris *T:* Buglossum silvest: caulibus procumbentibus *C. B:*

---

6. B. alba L: sp. 876; LECHE p. 19. **7.** A. odorata L: sp. 121; LECHE p. 29. **8.** Gentiana Centaurium *β* L: sp. 233; jfr LECHE p. 5 och E. FRIES' *Flora Scanica*, Ups. 1835, p. 42 Erythræa pulchella. **9.** A. septentrionalis L: sp. 170. **10.** Pr. farinosa L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 143, *Fl. Sv.* ed. II sp. 172. **11.** Pl. media L: sp. 130. **12.** Pl. maritima L: sp. 133. **13.** Pl. Coronopus L: sp. 134. **14.** V. dioica L: sp. 35, LECHE p. 21. **15.** Valeriana Locusta L: sp. 36, LECHE p. 1. **16** och **17.** Anchusa officinalis L: sp. 161. **18.** Lithospermum arvense L: sp. 160. **19.** A. procumbens L: sp. 166.

20. MYOSOTIS glabra palustris et minus [glabra pratensis] *Dillen:* Lithospermum palust: minus fl: cæruleo *T:* Echium Scorpioides palustre *C. B:*

21. ECHIUM. *Riv:* vulgare *T: C. B: J. B:* fl: cæruleo.

22. ECHIUM fl: albo.

23. ECHIUM fl: ex albo et cæruleo variegato. Dessa twänne senare äro täml. rara att få.

24. SYMPHYTUM fl: purpureo, Consolida major, qvæ mas *T: C. B:*

25. SYMPHYTUM Consolida major, fl: albo, qvæ foemina *T: C. B:*

26. LYSIMACHIA bifolia fl: globoso luteo *T: C. B:* Lys: flore qvasi spicato *J. B:*

27. ANAGALLIS phœniceo flore *T: C. B:* phœnicea mas. *J. B:*

28. VERONICA spicata latifolia *T: C. B:*

29. VERONICA spicat: augustif: *T:*

30. VERONICA spicata minor *T: C. B:* spicata recta minor *J. B:*

31. VERONICA folio chamædryos *Riv:* Veron: flosculis oblongis pediculis insidentibus, Chamædryos folio *T:* Alsine Chamædryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus *C. B:*

32. VERONICA Rutæ folio *Riv:* verna trifido vel qvinqvefido folio *T:* Alsine triphyllos cærulea *C. B:*

33. VERONICA folio hederulæ *Riv:* Cymbalariæ folio verna *T:* Alsine hederulæ folio *C. B:*

34. VERONICA aqv: major folio oblongo *T:* Anagallis aqv: maj: folio oblongo *C. B:*

35. VERONICA aqv: minor folio oblongo *T:* Anagallis aqv: min: folio oblongo *C. B:*

36. CHRYSOSPLENIUM foliis amplioribus, auriculatis *T:* Saxifraga rotundifolia aurea *C. B:*

37. VERBASCUM mas latifolium luteum *T: C. B:* vulg: fl: lut: magno, folio maximo *J. B:*

38. SOLANUM officinarum acinis nigricantibus *T: C. B:* hortense s. vulgare acinis nigris *J. B:*

39. MOSCHATELLINA foliis Fumariæ bulbosæ *T: J. B:* Ranunculus nemorosus Moschatellina [Muscatellina] dictus *C. B:*

---

20. M. scorpioides *β* palustris L: sp. 157. **21—23.** E. vulgare L: sp. 168. **24** och **25.** S. officinale L: sp. 165. **26.** L. thyrsiflora L: sp. 176. **27.** A. arvensis L: sp. 178; LECHE p. 22. **28** och **29.** V. longifolia L: sp. 9. **30.** V. spicata L: sp. 10. **31.** V. agrestis L: sp. 20. **32.** V. triphylla L: sp. 22; LECHE p. 1. **33.** V. hederifolia L: sp. 21. **34.** V. Anagallis aquatica L: sp. 13. **35.?** V. Beccabunga L: sp. 14. **36.** Chr. alternifolium L: sp. 365. **37.** V. Thapsus L: sp. 195. **38.** S. nigrum L: sp. 200. **39.** Adoxa Moschatellina L: sp. 347.

Class 3:tia. HERBÆ FLORE PERSONATO.

40. ODONTITES *Riv:* Pedicularis serotina, purpurascente flore *T:* Euphrasia parva purpurea *J. B:*

41. MELAMPYRUM arvense *Riv:* purpurasc: coma *T: C. B:* ibland säden.

42. MELAMPYRUM sylvaticum *Riv:* cærulea coma *C. B:*

43. MELAMPYRUM antecedenti simile qvoad structuram, coma elegantissima, purpurea, floribus colore ex albo, luteo et purpureo mixto nitentibus. Detta såg jag allenast en gång emällan Råble [Råbelöf] och Tåssebrods [Torsebro] krudbruk 1726.

[Cl.] 4. HERBÆ FLORE LABIATO.

44. ACINOS *Riv:* Acinos multis *J. B:* Clinopodium arv: Ocimi facie *T: C. B:*

45. ORIGANUM *Riv:* silvestre, Cunila bubula Plinii *C. B:* vulgare spontaneum *J. B:*

46. NEPETA *Riv:* Cataria maj: vulgaris *T:* Mentha cataria vulg: et major *C. B:*

[Cl.] 5. CRUCIFORMES.

47. BULBONAC [annuum] siliqva rotundiore [flore purpureo *Rupp.* Fl. Jenens. p. 70.] Lunaria major, siliqva rotundiore *J. B:* Viola Lunaria major [siliqva rotunda] *C. B: Burseri* h: sic.

48. THLASPI vulgatius *T: J. B:* arvense Vaccariæ incanæ [incano] folio majus *C. B:*

49. IBERIS petræa foliis Bursæ pastoris *Dill:* Nasturtium petræum foliis Bursæ Pastoris *T: C. B:*

---

40. Euphrasia Odontites L: sp. 544. **41.** M. arvense L: sp. 546. **42** och **43.** M. nemorosum L: sp. 547. **44.** Thymus Acinos L: sp. 536. **45.** O. vulgare L: sp. 534. **46.** N. Cataria L: sp. 514; LECHE p. 42. **47.** Lunaria annua L: sp. 583 enligt synon. och JOACHIM BURSERI i universitetsträdgårdens i Upsala museum ännu förvarade *växtsamling.* (Vol. XI. n:o 43), men enligt LINNÆI närmast härefter intagna »*Spolia Botanica*», jemförda med BURSERI herb. (T. XI n:o 44), LECHE p. 12 och E. FRIES' *Fl. Scan.* p. 67 afsågs snarare L. rediviva L: *Spec. pl.* ed. II p. 911. **48.** Thl. campestre L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 575. **49.** Ib. nudicaulis L: sp. 581; LECHE p. 25.

50. CORONOPUS Ruellii, sive Nasturtium verrucosum *J. B:* Nasturtium silv: capsulis cristatis *T:* Ambrosia campestris repens *C. B:*

51. NASTURTIUM silv: tenuiter incisum *T:* Iberis Nasturtii folio *C. B:*

52. ALLIARIA *C. B:* Hesperis Allium redolens [*T:*]

53. TURRITIS vulg: ramosa *T:* Bursæ Pastoris similis siliqvosa maj: s: majoribus foliis *C. B:*

54. RADICULA palustris *Dill: J. B:* Sisymbrium aqv:, Raphani folio, siliqv: breviori *T:* Raphanus aqv: Rapistri folio *C. B:*

55. RADICULA aqvatica foliis in profundas lacinias divisis *Dill:* Raphanus aqv: fol: in pr. lac: div: *C. B:* Sisymbrium aqv: fol: in pr: lac: div: siliqva breviori *T:*

56. CAKILE maritima ampliori folio *T:* Cakile sive Eruca marina latifolia *J. B:* wid hafsstranden.

57. ERUCA silv: angustifolia fl: luteo *J. B:* angustifolia austriaca *C. B:*

[Cl.] 6. ROSACEI.

58. *RHŒAS min: Papaver erraticum capitulo longiore minus *C. B:*

59. ALSINE pratensis, Gramineo folio ampliore *T:* Caryophyllus arvensis glaber, flore majore *C. B:*

60. ALSINES variæ species mihi ignotæ.

61. SPERGULA purpurea *J. B:* Alsine Spergulæ facie minor s. Spergula flosculo subcærul: *T. C. B:*

62. KALI spinosum foliis crassioribus et brevioribus *T:* Tragus: *Matth.* på hafsstranden.

---

50. Cochlearia Coronopus L: *Fl. Sv.* ed II. sp. 579; jfr E. Fries' *Fl. Scan.* p. 67. **51.** Lepidium ruderale L: sp. 572; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 331. **52.** Erysimum Alliaria L: sp. 600. **53.** Arabis thaliana L: sp. 605. **54.** Sisymbrium amphibium L: sp. 593; S. amph. β aquaticum L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 657, ed. II p. 917. **55.** S. amphibium β L: sp. 593; S. amph. α palustre L: *Spec. pl.* ed. I och II. **56.** Bunias Cakile L: sp. 613; Leche p. 26. **57.** Hvarken af Burseri *herbarium*, der (Vol. IV. n:o 81) en illa medfaren växt väl finnes med denna från Casp. Bauhinus hemtade bestämning, eller af Linnés senare arbeten har kunnat utredas, hvilken växt L. härmed menade sig hafva funnit. **58.** Papaver Rhœas γ L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 507, ed. II p. 726; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 201 och E. Fries' *Fl. Scan.* p. 69. **59.** Stellaria Holostea L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 392. **61.** Arenaria rubra L: sp. 399. α. **62.** Salsola Kali L: sp. 225; Leche p. 22.

63. THALICTRUM alpinum Aqvilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus *T:* majus florum stamin: purpurasc: *C. B:* Flos est tetrapetalos, semen s. folliculus triangularis alatus. [»In Scania prope Lundinum ad pagum Fogelsong» *L. Hort. Cliff. p.* 226].

64. BUTOMUS flore roseo *T:* Juncus floridus *J. B:* floridus major *C. B:*

65. ANEMONE-RANUNCULUS fl: luteo *Dill:* Ranunculus phragmites nemorosus luteus *T: C. B:*

66. MYOSUROS *J. B:* Holosteo, affinis Cauda muris *C. B:* Ranunculus Gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicat: congestis *T:*

67. HEPATICA fl: purpureo simpl: Trifolium hepaticum flore simplici purpureo *C. B:* Ranunculus tridentatus vernus flore purpureo simplici *T:*

68. FICARIA *Riv:* Chelidonia rotundifolia minor *C. B:* Ranunculus vernus, rotundifolius minor *T:*

69. SAGITTA aqvatica minor angustifolia *C. B:* Ranunculus palustris, folio sagittato, angustiori [*T:*]

70. STRATIOTES foliis Aloës, semine longo *Gundel:* Aloides *Boerh: Hort:* Aloë palustris *C. B:* Skall finnas på ett ställe wid Christianstad uti ett kärr.

71. STRATIOTES Asari folio *Gundel:* Nymphæa alba minima *C. B:* Morsus ranæ, foliis circinatis, floribus albis *T:* Microleuconymphæa!!! *Boerhav:*

72. QVINQVEFOLIUM majus repens *T: C. B:* Pentaphyllum s: Qvinqvefolium vulg: repens *J. B:*

73. AGRIMONIA officinarum *T:* Eupatorium veterum s: Agrimonia *C. B:*

[Cl.] 7. ROSACEI UMBELLATI.

74. SIUM s: Apium palustre, foliis oblongis *T: C. B:* Sion umbelliferum *J. B:*

---

63. T. aquilegifolium L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 487; Leche p. 10. **64.** B. umbellatus L: sp. 350. **65.** A. Ranunculoides L: sp. 486; Leche p. 10. **66.** Myosurus minimus L: sp. 276. **67.** A. Hepatica L: sp. 480. **68.** Ranunculus Ficaria L: sp. 496. **69.** Sagittaria sagittifolia *β* L: sp. 869. **70.** Str. aloides L: sp. 479. — »Andreas Gundelius, germanice *Gundelsheimer*, sese mihi comitem præbuit in Orientali nostra peregrinatione plantarum causa instituta, magnoque fuit adjumento.» J. P. Tournefort: *Corollarium Institutionum Rei Herbariæ* Tom. I. 4:o, Parisiis 1719, p. 51. **71.** Hydrocharis Morsus ranæ L: sp. 914. **72.** Potentilla reptans L: sp. 456. **73.** A. Eupatoria L: sp. 423. **74.** Sium latifolium *β* L: *Spec. pl.* ed. II p. 361.

75. PERFOLIATA *Riv.* officinarum vulgatiss: sive arvensis *C. B:* Bupleurum perfoliat: rotundifol: annuum *T:*

76. OENANTHE aqvatica *T: C. B:* secundum *Burserum.* Oenanthe *Riv:* s. Filipendula aqvatica *J. B:*

77. DAUCUS vulg: Clusii *T:* Pastinaca tenuifolia silv: Dioscoridis l. Daucus officinarum *C. B:* in campis copiosissime.

78. SANICULA *Riv:* officinarum *T: C. B:*

[Cl.] 8. CARYOPHYLLÆI.

79. STATICE *T:* Caryophyllus montanus major, flore globoso *C. B:*

80. STATICE montana minor *T:* Caryophyllus montanus minor *C. B:*

81. CUCUBALUS Plin: *T:* Cucubalum qvibusdam l. Alsine baccifera *J. B:* Alsine scandens baccifera *C. B:*

[Cl.] 10. PAPILIONACEI.

82. ANTHYLLIS *Riv:* Vulneraria rustica *T: J. B:* Loto affinis Vulneraria pratensis *C. B:*

83. OROBUS *Riv:* sylvaticus purpureus vernus *T: C. B:* Galega nemorensis verna *J B:*

84. TRIFOLIUM mont: album *T: C. B:* majus albo flore incanum Clusii *J. B:*

85. LUPULINUM minimum. Trifolium luteum lupulinum minimum *T:* *Moris:*

86. MELILOTUS *Riv:* officinarum Germaniæ *T: C. B:* Trifol: odoratum s: Melilotus vulg: fl: luteo *J. B:*

---

75. Bupleurum rotundifolium L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 236; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 104 och E. Fries' *Fl. Scan.* p. 58. **76.** Oen. fistulosa L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 236, ed. II sp. 250; Leche p. 5; Burseri herb. sicc. VIII. 83. **77.** D. Carota L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 237; Leche p. 23. **78.** S. europæa L: sp. 235; Læche p. 33. **79.** S. Armeria L: sp. 269. **80.** Varietet af den föregående enligt L: *Hort. Cliff.* p. 115 sp. 1. δ **81.** Cucubalus baccifer L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 414; C. bacciferus ed. II p. 591. Troligen tillfällig eller förvildad. **82.** A. Vulneraria α L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 638. **83.** O. vernus L: sp. 641. **84.** T. montanum L: sp. 667. **85.** T. filiforme L: sp. 674; E. Fries' *Fl. Scan.* p. 103. **86.** T. Melilotus officinalis L: sp. 663.

87. MELILOTUS minima *Riv:* capsulis reni similibus, in capitulum congestis *T:* Trifol: pratense luteum capitulo breviore *C. B:*

88. ANONIS spinosa fl: purpureo *T: C. B:*

89. ANONIS spinis carens purpurea *T: C. B:*

90. FALCATA *Riv*: Medica silv: floribus e luteo pallescentibus *T:* Trifolium silv: lut: siliqv: cornuta l. Med: fr: [Medica frutescens] *C. B:*

91. ASTRAGALUS luteus perennis procumbens vulg: s: sylvestr: *T:* Glycyrrhiza silv: fl: e luteo pallesc. *C. B:*

[Cl.] 11. POLYPETALI ANOMALI.

92. IMPATIENS *Riv:* Balsamina lutea s: Noli me tangere *T: C. B:* Noli me tangere *J. B:*

93. SPLIT radice rotunda cava fl: rubro *Riv:* Fumaria bulbosa, radice cava, major, fl: rubro dilutiore *T: C. B:*

94 SPLIT rad: rot: cava, fl: albo *Riv:* Fumaria bulbosa, rad: cav: maj: fl: albo *T: C. B:*

95. SPLIT radice non cava minor. Fumaria bulbosa, radice non cava minor *T: C. B:* Radix cava minor *Dod:*

96. LUTEOLA herba salicis folio *T: C. B:* Luteola Plinii qvibusdam *J. B:*

97. DELPHINIUM segetum fl: cæruleo *T:* Consolida regalis arv: fl: cæruleo *C. B:*

98. OPHRIS bifolia, *T: C. B:* Bifolium majus sive Ophris [Ophrys] major qvibusdam *J. B:*

[Cl.] 12. FLOSCULOSI.

99. XANTHIUM *T:* Lappa minor, Xanthium Dioscoridis *C. B:* Xanthium s: Lappa min *J. B:*

100. CARDUI species caule alato. Ibland säden.

---

87. Medicago lupulina L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 678. **88.** Ononis spinosa β L: sp. 637. **89.** O. spinosa α L: **90.** Medicago falcata L: sp. 677. **91.** A. glycyphyllus L: sp. 658. **92.** I. noli tangere L: sp. 792. **93** och **94.** Fumaria bulbosa γ L: sp. 631; F. bulbosa cava L: *Spec. pl.* (ed. I.) p. 699; jfr. Leche p. 13. **95.** F. bulbosa β L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 631; F. bulbosa β intermedia L: *Spec. pl.* (ed. I.). **96.** Reseda Luteola L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 424. **97.** D. Consolida L: sp. 475. **98.** Ophrys ovata L: sp. 808. **99.** X. strumarium L: sp. 864; Leche p. 18. **100.** ? Carduus acanthoides L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 821; *Fl. Sv.* ed. II sp. 718; jfr. L:i *Skånska Resa* s. 297 och E. Fries' *Fl. Scan.* p. 14.

101. SERRATULA *C. B: J. B: Tab:* Jacea nemorensis, qvæ Serratula vulgo *T:*

102. PETASITES minor *T: C. B:* albus folio anguloso *J. B:*

103. ELICHRYSUM s: Stoechas citrina angustifolia [potius latifolia] *T: C. B:* Stoechas citr: tenuifol: [latiore folio] narbonensis *J. B:*

104. EUPATORIUM cannabinum *T: C. B:* Eupatorium adulterinum *J. B:*

105. ABSINTHII marini species.

106. BIDENS folio non dissecto *T:* Cannabina aqvat: folio non diviso *C. B:* Verbesina pulchriore fl: luteo *J. B:*

[Cl.] 13. SEMIFLOSCULOSI.

107. HIERACIUM myophorum *Heucheri.* [*Novi Provent. Horti Med. Wittenb.* de A:o 1713. pag. 74.] Om denna har *D: Stobæus* för omtalt in *Actis lit: svec:* An: 1723 pag: 415.

108. TRAGOPOGON pratens: luteum *T: C. B:* fl: luteo *J. B:*

109. CICHORIUM sylv: s: officinarum *T: C. B:* sylvestre *J. B:* flore cæruleo.

110. CICHORIUM sylv: fl: albo *T: C. B:* sed rarius.

[Cl.] 14. RADIATI.

111. TUSSILAGO *J. B:* vulgaris *T: C. B:*

112. JACOBÆÆ forsan species. Hujus herbæ figuram opt: exhibet *Dod: gall:* inter Conyzas fig. 4:ta. Hon wäxer så wähl wid salt watn äller hafstranden, som wid sött äller i rinlar och pussar.

---

101. S. tinctoria L: *Fl. Sv.* ed. II. sp. 713. **102.** Tussilago alba L: sp. 745. Leche p. 16. **103.** Gnaphalium Stoechas L: *Spec pl.* (ed. I) p. 853, ed. II p. 1193 efter synonym, men enligt »*Spolia Botanica*» och *Fl. Sv.* G. arenarium L: sp. 738; Leche p. 26. **104.** Eup. cannabinum L: sp. 728; Leche p. 26. **105.** Artemisia maritima L: sp. 734; Leche p. 27. **106.** B. cernua L: sp. 727. **107.** H. murorum γ L: sp. 701. **108.** T. pratense L: sp. 684. **109** och **110**. C. Intybus L: sp. 711. **111.** T. Farfara L: sp. 743. **112.** Cineraria palustris L: *Spec. pl.* ed. II p. 1243; Othonna palustris L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 778, *Spec. pl.* (ed. I) p. 924; Solidago L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 687, Leche p. 17; Conyzæ mediæ species altera *Remb. Dodonæi Stirpium Historiæ Pemptades Sex*, Antverpiæ 1616, fol. p. 52.

113. ASTER palustris parvo flore globoso *T:* Conyza major flore globoso *C. B.* Pulicaria *Lob:*

114. TRIPOLIUM majus cæruleum et minus *C. B:* Aster maritimus palustris cæruleus Salicis folio *T:*

115. PTARMICA vulg: folio longo serrato, flore albo *T:* Dracunculus pratensis folio serrato *C. B:*

116. BELLIS sylvestris minor *T: C. B:* copiosissime.

[Cl.] 15. APETALI.

117. LAPATI marini species.

118. CHENOPODIUM, Pes Anserinus 1:mus Tabernemont: *T:* Atriplex sylvestris latifolia *C. B:* Atriplex dicta Pes Anserinus *J. B:*

119. HERNIARIA glabra *T: J. B:* Polygonum minus sive Millegrana major *C. B:*

120. PERSICARIA palustris fluitans, foliis brevioribus et latioribus, florum spica speciosa, purpurea, compactiore *Rupp:* uti dammar.

121. FAGOPYRUM vulg: erectum *T:* Fagotriticum *J. B:* Erysimum cereale s: Theophrasti folio hederaceo *C. B:* Sås på åckerfälten.

122. TYPHA palustris major *T: C. B: J. B:* Uti en dam wid Råble, som ligger icke långt ifrån Christianstadh.

123. MERCURIALIS montana testiculata et spicata *C. B:* Cynocrambe mas et foemina sive Mercurialis repens *J. B:*

124. PINASTELLA *Dillen:* Eqvisetum palustre brevioribus foliis polyspermum *C. B:* Polygonum foemina *Matth:*

125. ACORUS verus s: Calamus aromaticus officin. *C. B:* Calamus aromat: vulg: multis Acorum *J. B:* Wid strömmar och uti dammar till öfwerflöd.

---

113. Inula Pulicaria L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 758, Erigeron L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 693; Conyza LECHE p. 17. **114.** Aster Tripolium L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 753. **115.** Achillæa Ptarmica L: sp. 771. **116.** B. perennis L: sp. 761 **117.** ? Rumex maritimus L: sp. 313; LECHE p. 6. **118.** Ch. rubrum L: sp. 217. **119.** H. glabra L: sp. 213. **120.** Polygonum amphibium *β* L: sp. 341. **121.** Polygonum Fagopyrum L: sp. 345. **122.** T. latifolia L: sp, 830; jfr L:i *Skånska Resa* p. 198 och E. FRIES' *Fl. Scan.* p. 179. **123.** M. perennis L: sp. 913. **124.** Hippuris vulgaris L: sp. 2. **125.** A. Calamus L: sp. 297; LECHE p. 35.

[Cl.] 16. H: FL: IMPERFECTO VULG:

126. OPHIOGLOSSUM vulgatum *T: C. B:* Ophioglosson *J. B:*
127. FUCI variæ species.
128. CORALLINA. På stenarna i hafvet, fins ömnogt.

ARBORES FL: AMENT: MONOPET: ROSACEO.

[Cl. 19.] AMENTACEI.

129. CARPINUS *T:* Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis *C. B:* Fagus sepium, vulgo Ostrys Theophrasti *J. B:*

[Cl. 20.] MONOPETALI.

130. RHAMNUS catharticus *T: C. B: J. B:* Spina infectoria *Tab:*
131. CAPRIFOLII qvædam species.
132. HEDERA vulg: cum præcedente wid Ramlösa Surbrun, icke långt från Hälsingborg.
133. CHAMÆCERASUS Dumetorum fructu gemino rubro *C. B:* Periclymenum rectum fr: rubro *J. B:* Xylosteum *Riv: Dod:*

[Cl. 21.] ROSACEI.

134. GROSSULARIA non spinosa fructu nigro majore *T: C. B:* Ribes nigrum vulgo dictum folio olente *J. B:* Omkring Hwitsiöfle i siddorna.
135. EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus *T: C. B:* Evonymus multis aliis Tetragonia *J. B:*
136. OSSEA *Riv:* Cornus foemina *T. C: B.* Cornus foemina, putata Virga sangvinea *J. B:*

---

126. O. vulgatum L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 932. **128.** ? Sertularia L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 1134. **129.** C. Betulus L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 872. **130.** R. catharticus L: sp. 202. **131.** ? Lonicera Periclymenum L: sp. 193; Leche p. 4. **132.** H. Helix L: sp. 209; Leche p. 31. **133.** Lonicera Xylosteum L. sp. 194. **134.** Ribes nigrum L: sp. 207. **135.** E. europæus L: sp. 204; Leche p. 22. **136.** Cornus sanguinea L: sp. 138.

Såsom jag här tills uprächnadt en hop af de raraste, som finnas i Skåne och således wist, hwad stor qvantitet med örter Skåne äger för Småland. Så will jag nu twärt emot uprächna några, som man dageligen ser uti Småland, men aldrig uti Skåne. Besynnnerl. är att märka, med hwad för stor ömnoghet Gud begåfwadt Småland af Herbis bacciferis, hwilka sällan synas i Skåne. Jag går altså förbij alla dem, som tillika finnas uti Skåne.

HERBÆ SMOLANDIÆ PROPRIÆ.

HERBÆ FL: MONOPETALO REGULARI.

SEMINA NUDA 4.

1. LAPPULA *Riv:* Cynoglossum minus *C. B:* Buglossum angustifolium semine echinato *T:*

CAPSUL: SIMPL:

2. TRIENTALIS *Riv:* Pyrola alsines flore Europæa major *C. B:*
3. ANONYMA. Caryophyllus marinus pumilio reptans *Burseri h: s:*

Hwad des rätta genus skall wara, wett jag intet; eij häller har jag sedt des frucht. Flos ejus est albus, infundibiliformis, qvadrifidus. Calix qvadrifolius usqve ad lacinias florem involvens. Staminibus gaudet qvatuor proportione longissimis, extra florem propendentibus. Folia juncea. Viget in locis, ubi per hyemem aqvæ stagnarunt. — Om hon fins wid hafwet, wett jag icke. I åhr, så snart hon hade blomstrat, kom watn och föröchte sig, att dett gick öfwer henne, så att fruchten eij blef mogen: men dett är wist, att Pistillum går in fructum. Jag fan aldrig des flos apertus, utan altid clausus, fast än jag såg där äfter både bittida och sendt. Cum Caryophyllo nil habet commune. Qværitur qvid nomen sit?

---

1. Myosotis Lappula L: *Fl. Svec.* ed. II (1755) sp. 158. **2.** Tr. europæa. L: sp. 326. **3.** Plantago uniflora L: sp. 135. — Återfinnes i Burseri *herbarium* Tom. XI n:o 124; å namnlappens baksida är egenhändigt skrifvet af L.: »Plantago palustris gramineo folio monanthos *Tourn: inst:* 128. In Smolandia observavi C. Linnæus.» Jfr L:i bref till K. Stobæus 1728 $^{8}/_{11}$: Scirpus foliaceus humilis (se Linnés *Svenska Arbeten* B. 2. Sthlm 1880 s. 11, 12, 14); L:i *Ölands och Gotlands Resa* s. 316 och *Skånska Resa* s. 417. — Littorella juncea P. J. Bergius: *K. Vet. Akad:s Handl.* 1768 s. 337—344.

4. GENTIANELLA cærulea oris pilosis *C. B:* Gentiana cær: oris pilosis *T:* Gentianula lanugine ad singulas florum lacinias donata, flore qvadripartito *J. B:*

5. PNEUMONANTHE *Tab:* Gentiana angustifolia, autumnalis major *C. B: T:*

PERICARP: 3 CAPS:

6. CAMPANULA serpillifolia *Rudb: fil:* *C. B:* Fins ned wid Skånska gräntzen i några skogar ömnogt. [»Nos eandem legimus per Sveciam in Smolandia ad templa Hallaryd & Pietteryd in sylvis umbrosis.» *L. Hort. Cliff.* p. 321.]

PERICARP: 4 CAPS:

7. CHAMÆNERII variæ species.

8. TETRALIX *Rupp:* an Erica flore purpurascente pendulo, petiolo longo rubro, Piceæ folio *Rudb: f:?*

9. TETRALIX Rosmarini folio. Cistus Ledon folio salicis angustifoliæ *C. B:* an Erica palustr: flore purpurasc: pendulo, petiolo longo rubro, Rosmarini folio *Rudb: f:?*

BACC: TRIPYREN:

10. EBULUS sive Sambucus herbacea *J. B:* Sambucus humilis s. Ebulus *T: C. B:* Wid Wexiö på ett ställe.

BACC: POLYPYREN:

11. VACCINIUM *Riv:* Vitis idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante *T: C. B:*

12. VACCINIUM grande. Vitis idæa magna qvibusdam s: Myrtillus grandis *J. B:* Vitis idæa fol: subrotundis exalbidis. [*C. B:*]

13. VITIS idæa fol: subrotundis, non crenatis, baccis rubris *T: C. B:* Vitis idæa semper virens fr: rubro *J. B:*

---

4. Gentiana ciliata L: *Spec. pl.* ed. II p. 334. Denna är dock aldrig funnen vildt växande i Sverige; måhända afsåg L: en form af G. campestris *Fl. Sv.* ed. II sp. 230. **5.** Gentiana Pneumonanthe L: sp. 228; jfr L:i *Öländska och Gotländska Resa* s. 317 samt *Skånska Resa* s. 417. **6.** Linnæa borealis L: sp. 562. **7.** Epilobia. **8.** Erica Tetralix L: sp. 337. — Synonymen från Ol. Rudbeck d. y:s *Index Plantarum Laponicarum*, införd i *K. Vet. Soc. Acta* för år 1720, hänföres till sp. 354 Andromeda [Phyllodoce] coerulea i L: *Fl. Sv.* ed. II. **9.** Andromeda polifolia L: sp. 353. **10.** Sambucus Ebulus L: sp. 266. **11.** V. Myrtillus L: sp. 333. **12.** V. uliginosum L: sp. 332. **13.** Vaccinium Vitis idæa L: sp. 334.

HERB: FL: TRICAPSULARI.

[PLANTÆ FLORE REGULARI TRIPETALO RUPP:] SEMINA NUDA 3.

14. TRIGLOCHIN *Riv:* Juncago palustris et vulg: *T:* Gramen junceum spicatum s: Triglochin *C. B:* Gram: triglochin *J. B:*

PERICARP:? [SEXCAPSULARI RIV:]

15. AN BUTOMI species? Juncus floridus minor *C. B:* Florem hactenus nunqvam vidi. Fructus constat siliqvis l. potius capsulis ternis, qvaternis, interdum qvinis.

HERBÆ FL: TETRAPETALO REGULARI.

SEMEN NUDUM 1.

16. PERCEPIER *Dill:* Anglorum qvibusdam *J. B:* Alchimilla montana minima *T:* Chærophyllo nonnihil similis *C. B:*

SEMINA NUDA 4.

17. POTAMOGETON rotundifolium *C. B:* rotundiori folio *J. B:*

18. POTAMOGETON pusillum, gramineo folio, caule rotundo [tereti] *Raj:*

19. POTAMOGETON foliis pennatis *T:* Millefolium aqvat: pennatum spicatum *C. B:* Millefolium pennatum aqvat: *J. B:*

PERICARP: 8 CAPS: [CAPSULA OCTOPARTITA RUPP:]

20. RADIOLA *Dillen:* Linoides s: Radiola qvorundam *Rupp:* Polygonum minimum s. Millegrana minima *C. B:*

BACC: MONOPYREN:

21. MESOMORA alba baccis in corymbo rubris *Rudb: f:* Periclymenum 4 humile Norvegicum *C. B:* 3 minus *Tab:*

---

14. T. palustre L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 321. **15.** Scheuchzeria palustris L: sp. 320; jfr L:i *Öländska Resa* s. 316 och *Skånska Resa* s. 417. **16.** Aphanes arvensis L: sp. 143; jfr L:i *Öländska Resa* s. 316. **17.** P. natans L: sp. 145. **18.?** P. pusillum L: sp. 153. **19.** Myriophyllum spicatum L: sp. 867. **20.** Linum Radiola L: sp. 272; jfr L:i *Öländska och Gotländska Resa* s. 316. **21.** Cornus succica L: sp. 139; jfr L:i *Skånska Resa* s. 417.

BACC: DIPYREN:

22. UNIFOLIUM *Dod: Tab:* Lilium convallium minus *C. B:* Smilax unifolia humillima *T:*

BACC: POLYPYREN:

23. PARIS *Riv:* Herba Paris *T:* Solanum qvadrifolium bacciferum *C. B:*

24. OXYCOCCUS sive Vaccinia palustris *T: J. B:* Vitis idæa palustris *C. B:*

25. CHRISTOPHORIANA vulg: nostras, racemosa et ramosa *T: Moris:* Aconitum racemosum, an Actæa Plinio *C. B:*

HERBÆ FL: PENTAPETALO REGULARI.

SEMINA NUDA 3. [PLURIMA RUPP:]

26. ULMARIA *T: J. B:* Barba capræ floribus compactis *C. B:* Regina prati *Dod:*

PERICARP: SIMPL: [CAPS: SIMPL. RUPP:]

27. RORELLA vulg: et officinarum. Ros solis folio subrotundo *T: C. B:* Ros solis foliis circinnatæ rotunditatis *J. B:*

28. RORELLA fol: oblongo. Ros solis folio oblongo *T: C. B: J. B:*

29. PARNASSIA *Riv:* palustris et vulgaris *T:* Gramen Parnassi albo simplici fl: *C. B:*

PERICARP: 5 CAPS: [CAPSULA QUINQUEPARTITA RUPP:]

30. VISCARIA alba *Riv:* Lychnis sylv: viscosa alba angustifolia *C. B:* wid Wexiö.

31. LEDUM rorismarini folio *Tab:* Cistus Ledon foliis rorismarini ferrugineis *C. B:* Rosmarinum silv: *Matth:*

32. FABARIA officinarum. Telephium vulgare *C. B:* Anacampseros vulgo Faba crassa [*T: J. B:*]

---

22. Convallaria bifolia L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 296. **23.** P. quadrifolia L: sp. 346. **24.** Vaccinium Oxycoccus L: sp. 335. **25.** Actæa spicata L: sp. 464. **26.** Spiræa Ulmaria L: sp. 440. **27.** Drosera rotundifolia L: sp. 273. **28.** Drosera longifolia L: sp. 274. **29.** P. palustris L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 273, *Fl. Sv.* ed. II sp. 268. **30.** Lychnis Viscaria *β* L: sp. 409. **31.** L. palustre L: sp. 352. **32.** Sedum Telephium L: sp. 400.

BACC: COMPOS: [BACCA S. POMUM POLYPYREN: RUPP:]

33. CHAMÆRUBUS saxatilis *C. B:* Rubus alpinus humilis *T: J. B:*

34. CHAMÆMORUS palustr: fructu flavescente. Rubus humilis pal: fructu ex rubro flavescente *Rudb: f:* Chamærubus foliis Ribes *C. B:*

HERBÆ FL: HEXAPETALO REGULARI.

PERICARP: 2 CAPS: [VASCULA BICAPSULARI DILL:]

35. PORTULA *Dill:* Alsine palustris minor serpillifolia *C. B:* Glaux palustris flore striato clauso, foliis Portulacæ *T:*

PERICARP: 3 CAPS: [CAPSULA TRIPARTITA RUPP:]

36. PHALANGIUM palustre Iridis folio *T:* Pseudo-Asphodelus *C. B:* sed an sit Alpinum, Anglicum etc. fateor me ignorare.

37. an CEPA juncifolia minor purpurascens *T:* Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus *C. B:?*

HERBÆ FL: POLYPETALO REGULARI.

PERIC: MULT: [MULTICAPSULARI RIV: CAPSULA MULTIPLICI RUPP:]

38. SEMPERVIVUM tectorum majus. Sedum majus vulgare *T: C. B:*

HERBÆ FL: MONOPETALO IRREGULARI.

SEMEN NUDUM 1.

39. VALERIANA sylv. major *T: C. B:* Val: sylvest: magna aqvat: *J. B:* Phu vulgare *Tab:*

---

33. Rubus saxatilis L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 447. **34.** Rubus Chamæmorus L: sp. 449. **35.** Peplis Portula L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 332. **36.** Anthericum ossifragum L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 287; jfr *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 190 och 191, L:i *Öländska Resa* s. 316 och *Skånska Resa* s. 417 »Ilagräs». **37.** Allium O. CELSIUS »*Plant. circa Upsaliam sponte nascentium Cat.*» i *K. Vet. Soc:s Acta* för år 1732 p. 1 och L: *Fl. Svec.* (ed. I) sp. 265 eller A. oleraceum L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 280; synon. från C. BAUH. hänföres dock i L: *Spec. pl.* till A. vineale. **38.** S. tectorum L: sp. 428. **39.** V. officinalis L: sp. 34.

SEMINA NUDA 4.

40. CLINOPODIUM Origano simile elatius *T: C. B:* Clin: qvorundam, Origani facie *J. B:*

41. BUGULA *T: Dod:* Consolida media pratens: cærulea *C. B:* media qvibusdam Bugula *J. B:*

PERICARP: SIMPL: [CAPSULA SIMPLICI RUPP:]

42. PINGVICULÆ species, flore in caule gemino Nescio num fuerit species luxurians l. definita a vulgari nostra.

43. LENTIBULARIA *Riv: Raj:* Millefol: aqv: lenticulatum *C. B:* aqv: fl: luteo galericulato *J. B:*

PERICARP: 2 CAPS: [CAPSULA BIPARTITA RUPP:]

44. LINARIÆ species fl: cæruleo. [Denna] såg jag 1725 wid Wexiö, men förstod eij lägga dett på sinnet.

45. VERONICA *Riv:* mas supina et vulgatissima *T: C. B:*

46. VERONICA aqv: angustiore folio *T:* palustris angustifolia *Riv:* Anagallis Aqv: Angustifolia *J. B:* aqv. ang: scutellata *C. B:*

[CAPSULA TRIPARTITA RUPP:]

47. DORTMANNA lacustris floribus sparsis pendulis *Rudb: f:* Gladiolus stagnalis s: lacustris Dortmanni *Dod:* Leucojum palustre fl: subcæruleo *C. B:*

BACCA POLYPYR:

48. ARUM aqv: *T:* Dracunculus palust: s: rad: arund: Plinii *C. B:*

HERBÆ FL: TRIPETALO IRREGULARI.

49. POLYGALA vulg: *T: C. B:* Polygalon multis *J. B:* fl: cæruleo, albo et rubro variat.

---

40. C. vulgare L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 533. **41.** Ajuga pyramidalis L: sp. 512. **42.** P. vulgaris L: sp. 25 var. **43.** Utricularia vulgaris L: sp. 28. **44.**? Anthirrinum arvense L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 614, ed. II p. 855 enligt synonym. i L: »*Spolia Botanica*»; måhända snarare A. repens L. *Spec. pl.* ed. I & II. **45.** V. officinalis L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 12. **46.** V. scutellata L: sp. 17. **47.** Lobelia Dortmanna L: sp. 783, *Hort. Cliff.* p. 426 och 427. **48.** Calla palustris L: sp. 822. **49.** P. vulgaris L: sp. 632.

HERBÆ FLORE TETRAPETALO IRREGULARI.

50. OROBUS sylvaticus Viciæ foliis *C. B:* Astragalus maior Fuchsio *J. B:*

HERBÆ FL: PENTAPETALO IRREGULARI.

SEMINA NUDA 2. [GEMELLA Rupp:]

51. ANGELICA aqvatica *C. B:* minor Aqvatica *Tab:* secundum *Burseri herb: sicc:*

PERIC: SIMPL: [CAPS: SIMPLICI Rupp:]

52. VIOLA martia purpurea flore simplici odoro *T: C. B:* mart: purpurea *J. B:* Wid Wexiö på Solberget.

53. VIOLA sylvestris pusilla fl: pallido *Burseri h: s:*

HERBÆ FL: COMPOSITO EX REGULARIBUS ET IRREGULARIBUS.

54. JACEA nigra pratensis latifolia *T: C. B:* qvæ flore purpureo vulgaris est; sed *flore albo*, vel *disco purpureo*, *corona alba* rarius inveniuntur.

HERBÆ FL: STAMINEO.

55. SPARGANII forsan species. Vulgo Gramen aqv: fluitans cum longissima panicula.

56. FAGUS *Dod:* Fagus Latinorum, Oxya Græcorum *J. B:* etiam in Scania copiose.

---

50. O. niger L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 643. **51.** A. sylvestris L: sp. 246 enligt Burseri *herbarium* Vol. VIII n:o 10 och Tabernæmontani *Hist. plant.* T. I, fol. Francof. 1625, p. 219 och 220. **52.** V. odorata L: sp. 784. — Burseri *herbarium* Vol. XI n:o 1. **53.** Under n:o 3 i samma Vol. af Burs. *herbar.* finnes med den anförda benämningen en Viola, som nära liknar V. arenaria A. P. De Candolle i *Flore Française.* T. IV. 2, Paris 1815. 8:vo, p. 806. **54.** Centaurea Jacea L: sp. 774. **55.** S. natans L: sp. 832; jfr L: *Fl. Lapp.* sp. * 345. § *β* och *Ölands Resa* s. 316. **56.** F. sylvatica L: sp. 871.

57. BETULA palustris nana *Rudb: f:*

58. GALE frutex odoratus Septentrionalium *J. B: Dill:* Rhus myrtifolia Belgica *C. B:* Chamelæagnus *Dod:*

59. EMPETRUM montanum fructu nigro *T:* Erica baccifera procumbens nigra *C. B:* Erica baccifera Matthioli *J. B:*

HERBÆ FLORE CARENTES VULGO.

60. LYCOPODIUM minus aqvaticum.

61. LUNARIA botrytis *J. B:* racemosa minor vel vulgaris *C. B:* Osmunda foliis lunatis *T:*

62. TRICHOMANES s: Polytrichum officinarum *T: C. B:* Trichomanes s: Polytrichum *J. B:*

63. PEZIZÆ var: species.

---

57. B. nana L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 777, ed. II sp. 860. **58.** Myrica Gale L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 907. **59.** E. nigrum L: sp. 904. (**58** och **59** äro ej upptagna i J. H. Ruppii *Flora Jenensis* 8:vo Francofurti et Lipsiæ (ed. I) 1718, ed. II 1726, ed. III Jenæ 1745.) **60.** L. inundatum L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 862, ed. II sp. 954, *Ölands Resa* s. 316 och *Skånska Resa* s. 417. **61.** Osmunda Lunaria L: sp. 934. **62.** Asplenium Trichomanes L: sp. 942. **63.** Peziæ L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 1109—1111, ed. II sp. 1271—1275.

Förklaring öfver de förkortade namn

på författare och deras arbeten, till hvilka LINNÆUS hänvisar i denna uppsats och i de närmast följande:

BESL: = BASILIUS BESLER, *Hortus Eystettensis* Norimbergæ 1613 folio maximo.

BOERH: = HERMAN BOERHAAVE, *Index plantarum*, quæ in horto academico Lugduno Batavo reperiuntur. Lugd. Bat. 1710. 8:vo. — Index alter plantarum, quæ in horto acad. Lugd. Bat. aluntur. Lugd. Bat. 1720. 4:to.

BREYN: *Cent.* = JACOB BREYNIUS, Exoticarum aliarumque minus cognitarum plantarum *Centuria prima.* Gedani 1678. fol.

BREYN: *Prod.* = *Prodromus* fasciculi rariorum plantarum anno 1679 in hortis celeberrimis Hollandiæ observatarum Gedani 1680. 4:to. *Prodromus* fasciculi rarior. plant. *secundus*, exhibens catalogum plant. rarior. anno 1688 in hortis Hollandiæ observatarum. Gedani 1689. 4:to.

BURS: *h. v.* = JOACHIM BURSERI *Herbarium vivum l. siccum.* Svenskt krigsbyte från Sorö 1658, skänkt till Upsala univ.; ursprungl. 25 vol. fol., hvaraf vol. 2 och 5 förstördes hemma hos prof. OL. RUDBECK d. ä. vid den stora eldsvådan i Upsala d. 16 Maj år 1702.

CAM: *Epit.* = JOACHIM CAMERARIUS, *De plantis Epitome utilissima* PETRI ANDREÆ MATTHIOLI. Francofurti a M. 1586. 4:to.

CAM: *Hort.* = JOACHIM CAMERARIUS, *Hortus medicus et philosophicus.* Francofurti a. M. 1588. 4:to.

C. B: = CASPARUS BAUHINUS, *Πιναξ Theatri Botanici.* Basileæ 1623, ed. II 1671. 4:to.

CHABR: = DOMINICUS CHABRÆUS, *Stirpium icones et sciagraphia.* Genevæ 1666, ed. II 1677. fol.

CLUS: *Hist.* = CAROLUS CLUSIUS, *Rariorum plantarum historia.* Antverpiæ 1601 fol.

CLUS: *Pan.* = C. CLUSIUS, *Rariorum aliquot stirpium per Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum historia.* Antv. 1583. fol.

COLUM: *Εκφ:* = FABIUS COLUMNA, Minus cognitarum rariorumque nostro coelo orientium stirpium *Εκφρασισ.* Romæ 1616. 4:to.

COLUM: *Phytob.* = *Φυτοβασανοσ* sive plantarum aliquot historia. Neapoli 1592. 4:to.

COMMEL: *Fl. Mal.* = CASP. COMMELINUS, *Flora Malabarica* sive horti Malabarici catalogus. Lugduni Batavorum 1696. 8:vo & fol.

CORN: } = JAC. PHIL. CORNUTUS, *Canadensium plantarum aliarumque nondum*
CORNUT: } *editarum historia.* Parisiis 1635. 4:to.

DILL: *Cat.* } = JOHAN. JAC. DILLENIUS, *Catalogus plantarum sponte circa*
» *N. pl. g.* } *Gissam nascentium.* Cum appendice, qua plantæ post editum catalogum circa & extra Gissam observatæ recensentur, specierum no-

varum vel dubiarum descriptiones traduntur, & *genera plantarum nova* figuris æneis illustrata, describuntur. Francofurti a. M. 1719. 8:vo.

Dod: = Rembert Dodoens l. Dodonæus, *Stirpium historiæ pemptades sex sive libri XXX.* Antverpiæ 1583 fol.; ed. II Antv. 1616. fol.

Ferrar: = Giovanni Baptista Ferrarius, *Flora seu de florum cultura libri IV.* Romæ 1633, Amstelod. 1646 & 1664. 4:to. — *Hesperides* sive de malorum aureorum cultura et usu libri IV. Romæ 1646. fol.

(Hoffm:) *Fl. Ald.* = M. Hoffmannus, *Florilegium Altdorffinum.* Altdorffii 1676. 4:to.

Fl: Dan: = Sim. Paulli, *Flora Danica,* det är *Dansk Urtebog.* Kiøbenhavn 1648. 4:o.

Franc: = Joh. Franckenius, *Speculum Botanicum renovatum.* Ups. 1659. 4:to.

Fuchs: = Leon. Fuchsius, *De historia stirpium Commentarii.* Basileæ 1542. fol.

Heuch: = Joh. Henr. Heucherus, *Index plantarum horti medici Academiæ Wittembergensis.* Wittembergæ 1711. 4:to.

H. L. B. = P. Hermannus, *Horti Acad. Lugduno Batavi Catalogus.* Lugd. Bat. 1687. 8:vo.

H. Mal. = H. A. van Rheede tot Draakenstein, *Hortus Indicus Malabaricus.* Vol. I—XII. Amstelod. 1678—1693 fol.

H. *P. B.* = P. Hermannus, *Paradisus Batavus.* Lugd. Bat. 1698. 4:to.

H. R. Bles. = *Hortus Regius Blesensis.* Parisiis 1655. fol.

H. R. P. = Dionysius Joncquet, *Hortus Regius Parisiensis.* Parisiis 1665, ed. II 1666. fol.

H. Upl. = C. Linnæi *Hortus Uplandicus.* Mss. 1730.

Imp: = Ferrante Imperato, *Historiæ naturalis libri* XXVIII. Napoli 1599; Venetiæ 1672. fol.; Coloniæ 1695. 4:to.

J. B. = Joh. Bauhinus, *Historia plantarum universalis.* Vol. I—III Ebroduni (Yverdun) 1650, 1651. fol.

Johren: = M. D. Johrenius, *Vademecum botanicum* seu *Hodegus botanicus secundum methodum* Tournefortianam. Colbergæ (1710); Francofurti 1717. 8:vo.

Juss: = Antonius de Jussieu, *Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam a* Jac. Barreliero *observatæ.* Parisiis 1714. fol.

Knaut: *Meth.* = Christian Knaut, *Methodus plantarum genuina.* Lipsiæ et Halæ 1716. 8:vo.

Kram: = J. G. H. Kramer, *Tentamen Botanicum* sive *Methodus* Rivino — Tournefortiana. Dresdæ 1728. 8:vo.

Linder: = Joh. Linder nob. Lindestolpe, *Flora Wiksbergensis.* Stockholm 1716, ed. II 1728. 8:vo.

Lob: *Ic.* = M. Lobelius (de l'Obel), *Plantarum seu stirpium icones.* Vol. I—II. Antverpiæ. 1581 et 1591. 4:to. obl.

Loesel: = J. Loeselius, *Plantas in Borussia sponte nascentes.* Regiomonti Borussorum 1654. 4:to. — *Flora Prussica* s. plantæ in regno Prussiæ sponte nascentes curante Joh. Gottsched. Regiom. 1703. 4:to.

Matth: = Petr. Andr. Matthiolus, *Commentarii* in sex libros Pedacii Dioscoridis *Anazarbei de medica materia.* Venetiis 1570 fol.

Merian: = Maria Sibylla Merian, *Metamorphoses insectorum Surinamensium.* Amstel. 1705. fol. max.

MONT: = GIUS. MONTI, *Catalogi stirpium agri Bononiensis Prodromus.* Bononiæ 1719. 4:to.

MORIS: = R. MORISON, *Plantarum historiæ universalis Oxoniensis* Pars secunda. Oxonii 1680 fol.; Pars tertia. Oxonii 1699. fol.

MUNT: *Aloid.* = ABR. MUNTING, *Aloidarium.* Amst. 1680. 4:to; *De vera antiquorum herba Britannica.* Amst. 1681. 4:to.

NEAND: = J. NEANDER, *Tabacologia* h. e. *Tabaci seu Nicotianæ descriptio* medico-chirurgico-pharmaceutica. Lugd. Bat. 1622. 4:to.

PARK: *Par.* = J. PARKINSON, *Paradisi in sole Paradisus terrestris* ed. II. London 1656. fol.

S. PAUL: = SIM. PAULLI, *Quadripartitum botanicum* ed. III. Francofurti a. M. 1708. 4:to.

PET: *Gaz.* = JAM. PETIVER, *Gazophylacii naturæ et artis Decades* X. Vol. I—II. Londini 1702—1711. fol.

PET: *Cent.* } JAM. PETIVER, *Musei Centuria* I—X. Londini. 1692—1703. 8:vo.
PET: *Mus.* }

PIS: *H. Bras.* = GUIL, PISO, de *Indiæ utriusque re naturali et medica libri XIV.* Amstelæd. 1658. fol.

PLUCK: *Alm.* = LEON. PLUC'NETIUS, *Almagestum botanicum.* Londini 1696. 4:to.

PLUCK: *Phyt.* = L. PLUC'NETIUS, *Phytographia* seu stirpium illustrium et minus cognitarum icones P. I—IV. Lond. 1691—1696. fol.

PONT: *Ant.* } = GUILIO PONTEDERA, *Anthologia* sive de floris natura libri tres.
» *Diss.* } Accedunt ejusdem *Dissertationes* XI. Patavii 1718. 4:to.

Prod: = CASP. BAUHINUS, *Προδρομος Theatri Botanici* Francof. a. M. 1620. 4:to; ed II Basileæ 1671. 4:to.

RAJ: *Hist.* = JOAN. RAY l. RAJUS, *Historia plantarum* Vol. I—III. Londini 1686—1704. fol.

RAJ: *S.* = J. RAY l. RAJUS, *Synopsis methodica stirpium Britannicarum* ed. III. Londini 1724. 8:vo.

RENEAL: = P. RENEALMUS, *Specimen historiæ plantarum.* Parisiis 1611. 4:to

RIV: *irr. mon.* } = AUG. QUIR. RIVINUS, *Ordo plantarum, qvæ sunt flore irre-*
RIV: *irr. pent.* } *gulari monopetalo, tetrapetalo l. pentapetalo* Vol. I—III. Lipsiæ
RIV: *irr. tetr.* } 1690—1699. fol.

RUDB: *Vall. Jac.* = OL. RUDBECK senior, *Deliciæ Vallis Jacobææ.* Upsaliæ 1666. 12:mo.

RUDB: } = OL. RUDBECK (senior) *Hortus botanicus* (ed. III). Upsaliæ
RUDB: *H.* } 1685. 8:vo.

RUDB: *Camp. El.* = OL. RUDBECK *pater et filius, Campi Elysii* s. *Glysis Wald.* Lib. I & II Ups. 1702, 1701. fol.

RUDB: *fil. Act.* = OL. RUDBECK *filius, Index Plantarum, præcipuarum in itinere Laponico* 1695 *observatarum,* insertus *Actis Lit. Sveciæ* 1720 4:to. p. 95—100.

RUPP: } = H. B. RUPPIUS, *Flora Jenensis* s. enumeratio plantarum
RIV: *apud Rupp.* } tam sponte circa Jenam et in locis vicinis nascentium, quam in hortis obviarum, edita a JOH. HENR. SCHUTTEO. Francofurti et Lipsiæ 1718. 8:vo.

RUPP: *alt.* = *Flora Jenensis* ed. emendata et aucta. Francof. et Lips. 1726. 8:vo.

SCHEUCHZ: = J. SCHEUCHZERUS, *Agrostographia* sive *Graminum, Juncorum,* Cyperorum, Cyperoideum, iisque affinium *Historia.* Tiguri 1719. 4:to.

Sirbell ? ? ? *Methodus Umbelliferarum.*

Swert: = Eman. Sweertius, *Florilegium* Amstelod. 1647. fol.

Tabern: = Jac. Theod. Tabernæmontanus, *Neu vollkommentlich Kreuterbuch* jetzt wiederumb übersehen und verbessert durch Casparum Bauhinum. Vol. I—III. Francof. a. M. 1625. fol.

Tabern: *Ic.* = J. Th. Tabernæmontanus, *Eicones* [2255] *plantarum* tam inquilinarum quam exoticarum, quæ partim Germania sponte producit, partim ab exteris regionibus allata in Germania plantantur. Francof. a. M. 1590. 4:to. obl.

T. } = J. P. Tournefort *Institutiones rei herbariæ* ed. II. Vol. I—III.
Tourn: } Parisiis 1700, ed. III Lugd. Bat. 1719. 4:to.

Tourn: *Coroll.* = J. P. Tournefort, *Corollarium Institutionum rei herbariæ.* Parisiis 1703, Lugduni 1719. 4:to.

Vaill: = Seb. Vaillant, *Botanicon Parisiense.* Lugd. Bat. 1723. 8:vo, 1727. fol.

Vaill: *Act. Par.* = Seb. Vaillant in *Actis Regiis Parisinis* 1718—1722. 4:to.

Volck: = Joh. Georg Volckamerus, *Flora Noribergensis.* Noribergæ 1700. 4:to.

Zorn: = Barth. Zorn, *Botanologia medica.* Berlin 1714. 4:to.

SPOLIA BOTANICA

C: LINNÆI.



[Stenbrohults kyrka och prestgård, C: Linnæi fädernehem, vid sydöstra stranden af sjön Möklen.]

E Bibl. Linn. propriâ. 1784. J. Edmith.
S. T.

Spolia Botanica

sive

Planta Rariores

per

SMOLANDIAM

Scaniam

et

ROSLAGIAM

observatæ

et

enumeratæ

a

Carolo Linnæo Smolando

Med: Bot: et Zool: Cult.

Stipend: Reg.

Upsal: 1729.

VIRO

AMPLISSIMO ET CELEBERRIMO

D^NO LAURENTIO ROBERG

MEDICINÆ DOCTORI

ET

IN ACADEMIA UPSALIENSI

MEDICINÆ

THEORETICES ET PRAXEOS

PROFESSORI PUBLICO

PRÆCEPTORI

PATRONO

NEC NON

STUDIORUM MEORUM

PROMOTORI

D. D. D.

UPSAL: 1729
5 MAJ.

CAROLUS LINNÆUS.

L: B: S!

Topographia Botanica uti hwart och ett land giör otrolig nytta, att där af sluta inbyggarnas siukdomar, landets situation och qvaliteter, med många andra beskaffenheter, som man för kortheten skull förbijgår. När man igenom går således alla örter, finner man gemenl. wisa orter gynna wissa örter, så att på dett ena stället finnes i öfwerflöd, hwad som på andra sällan äl:r aldrig är att upsnappa. Ty hafwer jag allenast här satt mig före uprächna de örter, som antingen i anseende till hela Europa äro rara, äl:r och till de omkring liggande landskaper äro hwart och ett rum egentelige. Men såsom jag på många ställen i Swerige eij haft tillfälle ännu wistas, will jag allenast de tre hufwudorter Upland, Smoland och Skåne för mig taga, såsom jag på hwart ställe några somrar med Flora fådt förnöja min Botaniqve.

Smolandiam genom går jag först, såsom ett kiärt fädernesland, hwilket med sandgrus, backar, moras, liung, tahl, gran, en och stora skogar alt är genom wuxit. Hwar emällan friske siöar af hwariehanda botn, men besynnerl. sten, sand och grus grund allestädes finnas. Här sås säden gemenl. om wåren, utan att jorden skall wila sig och läggas för fäfot.

C. Linnæi egenhändiga handskrift eges nu af Linnean Society i London och förvaras i dess arkiv. Den omfattar VI + 32 sidor i 8:vo min. och är afslutad (utom appendix) i slutet af år 1729, huru mycket än tillegnans dato må synas strida emot ett sådant påstående. I denna liksom i närmast föregående uppsats föreligga synnerligen anmärkningsvärda bevis på den brytningsperiod och det utvecklingsarbete, hvari Linnæus vid denna tidpunkt var stadd. Han tager noggrann kännedom om och söker här tillämpa de tre förnämsta (Raji i England, Rivini i Tyskland och Tourneforts i Frankrike) systematiska framställningar för växtverlden, hvilka under senare hälften och mot slutet af närmast föregående århundrade framträdt och hvar för sig i sin framställares fädernesland vunnit erkännande samt nu utom desamma täflade om anslutning och bifall. Först då Linnæus ej fann sig till freds med något af dem, vågar han, sålunda genom grundliga studier förberedd, försöket att framställa sitt eget sexualsystem.

Stenbrohult är en sochn, som 5 mihl från Wexiö, neder mot Skånska gränsen uti Allbo härad är belägen, hwilken tycks, då man jämförer alla orter med henne, wara liksom en drotning bland systrarna; hon hafwer äfwen præferancen af rara och sälsama örter, som på de andra ställen i landet sällan äl:r aldrig låta se sig. Jag prästgården här tycks wara liksom af Flora siälf utsirad. Här hafwer jag med modersmiölken imprimerat uti mig de åtskillige örters diversa figur; om något rum uti hela wärlden kan wara ställdt på angenämare ort, twiflar jag mycket, ty är altså ej så underligt, om jag med Poëten hade orsak klaga

Nescio qva natale solum dulcedine cunctos
ducit et immemores non sinit esse sui.[1])

Will jag altså de rare örters catalog, som här finnas, först uprächna.

Scania här emot är till jordmon och situation helt contrair. Här finnas sällan några skogar, liung och siöar; utan hela landet är en slätt, bestående af lerjord, hela landet är snart sagt en åcker, så som jorden hwart tredie åhr gemenl. uprifves och besås, ty finner man här helt diverse örter ifrån dem man funnit i Småland, men tämel. öfwer ens stämmande med dem, som wäxa uti Upland.

Lund, såsom academien innehåller, wid hwilken jag wistats ett åhr allenast, hafwer omkring sig de mäste örter, som här komma att uprächnas, hwilka jag så mycket nogare komit att examinera, såsom jag 1728 hade åtskilliga discentes där att uti Botanicis inrätta.[2]) Hafsörterna hafwer jag tagit antingen wed *Malmöe* äl:r *Låmma* [Lomma] 1 mihl från Lund, ditt jag esomoftast gick att samla petrificationer i sanden wid hafsstranden. *Foglesång* är en gård $^3/_4$ mihl från Lund, hwar jämte naturen giort sina theatrar och konstspehl: här är en hög backe af pyritide men liksom uti 2:ne delar klöfd, genom hwilken en ström rinner. På bägge sidor in åht bäcken är öfwer wuxet med buskasie, hwar uti alle handa raraste örter finnas. Här skulle man wähl kunna swärja, att gudarne haft sitt sedes, såsom en angenäm ort för alla i wärlden.

Roslagia, såsom till jordmonen och andra qvaliteter mycket öfwerens kommande med Smoland, föder ungefähr samma örter. Hit kom jag att resa 1729 uti Junio[3] sub ductu S. S. D. O. Celsii att upfärska [utforska], hwad rara örter här måtte finnas, hwilken resa mig blef af Soc: Reg: et Sc: Sveciæ [ombetrodd]. Resan war altså mäst anställd, på dett man måtte kunna utfärska [utforska], hwad sälsama

örter uti skiären stodo till finnandes, ty begaf man sig åht *Öregrunds sidan* och *Gräsöen.*

Gräsöen, ett litet stycke från *Öregrund* belägen, giorde mig allena nöje en hehl dag d. 9 Julii hwaräst jag på den korta tiden åtskillige fan, besynnerl. wid hafsbrädden och hade ingen twifwel warit med mindre flere funnits, om jag fåt komit till yttre stranden.

Karöen en öe[4] eij långt från *Östhammar* fägnade mig äfwen med några rara och angenämma örter, som jag äfwen skall uprächna med hwad jag funnit i fram- och bortresan.



[Cl. I.] CAMPANIFORMES. [Tourn:][5]

1. GENTIANA angustifolia autumnalis major *C. B:* 188. *Tourn:* 81. Pneumonanthe *Tabern:* II. 470. In Scania m̄ [= item] copiose. Uplandia nunqvam.

2. TETRALIX[6] coridis folio. Erica ex rubro nigricans scoparia *Tourn:* 602. [ändradt till:] Erica humilis cortice cinereo arbuti flore *C. B:* 486. Uplandia rarissime.

3. CELSIA.[6] Erica palustris flore purpurascente, pendulo, petiolo longo, rubro: rosmarini [Rorismarini] folio. *Rudb: Act. Lit. S.* 1720 p. 97. In Uplandia copiose. Hujus character vide in *Fundamenta mea Botanica.*[7]

4. Rudbeckia f. Campanula Serpilli folio [*C. B:* p.] 93. *Tourn:* 112. *Rudb: Act. Lit. Svec.* 1720 p. 96. f. 1. optima. Nummularia norvegica flore purpureo. [*P. Kyllingius* in] *Act. Med. Haffn.* Vol: 2. [Hafniæ 1673. 4:to] obs: 130 pagin: 346 fig: mal. Nummularia Norwegica repens folio dentato, floribus geminis *Petiv: Mus.* 76. Wid Hallaryd och Pjetteryd. Character hujus vide ibd. *Fund. Bot.*[7] In Uplandia raro, in Nericia et Laponia copiosissime, in Roslagia m̄ [= item] copiose.

5. SCABIOSA globularis, qvam ovinam vocant *J. B:* III. 13. [12]. Rapunculus scabioso capitulo cæruleo *C. B:* 92. *Tourn:* 113. In montibus siccioribus et sole adustis Stenbrohultensibus.

---

1. G. Pneumonanthe Linné, *Species Plantarum* (ed. I 1753) p. 228, ed.] II (1763) p. 330. **2.** Erica Tetralix L: anf. st. p. 353 och 502. **3.** Andromeda Polifolia L: p. 393 och 564. **4.** Linnæa borealis L: p. 631 och 880; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 320 och 321. **5.** Jasione montana L: p. 928 och 1317.

[Cl. II.] INFUNDIBILIFORMES.

6. HOTTONIA *Boerh:* 207. Myriophyllum *Rivini.* Millefolium aqvaticum s: Viola aqvatica caule nudo *C. B:* 141. Foeniculum aqvatic: II *Tabern:* II [I] p. 177. Wid Moheda prästgård allenast har jag funnit henne i Småland. Uti Upland och Skåne copiose.

7. TRIENTALIS *Rivinus* apud *Rupp:* 15. Pyrola alsines flore europæa *C. B:* 191. Alsinanthemos *Raj:* S. 286.

Pyrola alsines flore major *C. B: Prodr.* 100 ab hac nil differt. m̄ [= Item] in Uplandia.

8. PLANTAGO monanthos. Plantago palustris, gramineo folio, monanthos, Parisiensis *Tourn:* 128. Gramen junceum minus [s. Holosteum minimum palustre], capitulis longissimis filamentis donatis. *Moris:* III p. 230. s. 8. t. 9 f. ult. [30] optima. Gramen junceum s: Holosteum minimum palustre, capitulis 4, longissimis staminibus donatis *Pluck: Phyt.* [Vol. I: p.] XXXV fig. 2 optima. Caryophyllus marinus pumilio reptans *Burs:* [*herb. sicc.* Vol.] XI. 124. Ad littora lacus Möklen prope templum Stenbrohultense cum Dortmanna floret. In Uplandia vel Scania adhuc non reperta. Vid. Tab. II. fig. 1.

9. SAMBUCUS humilis s: Ebulus *Tourn:* 606. *C. B:* 456. Ebulus *Pont: Ant.* 270. *Till:* f. 102. Vid Wexiö och Östra gård på ett ställe:

[Cl. III.] PERSONATI.

10. LENTIBULARIA *Riv: m. irr.* [tab. 79]. fig. bona. *Dill: N. pl. g.* [pag. 115. tab. VI.] Millefolium aqvaticum lenticulatum *C. B:* 141. m̄ [= Item] in Uplandia.

11. DORTMANNA Lacustris floribus sparsis pendulis *Rudb: f: Act: Lit. Sv.* 1720 p. 97. fig. 2 opt. Leucojum palustre flore subcæruleo *C. B:* 202. Gladiolus palustris [= lacustris] Dortmanni *R:* [*Raii Syn:* ed. III p.] 287. Omnium copisissime ad littora lacus Möklen prope templum Stenbrohultense. — [»Crescit in stagnis fundo glareoso non longe a littoribus in lacu möklen Smolandiæ; mälaren Uplandiæ; Kiællsletten Dalekarliæ, ad ripas fluvii Dalelfwen ad pagum Elfkarleby in Svecia.» *L: Hort. Cliff.* p. 427].

---

6. H. palustris L: anf. st. p. 145 och 208. **7.** Tr. europæa L: p. 344 och 488. **8.** Pl. uniflora L: p. 115 och 167; jfr. sid. 41 n. 3 härofvan. **9.** S. Ebulus L: p. 269 och 385. **10.** Utricularia vulgaris L: p. 18 och 26. **11.** Lobelia Dortmanna L: p. 929 och 1318; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 426 och 427.

12. ARUM petalo plano. Arum aqvaticum *Johren:* 32. Dracunculus palustris s: radice arundinacæa Plinii *C. B:* 195. m̄ [=Item] in Uplandia copiose: in Scania non.

13. LINARIA arvensis cærulea *C. B:* 213. *Tourn:* 170. Linaria arvensis cærulea erecta *C. B: Prodr.* 107. Prope Wexioniam invenit Mag: *Lannerus*[8] mihiqve ostendebat; alias in Svecia rarissima.

14. XYLOSTEUM *Riv: m. irr.* [tab. 121] Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro *C. B:* 451. *Tourn:* 609. Allenast ett stånd har jag funnit på öen Möklanäs, hwilken är ett helt sätterij uti Stenbrohults sochen. Samma öe är älliest upfyld med allehanda rara örter. In Scania et Uplandia copiosissime provenit.

[Cl. V.] CRUCIFORMES.

15. SUBULARIA erecta Junci foliis acutis rotundis *R:* [mollibus *Raj: Syn.* ed. III p.] 307. Graminifolia aqvatica Thlaspeos, capitulis rotundis, sepimento siliculam dirimente *Pluk: Phyt.* CLXXXVIII f: 5. A D: Sherard[9] inventa omnium primo. Ego sæpius eam vidi cum Plantag: monanth: Vid. Tab. II fig. 2.

16. RAPHANUS [RAPHANISTRUM] siliqva articulata glabra majore et minore *Moris:* II. p. 265. s. 3. t. 13. [f. 1 & 2]. *Tourn:* 230. inter segetes.

[Cl. VI.] ROSACEI.

17. THALICTRUM minus *Tourn:* 271. *C. B:* 337. Ubiqve in Smolandia. In Scania vel Uplandia numqvam.

18. RADIOLA *Dill: Cat.* 161. *N. pl. g.* 126. Radiola vulgaris serpyllifolia *R:* [*Raj: Syn.* ed. III p.] 345. Tab: XV. f: 3. Chamælinum vulgare *Vaill:* 33. Polygonum minimum sive Millegrana minima *C. B:* 282. In viis publicis ubiqve. In Scania l. Uplandia adhuc non detecta. [»Vidimus juxta vias publicas sabulosas subhumidas juxta natale Stenbrohult & Roshult.» *L: Hort. Cliff.* p. 114.]

---

12. Calla palustris L: anf. st. p. 968 och 1373. **13.** Antirrhinum arvense L: p. 614 och 855, eller måhända A. repens L: p. 614 och 854. **14.** Lonicera Xylosteum L: p. 174 och 248. **15.** S. aquatica L: p. 642 och 896. **16.** Raphanus Raphanistrum L: p. 669 och 935. **17.** Th. minus L: p. 546 och 769 efter synonym.; men torde väl snarare afse Th. simplex L: *Fl. Svec.* ed. II sp. 490, *Mantissa* I: p. 78 och S. Rogberg *Smålands Beskrifning* s. 22. **18.** Linum Radiola L: *Spec. Pl.* (ed. I.) p. 281 och ed. II. p. 402.

19. SEMPERVIVUM majus *Dill:* 142. *Matth:* 703. Sedum majus vulgare *C. B:* 283. *Tourn:* 262. På taken hoos hwar bonde.

20. HYDROCOTYLE *Tourn:* 382 [328]. Ranunculus aqvaticus, Cotyledonis folio *C. B:* 180. Cotyledon palustris *Dod:* 133. Acaricoba, Lusitanis Erva do Capitaon *Pis: H. Bras.* 90. Cum Plant: monant: In Uplandia vel Scania non adhuc reperta.

21. MALUS sylvestris fructu amaro. Adhuc non descripta. Varietas vulgaris.

22. PYROLA monanthos. Pyrola flore singulari *Riv: pent. irr.* [tab. 366. f. 1.]. Pyrola rotundifolia minor *C. B:* 191. *Tourn:* 256. Emällan Wexiö och Holstorp.

23. PYROLA frutescens Arbuti folio *C. B:* 191. *Tourn:* 256. Pyrola [III] fruticans *Clus: pan.* [descr. p. 505. fig. p.] 507. Wid Gotusa[10]) i skogen.

24. BUTOMUS spitamalis. Juncus floridus minor *C. B:* [*Pin.* p.] 12. *Prodr.* 23. Juncoidi affinis, palustris *Scheuchz.* 336. c. descript. Gramen junceum, aqvaticum, semine racemoso *Loesel:* 114. f. 20. [fig. in tab. 28.] [»Stenbrohults prestgård på Maen» *L. Öländska Resa* s. 316.]

25. RANUNCULUS foliis integris oblongis, repens. Ranunculus parisiencis pumilus, Plantaginellæ folio *Raj: Hist.* III. *app.* 248 *R:* 3. *Petiv: Cent.* [*Gazopyl.* tab.] XXV. [*Decas* III. p. 40.] f: 4. Vid. Tab: II. fig: 3.

26. CORNUS herba. *H. Upl.* 5. [sid. 50][11]). Mesomora alba baccis in corymbo rubris. *Rudb: f: Act. Lit. Sv.* 1720 p. 97 [98]. Herba paris flore magno polyclonos [polycoccos] edulis *Rudb: f: Lapon: Ill:* p. 11. Periclymenum humile Norvegicum *C. B:* 302. Periclymeno accedens planta monanthos nostras *Moris:* III p. 535. Ad templum Stenbrohultense copiosissime. In Uplandia rarissima.

27. AGRIMONIA officinarum *Tourn:* 301. Eupatorium veterum s: Agrimonia *C. B:* 321.

---

19. S. tectorum L: anf. st. p. 464 och 664. **20.** H. vulgaris L: p. 234 och 338; jfr L:r *Öländska Resa* s. 316. **21.** Pyrus Malus sylvestris L: p. 479 och 686. **22.** P. uniflora L: p. 397 och 568. **23.** P. umbellata L: p. 396 och 567. **24.** Scheuchzeria palustris L: p. 338 och 482. **25.** R. nodiflorus L: p. 549 och 773 efter synonym.; men här menas utan tvifvel R. reptans L: p. 549 och 773; jfr L: *Fl. Lapp.* med beskrifning p. 190 sp. 236. tab. III. fig. 5, *Fl. Svec.* (ed. I.) sp. 459, ed. II. sp. 495. — »Habitat ad littora lacuum Mæleri Uplandiæ, Moeklen Smolandiæ, Venneri Westrogothiæ alibique rarius». L: Fl. Svec. — »Habitat in Suecia, Russia ad ripas lacuum, antecedenti [R. Flammulæ] valde affinis & forte varietas». L: Spec, Plant. — **26.** C. suecica L: Spec. Pl. (ed. I.) p. 118 och ed. II. p. 171; jfr L:r *Skånska Resa* s. 417. **27.** A. Eupatoria L: p. 448 och 643.

28. RUBUS humilis palustris, fructu ex rubro flavescente *Rudb: f: Act. Lit.* 1720 p. 99. Chamærubus folio ribis [foliis Ribes] *C. B:* 480. Chamæmorus *R:* [*Syn.* ed. III. p.] 260. Copiositate sua satiat pueros.

[Cl. VII.] UMBELLATI.

29. PODAGRARIA flore luteo. Angelica Acadiensis, flore luteo *Tourn:* 313. Hon fins wid Stenbrohult allenast på ett ställe, som kallas fähushålan. Planta alias in oris nostris rarissima.

[Cl. VIII.] CARYOPHYLLÆI.

30. BEHEN. Lychnis sylvestris, qvæ Behen album vulgo *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Muscipula pratensis vesicaria *Rupp:* [*Fl. Jenensis* ed. II p. 100]. Ad margines agrorum copiose.

[Cl. IX.] LILIACEI.

31. PHALANGIUM Anglicum palustre, Iridis folio *Tourn:* 368. Pseudo asphodelus palustris Anglicus *C. B.* 29. Asphodelus [minimus] luteus palustris Acorifolio *Moris:* II. p. 332. s. 4. t. 1. f. 7. Asphodelus luteus palustris *Dod:* 208. fig. bon. [»Stenbrohults prestgård i Fähus-hohlan» L: *Öländska Resa* s. 316, *Skånska Resa* s. 417]. Dett kallas af inbyggarna *Ilegräs* och säges wara helt skadeligt för fåhren, ty kommer detta öfwer ens med Gramen ossifragum norvagicum *Sim. Pauli Quadrip: botanic:* p. 50 [530] till beskrifning, som krafter.

32. TRIGLOCHIM fructu oblongo. Triglochim *Riv:* [Rivini *Rupp. Fl. Jenens.* (ed. I) p. 47]. Juncago palustris et vulgaris *Tourn:* 266. Gramen junceum, spicatum s: Triglochim [triglochin] *C. B:* 6.

[Cl. XI.] ANOMALI.

33. VIOLA palustris rotundifolia glabra *Moris:* II. 475. *Tourn:* 420. Nota specifica vera est labium superius emarginatum, alias e gente martiali est. Denna sälsamma planta fins wid Stenbrohult uti fähusholan.

---

28. R. Chamæmorus L: anf. st. p. 494 och 708. **29.** Smyrnium aureum L: p. 262 och 377 efter synon.; men torde afse Ægopodium Podagraria L: p. 265 och 379. **30.** Cucubalus Behen L: p. 414 och 591. **31.** Anthericum ossifragum L: p. 311 och 446; jfr L: *Fl. Lapp.* sp. 136. **32.** Tr. palustre L: p. 338 och 482. **33.** V. palustris var. L: p. 934 och 1324; jfr L: *Fl. Lapp.* sp. 278 β.

[Cl.] X. PAPILIONACEI.

34. LATHYRUS sylvestris major *C. B:* 344. *Tourn:* 395. Lathyrus sylvestris *Dod:* 514 [in ed. 1583]. In pratis siccioribus.

35. VICIA semine rotundo nigro *C. B:* 345. Vicia angustifolia *Riv: tetr. irr.* [t. 55]. Vicia vulgaris sylvestris, semine parvo nigro frugum *J. B:* II. 312.

36. OROBUS folio Viciæ *Riv: tetr. irr.* [tab. 185]. Orobus sylvaticus Viciæ foliis *C. B:* 352. *Tourn:* 393.

[Cl. XII.] FLOSCULOSI.

37. JACEA nigra pratensis [latifolia] flore albo *Tourn:* 443. Cyanoides vulgaris latifolia flore albo *Pont: Diss:* 218.

Eadem disco purpureo cum corona candida wid Stockanäs c. priori uti Stenbrohults socken.

38. EUPATORIUM cannabinum *C. B:* 320. *Tourn:* 456. Eupatorium vulgare *Matth:* 648 [»Wäxer i Smoland wid Dio Gästgifware Gård och där omkring» *L: Kgl. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 204].

[Cl. XIV.] RADIATI.

39. ARNICA *Scrodæri [Schroederi] Rupp:* 163 [ed. II. p. 141]. Alisma *Matth:* 604. Doronicum plantaginis folio alterum *C. B:* 185. *Tourn:* 487. På alla ängar och backar i Småland och Skåne. [»på Snickelien» *L: Öländska Resa* s. 316].

40. JACOBÆA vulgaris laciniata *C. B:* 131. *Tourn:* 485. Jacobæa *Dod:* 642 [in ed. 1616].

[Cl. XV.] APETALI.

41. PERCEPIER Anglorum *Dill:* [*Cat.* p.] 60. *N. pl. g.* 94. [t. III]. Alchymilla [Alchimilla] montana minima *Column:* [*Ecphr.* p. 145]

---

34. L: sylvestris L: anf. st. p. 733 och 1033. **35.** V. sativa β nigra L: *Spec. Pl.* ed. II. p. 1037. **36.** O. niger L: *Spec. Pl.* (ed. I.) p. 729 och ed. II. p. 1028. **37.** Centaurea Jacea var. L: p. 914 och 1293. **38.** E. cannabinum L: p. 838 och 1173. **39.** A. montana L: p. 884 och 1245; jfr *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 205 och L:i *Öländska Resa* s. 316. **40.** Senecio Jacobæa L: p. 870 och 1219. **41.** Aphanes arvensis L: p. 123 och 179.

t. 146. *Tourn:* 508. Chærophyllo non nihil similis *C. B:* 152. Scandix minor *Tabern:* I: 474 [274] fig. mal. Wid Stenbrohult. [»wid Humblegårdarne» *L: Öländska Resa* sid. 316].

42. PANICUM vulgare spica simplici et aspera *Tourn:* 515. Panicum [Gramen paniceum] spica simplici *ἐλυμάγρωστις C. B:* 8. Gramen paniceum spica aspera *Sch:* 46 [47.] [»Wäxer wid Stenbrohults Kyrka i Smoland bland säden brede wid wägarne *L: Kongl. Vet. Akad:s Handl.* 1741. s. 183].

[Cl. XVII. FLORE FRUCTUQUE CARENTES].

43. SPONGIA ramosa fluviatilis Newtoni *Tourn:* 576.

44. CONFERVA arborea cinerea vulgaris brevior cum orbiculis *Dill:* [*Cat.* p.] 200. Musco-fungus arborum capillaceus scutellis [scutis] amplis, per ambitum pilis radiatis *Moris:* III. p. 635. s. 15. t. 7. f. 14. Muscus arboreus cum orbiculis *C. B:* 361.

[Cl. XIX.] AMENTACEI.

45. FAGUS *C. B:* 419. *Tourn:* 584. *Matth:* 160.

46. BETULA palustris nana *Rudb: f. Act. Lit. S.* 1720. p. 96. Vid. Tab. I. fig. 1.

47. GALE mas.

48. GALE foemina. Gale frutex odoratus Septentrionalium [*J. B:* I. P. 2. p. 225] *Dill: app.* 154. Rhus myrtifolia Belgica *C. B:* 414.

49. SALIX oblongo incano acuto folio *C. B:* [*Pin.* 474. *Prodr.* 159]. *Tourn:* 591. E Scania transtulit pater ad Stenbrohult.

---

42. P. viride L: *Spec Pl.* ed. II p. 83. **43.** ? Spongia lacustris L: *Spec. Pl.* (ed. I.) p. 1171, *Fl. Svec.* (ed. I.) sp. 1132, ed. II. sp. 1190; jfr L:1 *Öländska Resa* s. 316 och *Skånska Resa* s. 420. **44.** Lichen floridus L: *Spec. Pl.* (ed. I.) p. 1156, ed. II. p. 1624. **45.** F. sylvatica L: p. 998 och 1416. **46.** B. nana L: p. 983 och 1394. **47 & 48.** Myrica Gale L: p. 1024 och 1453. **49.** Enligt synonymet från Casp. Bauhini *Pinax*, ehuru endast med frågetecken upptaget i L: *Fl. Lapp.* under sp. 366 tab. VIII. fig. t., skulle denne vara Salix lapponum L: *Fl. Svec.* (ed. I.) sp. 808, ed. II. sp. 893, *Spec. Pl.* (ed. I.) p. 1019 och ed. II. p. 1447. — I *Fl. Svec.* anmärker dock L: härom: »Adeo affinis est Salici arenariæ, ut forte sola varietas, a qua differt foliis supra magis villosis, foliisque longioribus & undulatis».



[Cl. I.] MONOPETALI REGULARES [Rivinus][12].

1. SHERARDIA *Dill: Nov. pl. gen.* 96. Rubeola arvensis repens cærulea *C. B:* [*Pinax* p.] 334 *Prod.* 145. Aparine supina, pumila, flore cæruleo *Tourn:* 114. In agris.

2. MALVA vulgaris, flore majore, folio sinuato *Tourn:* 95. Malva sylvestris folio sinuato *C. B:* 314. Ad muros et sæpes circa Londinum copiose.

3. ANAGALLIS phoeniceo flore *C. B:* 252. *Tourn:* 142. Anagallis mas *Dod:* 32. Variat foliis oppositis ternis, imo sæpe qvaternis.

4. CENTAURIUM minus *C. B:* 278. *Matth:* 446. *Tourn:* 122. Emällan Malmoe och LandsCrona.

5. CENTAURIUM semiunciale Tab: III. fig. 1.

Allenast en sådan fant jag straxt wid Lund på trädet äl:r åkrarna, som wilade sig. Hon war 7 lineai longa, flore unico in summitate minimo, tubulato, 5 fido, acutissimo, purpureo; wid sidan tycktes skola komma uht en annor blomma non ramosa. Folia opposita, sesqvilineam longa, vix integram lineam lata. Om detta skulle wara en dwärg af föregående, har naturen här sökt mästerstycke till att giöra mignateur, dett jag dock eij tror. Hon fins ännu uti mitt Horto sicco. [13]

---

1. Sh. arvensis L. *Species plantarum* (ed. I. 1753) p. 102, ed. II. (1763) p. 149. **2.** M. sylvestris L: anf. st. p. 689 och 969. **3.** A. arvensis L: p. 148 och 211. **4.** Gentiana Centaurium L: p. 229 och 332. **5.** G. Centaurium β var. L:; jfr sid. 30 n. 8 härofvan.

6. FAGOPYRUM vulgare erectum *Tourn:* 511. Erysimum Theophrasti folio hederaceo *C. B:* 27. Frumentum Saracenicum *Matth:* 305.

7. POLYGONUM [POLYGONATUM] foliis plurimis ad singulos nodos. Polygonatum angustifolium non ramosum *C. B:* 303. *Tourn:* 78. Polygonatum [V] angustifolium I *Tabern:* II. 434.

8. BRYONIA aspera s: alba baccis nigris *C. B:* 297. *Tourn:* 102. Vitis alba *Matth:* 791. Bryonia alba baccis nigris. F. *Dan.* 30

[Cl. III.] TRIPETALI REGUL:

9. SAGITTARIA. Sagitta aqvatica minor angustifolia *C. B:* 194. conf: *Dill: N. pl. gen.* 126 [p. 104. t. IV]. Sagitta aqvatica minor latifolia *C. B:* ibd. [*Pin* p. 194] Ranunculus palustris, folio sagittato minori, etiam angustiori *Tourn:* 292.

10. MORSUS, Stratiotes foliis Asari [asari folio]. *Gundelsheim*[*er*] apud *Johrenium.* Morsus Ranæ foliis circinatis, fl. albis *Tourn:* [*Act. Par.* 1705. p. 237.] *Dill: N. pl. g.* [p. 149 t. IX]. Nymphæa alba minima *C. B:* 193. Hæc non secus ac antecedens in rivulis sæpissime obvia.

[Cl. IV.] TETRAPETALI REGULARES.

11. CAKILE maritima angustiori folio *Tourn: Coroll.* 49. Eruca maritima Italica siliqua hastæ cuspidi simili *C. B:* 99. *Moris:* II. p. 231. s. 3 t. 6. f. 21. Cakile qvibusdam aliis Eruca marina et Raphanus marinus [aqvaticus] *J. B:* II. 867. Wid hafsbrädden hoos Lumma [nära Lomma].

12. DRABA fruticosa incana *Dill: app:* 17. Alysson fruticosum incanum. *Tourn:* 217. Thlaspi fruticosum incanum *C. B:* 118 [108]. Iberis [I] *Tabern:* II. 170. In agris reqvietis. [»Lundinum & Malmogiam Sveciæ» *L: Hort. Cliff.*p. 332].

13. IBERIS petræa foliis Bursæ pastoris *Dill:* [*Cat.* p.] 80. *N. pl. g.* 123 [t. VI]. Nasturtium petræum foliis bursæ pastoris *C. B:* 104. *Tourn:* 214. Nasturtium petræum *Tabern:* II. 164. In campis arenosis.

---

6. Polygonum Fagopyrum L: anf. st. p. 364 och 522. **7.** Convallaria verticillata L: p. 315 och 451. **8.** Br. alba L: p. 1012 och 1438. **9.** S. sagittifolia L: p. 993 och 1410. **10.** Hydrocharis Morsus ranæ L: p. 1036 och 1466. **11.** Bunias Cakile L: p. 670 och 936. **12.** Alyssum incanum L: p. 650 och 908. **13.** I. nudicaulis L: p. 650 och 907; jfr L: *Fl. Svec.* (ed. I), sp. 536, ed. II, sp. 581.

14. BULBONAC radice rediviva [flore cinereo] *Rupp:* [ed. II. p.] 70. Lunaria major siliqva longiore *Tourn:* 218. Viola Lunaria major siliqva oblonga *C. B:* 203. Denna har jag funnit uti en backe öfwerwuxen med buskasie, straxt wid landswägen emällan Hörby och Horre intet långt från endera af them. [»In Scania inter Christianopolim & Lundinum & quidem inter diversoria publica Horva & Horre juxta viam in colle.» *L: Hort. Cliff.* p. 333] [14].

15. CARDAMINE [sub]hirsuta minore flore *Dill:* [*Cat.* p.] 76. Nasturtium aqvaticum minus *C. B:* 104. Cardamine IV Dalecampi [Dalechampii] *T:* 284. [224]. Straxt utanför Malmö uti en sidlänt äng. Vidi florentem die 1 maji.

15 ½.

16. OSSEA *Loniceri et Rivini Rupp:* 82 [ed. II. p. 73]. Virga sangvinea *Dill: N. pl. g.* 145. *Matth:* 192 [193]. Cornus foemina *C. B:* 447. *Tourn:* 641. Där skogsbygden och slätten gräntzar tillhopas.

17. EVONYMUS vulgaris granis rubentibus *C. B:* 428. *Tourn:* 617. Evonymus [Evonimus] *Matth:* 152.

[Cl. V.] PENTAPETALI REGULAR:

18. ALSINE littoralis foliis Portulacæ *C. B:* 251. *Tourn:* 242. Alsine maritima [marina] foliis portulacæ *Loesel:* 2 [ed. II. 1703 p. 12.] fig. 2. Wid Låmma hafsstrand.

19. RUPPIA latifolia. Alsine pratensis gramineo folio ampliori *Tourn:* 243. Caryophyllus arvensis glaber flore majore *C. B:* 210. Gramen *Fuchs:* 136. Wid Malmoë.

20. MUSCIPULA hispanica, latifolia, umbellata, lævis *Rupp:* [ed. II. p.] 100. Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Lychnis viscosa alba latifolia *Tourn:* 336. *C. B:* 205. Emällan Lund och Ystad.

---

14. Lunaria rediviva L: anf. st. p. 653 och 911. **15.** C. hirsuta L: p. 655 och 915. **15** ½. [Thalictrum alpinum. aquilegiæ foliis, florum staminibus purpurascentibus *Tournef. inst.* 270. Thalictrum majus, florum staminibus purpurascentibus *Bauh: pin.* 337. Crescit in Scania prope Lundinum ad pagum Fogelsong.» L: *Hort. Cliff.* p. 226.] = Th. aquilegifolium L: p. 547 och 770. **16.** Cornus sanguinea L: p. 117 och 171. **17.** E. europæus L: p. 197 och 286. **18.** Arenaria peploides L: p. 423 och 605. **19.** Stellaria Holostea L: p. 422 och 603. **20.** Silene Armeria L: p. 420 och 601; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 172, E. Fries *Flora Scan.* p. 86 och *Novitiæ Floræ Suecicæ* ed. II Londini Goth. 1828. 8:o p. 117.

[Cl. VII.] POLYPETALI REGULARES.

21. ANEMONOIDES nemorosa, lutea *Vaill:* 12 Anemone Ranunculus flore luteo *Dill:* [*Cat.* p.] 39. *N. pl. g.* 10 [p. 107 t. IV]. Nemorosa flore minore luteo modo unico, modo gemino [gemello] *Rupp:* [ed. II. p.] 128. Ranunculus nemorosus luteus *C. B:* 178. *Tourn:* 285. Wid Hwitsiöfle [Widtsköfle]. [15] copiose.

[Cl. XI.] MONOPETALI IRREGULARES.

22. VALERIANELLA mas et foemina *mihi.* Valeriana palustris minor *C. B:* 164. *Tourn:* 132. Valeriana minor *Riv: mon. irr.* [tom. I. tab. 2]. Valeriana minima *Dod:* 347. Phu minimum *Matth:* 35. In campis humidioribus vere floret.

23. DICHOTOMIA. Locusta [major & minor] *Riv: mon. irr.* [tom. I. t. 6]. Valeriana campestris inodora major *C. B:* 165. Valerianella arvensis, præcox, humilis, semine compresso *Tourn:* 132.

24. NEPETA *Riv: mon. irr.* [tom. I. tab. 52]. Cattaria major vulgaris *Tourn:* 202 Mentha cataria vulgaris et major *C. B:* 228.

25. VERONICA folio hederæ *Riv: mon. irr:* [tom. I. tab. 99]. Veronica Cymbalariæ folio, verna *Tourn:* 145. Alsine hederulæ folio *C. B:* 250. Alsine hederacea *Tabern:* II. 390. Wid Spetalet [Hospitalet] i Lund.

26. VERONICA verna, trifido vel qvinqvefido folio *Tourn:* 145. Veronica folio Rutæ *Riv: mon. irr.* [tom. I. tab. 96]. Alsine triphyllos cærulea *C. B:* 250. Wid Hwitsiöfle. [Widtsköfle].

Ab hac probe distingvenda est Veronica humilis erecta montana, flore parvo cæruleo *Dill. Nov. pl.* species 38, qvæ cito incautos fallit, qvemadmodum seduxit *C. Bauh:*, ut pro eandem habuerit.

27. MELAMPYRUM purpurascente coma *C. B:* 234. *Tourn:* 173. Melampyrum arvense *Riv: mon. irr.* [tom. I. tab. 80.]

---

21. Anemone ranunculoides L: anf. st. p. 541 och 762. **22.** Valeriana dioica L: p. 31 och 44; jfr L:1 *Öländska Resa* s. 46. **23.** Valeriana Locusta α olitoria L: p. 33 och 47. **24.** N. Cataria L: p. 570 och 796. **25.** V. hederæfolia L. p. 13 och 19. **26.** V. triphyllos L: p. 14 och 19; jfr »*Plantæ Roslagicæ*» p. 80 n. 33 härnedan. **27.** M. arvense L: p. 605 och 842.

[Cl. XIV.] DIPETALI [TETRAPETALI Riv:] IRREGULARES.

28. FUMARIA bulbosa radice cava major (*C. B:* 143) flore rubro dilutiore *Tourn:* 422, Pseudo-fumaria *Riv: tetr. irr.* [tom. II. tab. 198]. Fumaria altera *Matth:* 722. Fumaria bulbosa *Till:* fig. 52.

29. FUMARIA bulbosa radice cava maj: flore albo *Tourn:* 422. *C. B:* 143. Cum antecedenti, ubi Bulbonac crescit, observavi.

[Cl. XV.] TRIPETALI [PENTAPETALI Riv:] IRREGULARES.

30. LUTEOLA *Dill:* [*Cat.* p.] 92. Luteola herba salicis folio *C. B:* 100. *Tourn:* 423. Pseudo-struthium *Matth:* 406. På wallarna kring Lund.

[Cl. XIV.] TETRAPETALI IRREGULARES.

31. MELILOTUS officinarum Germaniæ *C. B:* 331. *Tourn:* 407. Melilotus *Riv: irr. tetr.* [tom. II. tab. 131]. Trifolium odoratum s: Melilotus vulgaris flore luteo *J. B:* II. 370. [fig. erronea e *L: Hort. Cliff.* p. 376].

32. MELILOTUS procumbens. Melilotus minima *Riv: tetr. irr.* [tom. II. tab. 133]. Melilotus capsulis reni similibus in capitulum congestis *Tourn:* 407. Trifolium pratense luteum capitulo breviore *C. B:* 328.

33. FALCATA herbacea procumbens. Falcata *Riv: tetr. irr.* [tom. II. tab. 209]. Medica sylvestris floribus croceis *Tourn:* 410. Trifolium pratense [sylv:] luteum siliqva cornuta l. Medica frutescens flore luteo *C. B:* 330.

34. ANONIS spinosa flore purpureo *C. B:* 389. *Tourn:* 408. Anonis *Riv: tetr. irr.* [tom. II. tab. 194]. Ononis *Matth:* 458.

35. ANONIS spinis carens purpurea *C. B:* 389. *Tourn:* 408.

---

28 & 29. F. bulbosa α cava L: anf. st. p. 699 och 983. **30.** Reseda Luteola L: p. 448 och 643. **31.** Trifolium Melilotus officinalis L: p. 765 och 1078. **32.** Medicago lupulina L: p. 779 och 1097. **33.** Medicago falcata L: p. 779 och 1096; jfr *K. Vet. Akad:s Handl.* 1742 s. 194—198; E. Fries *Fl. Scan.* p. 104 och *Mantissa III* Lundæ & Ups. 1843. 8:vo p. 93 **34.** Ononis spinosa β L: p. 716 och 1007. **35.** O. spinosa α mitis L:; jfr E. Fries *Mant. III* p. 201.

36. ASTRAGALUS luteus perennis procumbens vulgaris s: sylvestris *Moris:* II. 107. *Tourn:* 416. Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus *C. B:* 352. Foenum græcum sylvestre [siluestre] primum *Dod:* 537 [ed. 1583]. Astragalus *Riv: tetr. irregul.* [tom. II. tab. 227]. Cum Bulbonac.

37. ANTHYLLIS *Riv: tetr. irr.* [tom. II. tab. 143]. Vulneraria rustica *Tourn:* 391. Loto affinis, Vulneraria pratensis *C. B:* 332.

38. ESULA foliis rotundis non crenatis. Tithymalus rotundis foliis non crenatis *Tourn:* 87. Peplus sive Esula rotunda *C. B:* 292.

[Cl. XV.] PENTAPETALI IRREGULARES.

39. PERFOLIATA *Riv: pent. irr.* [t. III. tab. 259]. Perfoliata vulgatissima sive arvensis *C. B:* 277. Bupleurum perfoliatum, rotundifolium, [annuum] *Tourn:* 310.

40. OENANTHE aqvatica *C. B:* 162. *Tourn:* 313. Oenanthe *Riv: pent. irr.* [tom. III. tab. 279]. Juncus odoratus aqvatilis *Dod:* 530 [p. 580 in ed. 1583, p. 590 in ed. 1616]. Cum Eqviseto aqvatico.

41. SIUM latifolium *C. B:* 154. *Tourn:* 308.

42. IMPATIENS *Riv: pent.* [16] *irr.* [tom. II. tab. 245]. Balsamina lutea s: Noli me tangere *Tourn:* 419.

43. DELPHINIUM segetum flore coeruleo *Tourn:* 426. Consolida regalis arvensis flore cæruleo simplici *C. B:* 142. Inter segetes copiose.

[Cl. VIII.] COMPOSITI EX REGULARIBUS MONOPETALIS.

44. PETASITES minor *Tourn:* 451. *C. B:* 179 [197]. Petasites albus anguloso folio *J. B:* III. 566 [567]. Wid Foglesång.

45. ELICHRYSUM s: Stoechas citrina latifolia *C. B:* 264. *Tourn:* 452 [453]. In campis copiose. In Smolandia prope Stenbrohult in Taxås klint unicam tantum plantam reperi.

---

36. A. glycyphyllos L: anf. st. p. 758 och 1067. **37.** A. Vulneraria L: p. 719 och 1012. **38.** *E. Peplus* L: p. 456 och 653. **39.** Bupleurum rotundifolium L: p. 236 och 340; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 104 och E. Fries *Fl. Scan.* p. 58. **40.** Oen. fristulosa L: p. 254 och 365; jfr. L:i *Skånska Resa* s. 243, Leche anf. st. p. 5. **41.** S. latifolium L: p. 251 och 361. **42.** I. noli tangere L: p. 938 och I329. **43.** D. Consolida L: p. 530 och 748. **44.** Tussilago alba L: p. 866 och 1214. **45.** Gnaphalium arenarium L: p. 854 och 1195; jfr *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 204 och L:i *Öländska Resa* s. 160.

46. CARDUUS tomentosus, Acanthi folio vulgaris *Tourn:* 441. Spina alba tomentosa latifolia sylvestris *C. B:* 382. Carduus alatus tomentosus latifolius vulgaris *Moris:* II [III] 152. Spina alba sylvestris *Fuchs:* 385 [57] c. fig. m̄ [Item] in Uplandia.

47. SERRATULA *C: B:* 238 [235]. *Dill: Nov. pl. gen.* [pag. 138. tab. VIII]. Jacea nemorensis, qvæ Serratula vulgo *Tourn:* 444. m̄ [Item] in Uplandia sed parcius.

[Cl. IX.] COMP: EX MONOPET: REGUL: ET IRREGUL SIMUL. [IRREGUL] IN AMBITU.

48. JACOBÆA palustris altissima svaveolens, foliis dissectis *Rupp:* 166. Jacobæa aqvatica elatior foliis magis dissectis *Moris:* III. p. 110. s. 7. t. 19. f. 24. Aster palustris laciniatus luteus *Tourn:* 483. Conyza aqvatica laciniata *C. B:* 266. Ad littora maris et in rivulis aqvarum dulcium reperi.

49. ASTER palustris parvo flore globoso *Tourn:* 483. Conyza major [& minor] flore globoso *C. B:* 266. Conyza minor *Matth:* 573. På Lunds sumpige gator.

50. BELLIS sylvestris minor *C. B:* 261. *Tourn:* 491. Bellis minor *Matth:* 393 [593]. På wallarna kring Lund blomar hon hela åhret.

51. LEUCANTHEMUM foliis mollibus flore luteo. Chrysanthemum folio minus secto glauco *Tourn:* 492. Bellis lutea foliis profunde incisis major *C. B:* 262. Chrysanthemum segetum vulgare glaucum *Moris:* III. p. 15. s. 6. t. 4. f. 1. Chrysanthemum segetum *Fl. Dan.* 201. Chrysanthemum *Dod:* 263. Ibland säden.

52. PTARMICA vulgaris folio longo serrato flore albo *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis serrato folio *C. B:* 98. Dracunculus pratensis viridis s: Ptarmica vulgaris folio serrato *Moris:* III. p. 40. s. 6. t. 12. f. 1.

---

46. Onopordum Acanthium L: anf. st. p. 827 och 1158. **47.** S. tinctoria L: p. 816 och 1144. **48.** Othonna palustris L: *Spec. Plant.* (ed. I) p, 924; Cineraria palustris L: *Spec. Plant.* ed II. p. 1243; jfr L:1 *Skånska Resa* s. 95 och 241. **49.** Inula Pulicaria L: p. 882 och 1238; jfr L:1 *Skånska Resa* s. 170 och 331. **50.** B. perennis L: p. 886 och 1248; jfr L:1 *Öländska och Gothländska Resa* s. 167. **51.** Chrysanthemum segetum L: p. 889 och 1254; jfr *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 206. **52.** Achillea Ptarmica L: p. 898 och 1266.

53. TRIPOLIUM majus cæruleum *C. B:* 267. Aster maritimus [palustris], cæruleus, Salicis folio *Tourn:* 481. Ad littora maris. m̄ [item] in Uplandia prope Gräsoeam inveni.

54. TUSSILAGO vulgaris *C. B:* 197. *Tourn:* 487. m̄ [Item] in Uplandia copiose, in Smolandia autem non vidi.

[Cl. X.] COMP: EX MON: IRREGULARIBUS.

55. CICHORIUM sylvestre s: officinarum *C. B:* 125. *Tourn:* 479. Cichorium sylvestre *Matth:* 361. Ubiqve in campis.

56. CICHORIUM sylvestre flore albo *Tourn:* 479. *C. B:* 126. rarius.

57. TRAGOPOGON pratense luteum majus *C. B:* 274. *Tourn:* 477.

[Cl. XVIII.] IMPERFECTI.

58. ACORUS verus s: Calamus aromaticus Officinarum *C. B:* 34. Typha aromatica elatior [clava] rugosa *Moris:* III. 246. Uti damar och wid åbräddar copiose aliqvando reperitur.

59. CARPINUS *Matth:* 122. *Dod:* 829 [ed. 1583]. *Tourn:* 582 Ostrya Ulmo similis fructo in umbilicis foliaceis *C. B:* 427. Uti Småland fins hon allenast wid Stenbrohult. Aceris cognata, foliis oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedentibus; vasculis disjunctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis appositis, plurimis [pluribus] confertis *P: Alm.* 7.

60. CHENOPODIUM, Pes Anserinus primus *Tourn:* 506. [Chenopodium I] *Tabern:* II. 137. Atriplex sylvestris latifolia *C. B:* 119. Atriplex sylvestris III *Matth:* 342. I Lund på murarna.

61. XANTHIUM *Matth:* 745. *Dod:* 39. *Tourn:* 439. Lappa minor s: Xanthium Dioscoridis *C. B:* 198. På dynghögarna utan för södra tullport i Lund.

---

53. Aster Tripolium L: anf. st. p. 872 och 1226. **54.** T. Farfara L: p. 865 och 1214. **55 & 56.** C. Intybus L. p. 813 och 1142. **57.** Tr. pratense L: p. 789 och 1109. **58.** A. Calamus α vulgaris L: p. 324 och 462. **59.** *C. Betulus* L: p. 998 och 1416; jfr L:i *Öländska* och *Gothländska Resa* s. 316 samt S. Rogberg *Historisk Beskrifning om Småland,* Carlscrona 1770. 8:vo, s. 21. **60.** Ch. rubrum L: p. 218 och 318 enligt synonym. från Casp. Bauhini *Pinax,* men antagligare Ch. murale L: **61.** X. strumarium L: p: 987 och 1400; jfr L:i *Skånska Resa* s. 171 och E. Fries *Fl. Scan.* p. 140.

62. CYNOCRAMBE Dioscoridis *Tourn: Coroll.* 52. *C. B:* 22 [*Pin.* p. 122]. *Prod.* 59. En enda planta fant jag wäxande på Lunds gata wid prof. SCULTENS[17] gård. Blitum minus.

63. MERCURIALIS non ramosa mas. Mercurialis montana spicata *C. B:* 122. *Tourn:* 534. Mercurialis sylvestris foemina *Tabern:* II. 256. — [»Mercurialis caule simplicissimo, foliis scabris. Crescit in sepibus & nemoribus frequens per Europam, per Sveciam in Scania & ad acidulas Wiksbergenses in Sudermannia; circa Gœtteryd in Smolandia. *L: Hort. Cliff.* p. 461.»].

64. MERCURIALIS non ramosa foemina. Mercurialis montana testiculata *C. B:* 122. *Tourn:* 534. Cynocrambe *Matth.* 798. Mercurialis sylvestris mas *Tabern:* II. 255.

65. KALI spinosum foliis crassioribus et brevioribus *Tourn:* 247. Kali spinoso affinis *C. B:* 289. Tragum *Matth:* 658. Wid hafsstranden uti Låmma.

66. HERNIARIA glabra *Tourn:* 507. Polygonum minus s: Millegrana major *C. B:* 281. In Uplandia copiose.

67. PINASTELLA *Dill: app.* 168. Eqvisetum palustre brevioribus foliis polyspermum [polyspermon] *C. B:* 15. Limnopence *R. S.* 136. Item in Uplandia.

68. FUCUS maritimus vel Qvercus maritima vesiculas habens *C. B:* 365. *Tourn:* 560 [566].

AD PAG: COMP: EX REGUL: POLYP: ET IRR: MONOP:

69. TROLLIUS *Rupp:* 149 [ed. II. p. 130]. Helleboro-Ranunculus *Boerh:* [*Lugdb.* tom. II pars 1 pag. 297]. Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoso majore *Tourn:* 272. Ranunc: montanus Aconiti folio fl: globoso *C. B:* 182. Elleboroides [Pseudo-Helleborus-Ranunculoides] luteus flore globoso *Moris:* III. p. 461. s. 12. t. 2. f. 2.

---

62. Theligonum Cynocrambe L: anf. st. p. 993 och 1411 enligt synonym., men måhända snarare Amaranthus Blitum L: p. 990 och 1405; jfr LECHE p. 18, E. FRIES *Fl. Scan.* p. 131. **63.** M. perennis mas L: p. 1035 och 1465. — **64.** M. perennis femina L:; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 461. **65.** Salsola kali L: p. 222 och 322. **66.** H. glabra L: p. 218 och 317. **67.** Hippuris vulgaris L: p. 4 och 6. **68.** F. vesiculosus L: p. 1158 och 1626. **69.** Tr. europæus L: p 655 och 782; jfr. L: *Fl. Svec.* (ed. I). sp. 474 och ed. II. sp. 510.

[Gen. I—III.] PL: IMPERFECTÆ. [RAJUS.][18].

1. CONIPLEA calyci stellato imposita. Fungus pulverulentus, Crepitus Lupi dictus, coronatus et inferne stellatus *R: S.* [*Raji Synopsis* ed. III. p.] 27 c. fig. [1 tab. I]. Denna fant jag i stor myckenhet uti en liten hola intet långt ifrån fjerdingsstolpen på Pålacksbacken utan för Upsala och gaf honom D. CELSIO att insättia uti *Flora Uplandica.*

2. ERINACEUS auriscalpium inflexum referens. Fungus erinaceus esculentus, parvus, pediculo longiore, auriscalpium referens, buxei coloris in strobilis Pini eveniens *Kram:* 146. Denna fant jag uti jägare parken wid Upsala utanför Pålacks backen och gaf D. CELSIO. Tab. IV. f. 2.

3. ULVA marina tubulosa, intestinorum figuram referens *R: S.* 62. Fucus cavus *C. B:* 364. *J. B:* III. 803. Herba cava *Imp:* 651. Wid Östhamars strand. Wistes Doct. CELSIO.

4. CONFERVA aqvatica geniculata non lubrica *Dill:* [*Cat.* p.] 200. Wid Ulfwa qwarn, gafs D. CELSIO.

5. LICHEN proliferum ex centro. Tab. IV. f. 5.

---

1. Lycoperdon stellatum *L: Spec. plant.* (ed. I. 1753) p. 1184; ed. II (1763) p. 1653. **2.** Hydnum auriscalpium *L:* anf. st. p. 1178 och 1648; jfr O. CELSIUS d. ä.: *Plantarum circa Upsaliam sponte nascentium Catalogus* (i *Acta Literaria et Scient. Sveciæ* Vol. III. 1732) p. 20. **3.** U. intestinalis *L:* p. 1163 och 1632, jfr L:I *Öländska Resa* s. 33. **4.** ? C. reticulata L: p. 1165 och 1635; CELSII *Catal.* p. 16. **5.** L. Pyxidatus β L: p. 1151 och 1619.

6. FUCUS maritimus vel Qvercus maritima foliorum extremis tumidis, qvam aliqvi glandiferam vocant *C. B:* 365. *Tourn:* 566. Wid Karön ej långt från Östhamar.

7. CHARA major subcinerea fragilis *R: S.* 132. Hippuris coralloides *Dill:* 64. Eqvisetum fragile majus subcinerum aqvis immersum *Moris:* III. p. 261 [621] s. 15. t. 4. f. 9.

8. CHARA minima muscosa. [Chara major caulibus spinosis.] *Fl. Upl.* Hippuris muscosus cauliculis spinulis crebris exasperatis sub aqvis repens *[Sherardi] Moris:* III. 621. Denna med den föregående fant jag wid Börstel i Roslagen uti siöen helt mycket.

[Gen. IV.] HERB: SEMINE MINUTISSIMO[19].

9. OPHIOGLOSSUM folio integro. Ophioglossum vulgatum *C. B:* 354. *Tourn:* 548. Wid Dannemora.

[Gen. XXV.] STAMINEÆ[20].

10. TRIGLOCHIM maritimum fructu breviore et crassiore *Rupp:* 366. Gramen spicatum alterum *C. B:* [p. 6]. Wid Upsala på Kongsängen i sidden[21] (: hinc planta maritima aqvarum dulcium alumna fieri potest:) Denna skickade D: MARTIN[22] (: qvi pudor!:) till SHERARD och frågade namnet, vide *Act. Lit. Sv.* [Vol. I. p. 343] och fick till swars Juncago maritima perennis *Sherard.*

11. GRAMEN caninum maritimum spica triticea nostras *Scheuch:* 5 [6]. Gramen loliaceum radice repente maritimum *Tourn:* 516. På Gräsöen wid stranden.

12. GRAMEN spica Brizæ majus *C. B:* [*Pin.* p.] 9. *Prod.* 19. *Moris:* III. 205. Gramen loliaceum, altissimum, spica Brizæ prælonga [perlonga], aristis brevibus donata *Tourn:* 517. Emällan Dannemora och[23] på en liten udde.

13. GRAMEN arundinaceum panicula molli spadicea majus *C. B:* 7. *Sch:* 112 [122]. På Gräsöen.

---

6. F. vesiculosus β L: anf. st. p. 1158 och 1626. **7.** Ch. tomentosa L: p. 1156 och 1624. **8.** Ch. hispida L: p. 1156 och 1624. **9.** O. vulgatum. L: p. 1062 och 1518. **10.** Triglochin maritimum L: p. 339 och 483; jfr L: *Flor. Lapp.* p. 98 sp. 135 β och *K. Vet. Akad:s Handl.* 1742 s. 146—151. **11.** Elymus arenarius L: p. 83 och 122, jfr L: *Fl. Lapp.* p. 22. sp. 34. **12.** Bromus pinnatus L: p. 78 och 115; jfr *K. Vet. Akad:s Handl.* 1740 s. 302. **13.** Arundo Calamagrostis L: p. 82 och 121.

14. GRAMEN paniculatum odoratum *C. B:* 3. *Scheuch:* 236. Gramen Mariæ Borussorum *Loesel:* p. 111 fig. 26. På Roslagska resan[24].

15. GRAMEN spicatum folio aspero staminibus ex cæruleo purpurascentibus *Sch:* 301. In vulgari stamina alba sunt. På Roslags resan.

16. GRAMEN [CYPERIODES] polystachyon, flavicans, spicis [brevibus], prope summitatem caulis *Tourn:* 530. *Sch:* 430. Gramen Cyperoides polystachyon, flavicans, spicis brevibus, prope summitatem caulis *Raj: Hist:* [tom. II. p.] 1294. *Pluck: Phyth.* Tab. XXXIV fig. 5 optima. På Kongsängen.

17. CYPERUS panicula sparsa, e specis longioribus, tenuioribus, teretibus composita *Sch:* 398. Cyperus vulgatior panicula sparsa *Tourn:* 529 [527]. Gramen Cyperoides panicula sparsa majus *C. B:* 6. Wid Karöen copiose på ett ställe.

[Gen. V.] PL: FLORE IMPERFECTO[25].

18. POTAMOGETON compressum. Potamogeton [Potamogiton] caule compresso, folio Graminis canini *R: S.* 149. *Tourn:* 233. Wid Börstel [Börstil].

19. POTAMOGETON pusillum fluitans Bocconi *Moris:* [tom. II pag.] 588 s. 5. t. 29. f. 9. Wid Karöen.

20. POLYGONUM maritimum latifolium maximum. På Gräsöen wid stranden. An varietas vulgaris?

[Gen. VI.] AGGREGATÆ PLANIPETALÆ[26].

21. HIERACIUM montanum (: palustre melius:) latifolium glabrum minus *C. B:* 129. *Tourn:* 471. Wid Dannemora in uliginosis.

---

14. Holcus odoratus L: anf. st. p. 1048 och 1485. **15.** Dactylis glomerata L: p. 71 och 105. **16.** Carex pallescens L: p. 977 och 1386. **17.** Scirpus maritimus δ L: p. 51 och 75. **18.** P. compressum L: p. 127 och 183; jfr E. Fries *Novitiæ Floræ Svecicæ* ed. II Londini Goth. 1828 p. 44—46. **19.** P. marinum L: p. 127 och 184; jfr E. Fries *Nov. Fl. Svec.* ed. II p. 52—56. **20.** ? P. aviculare γ L: p. 362 och 520 jfr L: *Fl. Lapp.* p. 116 sp. 153. § ζ. **21.** H. paludosum L: p. 803 och 1129; jfr G. H. Th. Plieninger: J. G. Gmelini *Reliquias quæ supersunt commercii epistolici cum* Carolo Linnæo, Alberto Hallero et aliis, Stuttgartiæ 1861. 8:vo, p. 31.

[Gen. XII.] STELLATÆ.

22. ASPERULA foliis angustis. Rubeola vulgaris qvadrifolia lævis floribus albis. *Tourn:* 130. På Lilieholmen ej långt från Upsala.

[Gen. XIV.] VERTICILLATÆ.

23. SCUTELLARIA folio non serrato *Riv:* [*mon. irr.* tab. 77]. Cassida repens floribus cæruleis uno versu dispositis *Johren:* 43. Wid Norby åbräd.

24. CARDIACA flore albo *Tourn:* 187. Wid Waxala.

[Gen. XV.] POLYSPERMÆ [27].

25. PLANTAGO maritima, major, tenuifolia *Tourn:* 127. Coronopus maritima major *C. B:* 190.

26. PLANTAGO maritima major, tenuifolia, foliis ab interna parte sicut Orchidis species quædam maculis adspersa. Denna med den föregående, af hwilken hon är allenast en varietet, har jag funnit wid Gräsöen. Tab. IV. fig. 4.

27. RANUNCULUS erectus acris flore viridi. Variatio vulgaris. Flores woro aldeles gröna. På Roslagiska resan.

[Gen. XIX.] MONOPETALÆ VASCULIFERÆ.

28. CAMPANULA pratensis flore conglomerato *C.B:*94. *Tourn:* 110. Wid Löfstad.

29. SAMOLUS valerandi [*J. B:* III. 791]. *Tourn:* 143. Anagallis aqvatica, folio rotundo, non crenato *C. B:* 252. Wid stranden på Karöen.

---

22. A. tinctoria L: anf. st. p. 104 och 150. **23.** Sc. hastifolia L: p. 599 och 835; jfr G. WAHLENBERG *Flora Upsaliensis*, Ups. 1820. 8:vo, p. 205. **24.** Leonurus Cardiaca L: p. 584 och 817. **25.** Pl. maritima L: p. 114 och 165. **26.** Var. af den föreg.; jfr *Fl. Lapp.* sp. 63 *α*. **27.** R. acris var. L: p. 554 och 779. **28.** C. glomerata L: p. 166 och 235. **29.** S. valerandi L: p. 171 och 243.

30. GLAUX maritima *C. B:* 215. *Tourn:* 88. Glaux latiore folio Thuringiaca *C. B:* 215. Cum antecedente.

31. VERONICA spicata longifolia *Tourn:* 143. Lysimachia spicata cærulea *C. B:* 246. Folia autem in nostra longiora et angustiora, qvam in figuris demonstrantur. Wid Öregrunds hafsbrädd.

32. VERONICA pratensis serpyllifolia flore candido. [Veronica minor foemina flore candido] *Tabern:* II. 101. [Veronica pratensis, serpillifolia *C. B: Pin.* 247.] Wid Dannemora grufwa på bärget.

33. VERONICA humilis erecta montana flore parvo cæruleo *Dill:* [*Cat.* p.] 47 *N. pl. spec.* 38 c. descript. Alsine triphyllos cærulea foliis minoribus *C. B:* 250. Hic conjugit *C. B:* duas plane diversas plantas. Ubiqve in Uplandia. Tab. IV. f. 1.

34. PEDICULARIS maxima Svecana, oris rictu clauso. Sceptrum Carolinum flore aureo magno, rictu sangvineo *Rudb: f. Act. Lit. Sv.* 1720 p. 100 et *Lap. Ill.* dedicationi inserta, ubi figura. Denna är på 2:ne ställen mig blefwen wist af Doct. Celsio, som första gången reste till den ändan 5 mihl [28].

35. SQVAMARIA *Riv: m. irr.* [tab. 89]. Anblatum flore e ruffo [rufo] candicante *Tourn: Coroll.* 48. Orobanche radice dentata major *C. B:* 88. Dentaria major *Matth:* 621. Denna fant jag wid Dannemora.

36. MELAMPYNUM floribus minoribus. Ubiqve cum Melamp. luteo latif. *C. B:* [*Pinax* p. 234], a qvo paucis differt, vide Descr. in *Fundam. Bot.*

[Gen. XXI.] TETRAPETALÆ [29].

37. AMBROSIA campestris repens *C. B:* 138. Nasturtium sylvestre capsulis cristatis *Tourn:* 214. Wid Upsala. m̄ [Item] in Scania copiose.

---

30. Gl. maritima L: anf. st. p. 207 och 301. **31.** V. maritima L: p. 10 och 13. **32.** V. serpyllifolia L: p. 12 och 15. **33.** V. verna L: p. 14 och 19; jfr »*Plantæ Scanenses*» p. 70 n. 26 härofvan. **34.** P, Sceptrum Carolinum L: p. 608 och 845. **35.** Lathræa Squamaria L: p. 606 och 844. **36.** M. sylvaticum L: p. 605 och 843; jfr Celsii *Cat.* p. 32, L: *Fl. Lapp.* sp. 240 β och *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 514, ed. II sp. 549. **37.** Cochlearia Coronopus L: p. 648 och 904; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 332.

[37 1/2.]
[37 3/4.] [30].

[Gen. XXII.] PAPILIONACEÆ [31].

38. CRACCA sylvatica, rotundifolia, floribus ex albo variis *Rupp:* [ed. II. p.] 212. Vicia perennis, multiflora, spicata major, floribus albis, lineis coeruleis notatis *Moris:* II. 60. Vicia multiflora maxima perennis tetro odore, floribus albentibus, lineis cæruleis, striatis *Pluck: Phyt.* LXXI. fig. 1.

39. CRACCA eadem fl. albo. Wid Dannemora cum antecedente.

[Gen. XXIII.] PENTAPETALÆ VASCULIFERÆ.

40. SAXIFRAGA verna, annua, humilior *Tourn:* 252. Sedum tridactylites tectorum *C. B:* 285. Wid Dannemora machin på bärget.

41. SPERGULA maritima [flore parvo, cæruleo, semine vario *Dill:* C. G. *App.* 30]. *Fl. Upl.* [p. 40]. Alsine spergulæ facie, media *C. B:* 251. *Tourn:* 244. Wid Öregrunds hafsstrand.

42. LYCHNIS annua, minima, flore carneo, lineis purpureis distincto *Tourn:* 338. Caryophyllus minimus muralis *C. B:* 211. Wid landswägen wid Wästerås.

43. VIOLA martia palustris, rotundifolia, glabra, flore majore subcæruleo. Wid Dannemora. Tab. III. f. 2.

[37 1/2.] »Draba caule ramoso folioso, foliis dentatis *Fl. Lapp.* 254. Draba alpina hirsuta Cels: Ups. [*Catal.* p.] 16. Alysson alpinum Polygoni folio incano *Tournef: Inst.* 217. Bursa pastoris alpina hirsuta *Bauh: Pin.* 108. *Prodr.* 51. t. 51. — In alpibus lapponicis communiter exacte respondet figuræ Bauhini in prodromo; & ibi sæpius perennat; Upsaliæ major evadit & annua communiter est, ut in tectis Upsaliæ antiquæ, collibusque sepulchralibus ad Upsaliam antiquam, & in collibus Luthagen ad latus urbis Upsaliensis». L: *Hort Cliff.* p. 334. = Dr. incana L: *Spec. Pl.* p. 643 och 897. [37 3/4.] »Cardamine foliis pinnatis, pinnis laciniatis. Cardamine annua, exiguo flore *Tournef: Inst.* 224. Sisymbrii Cardamines species quædam insipida J. Bauh: *Hist.* II. p. 886. — Crescit — — in Svecia circa Carlberg prope Holmiam». L: *Hort. Cliff.* p. 336. = C. impatiens L: *Spec. Pl.* p. 655 och 914. **38** och **39.** V. sylvatica L: p. 734 och 1035; jfr L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 603 ed. II. sp. 650. **40.** S. tridactylites L: p. 404 och 578. **41.** Arenaria rubra β marina L: p. 423 och 606. **42.** Gypsophila muralis L: p. 408 och 583. **43.** V. palustris var. L: p. 934 och 1324, jfr L: *Fl. Lapp.* p. 227 sp. 278 γ.

[Gen. XIX: 4.] PENTAPETALOIDES [32].

44. CENTAURIUM maritimum florum laciniis obtusis Tab. III. f. 3.

[Gen. XXIV: 4.] BULBOSÆ [33].

45. ALLIUM montanum capite rotundo *C. B:* 75. *Tourn:* 384. På Gräsöen öfwer i bärgen.

[Gen. XXIV: 7.] BULBOSIS AFFINES [34].

46. MONORCHIS. Orchis odorata moschata s: Monorchis *C. B:* 84. Orchis pusilla pallide odorata s: VI:ta *Clus: Pan.* 234 [239]. Orchis coleo unico s: Monorchis flosculis pallide viridibus *Loesel:* 184. f. 61. På Gräsöen copiose. Tab. IV. f. 3. [»Upsaliæ in Svecia eandem legit Cel. O. Celsius». L: *Hort. Cliff.* p. 429].

[Gen. XXI: 7. TETRAPETALÆ SILICULOSÆ & SILIQUOSÆ. ANOMALÆ] [35].

47. HYPOPITHYS [HYPOPITYS] *Dill: N. pl. gen.* [p. 134. t. VII.] Orobanche qvæ Hypopitys [Hypopytis] dici potest *C. B:* 351 [88]. Uti jagtparken wid Upsala. Floret julio.

Alla desse ofwanstående Roslagiska örter har jag först uti Upland upfunnit.

Alla desse hafwer jag comunicerat D. Celsio att insättia uti sin *Flora Uplandica.*

Doch tages här undan Ophioglossum, Triglochim et Hypopithys med Scept. Carol., som D. Celsius funnit före mig.

---

44. Gentiana 9 L: *Hort. Cliff.* p. 81.; (= Erythræa litoralis E. Fries' *Nov. Fl. Svec.* (ed. I) p. 29, 101 & ed. II p. 72.) — Jfr N:ris 4 och 5 under afdeln. II »*Plantæ Scanenses*». **45.** A. rotundum L: *Spec. pl.* ed. II p. 423 efter synonym.; men här torde snarare afses A. Schœnoprasum L: p. 301 och 432; jfr L:i *Öländska Resa* s. 53, E. Fries i *Botaniska Notiser* 1842 s. 25 och 1844 s. 11 samt C. Hartman *Bot. Not.* 1845 s. 148. **46.** Ophrys Monorchis L: *Spec. pl.* (ed. I) p. 947, ed. II p. 1342, jfr L: *Hort. Cliff.* p. 429. **47.** Monotropa Hypopithys L: p. 387 och 555; jfr G. Wahlenberg *Fl. Upsaliensis* p. 142.

[Senare tillägg.] ARBORES. [Cl. XXVIII. ARB. APETALÆ].

48. SALIX angustifolia alpina tota argentea *Rudb: f: Act. Lit. S.* 1720 s. delineat. vivam.

[APPENDIX.]

DALEKARLICÆ [36].

1. NAPELLUS vulgaris hortensis circa Fahlun.
2. UTRICULARIA nectario gibbo.
3. NAPELLUS vulgaris hortensis wäxer i Fahlun wid Risoehln; plockas årligen bort, att ej getter el:r kor få äta honom, ty de dö där af. teste vulgo ibidem.
4. CISTUS oelandicus.
5. ISATIS Aboe.
6. GENTIANA Wgoth.
7. VISCUS Wesman: Kungsöhr, Sela ö i Mälaren.
8. LITHOSPERM: Kofsa.
9. CAMPANULA a'caole missa. [CAMPANULA maxima foliis latissimis flore cæruleo *Tourn:* 108. *C. B:* 94. (= C. latifolia L: *Fl. Sv. & Sp. pl.*). — »Campanula pulchra, a Tossano Carolo missa *J. B:* II. 807. hujus varietas tantum est. Caroli Linnæi *Hortus Uplandicus* 1730. Mss. Linn. in Soc. Linn. — »Ego eandem in Svecia ad acidulas Wicksbergenses in nemoribus copiosam legi». L: *Hort. Cliff.* p. 64.]
10. DATURA.
11. SAMBUCUS Scaniæ.
12. TITHYMALUS oelandicus s: frutescens.

---

48. ? S. Lapponum L: *Spec. pl.* (ed. 1) p. 1019 och ed. II p. 1447.

[APPENDIX.]

1 & 3. Aconitum Napellus L: anf. st. p. 532 och 751. **2.** U. minor. L. p. 18 och 26. **4.** C. oelandicus L: p. 526 och 741. **5.** I. tinctoria L: p. 670 och 936. **7.** Viscum album L: p. 1023 och 1451. **8.** L. officinale L: p. 132 och 189. **9.** ? C. latifolia L: p. 165 och 233. **10.** D. Stramonium L. p. 179 och 255. **11.** ? S. nigra L: p. 269 och 385. **12.** Euphorbia palustris L: p. 462 och 662.



[Betula nana L: *Species Plantarum* (ed. I) p. 983, ed. II p. 1394. — Se sid. 66 n. 46.]



[Fig. 1. Plantago uniflora L: *Spec. Pl.* (ed. I) p. 115, ed. II p. 167. — Se sid. 41 n. 3 & sid. 61 n. 8.
Fig. 2. Subularia aquatica L: *Sp. Pl.* (ed. I) p. 642, ed. II p. 896. — Se sid. 62 n. 15.
Fig. 3. Ranunculus reptans L: *Sp. Pl.* (ed. I) p. 549, ed. II p. 773. — Se sid. 63 n. 25.]



[Fig. 1. Gentiana Centaurium β var. L: *Spec. Plant.* (ed. I) p. 229, ed. II p. 332. — (Erythræa pulchella E. Fries *Flora Scanica* p. 42.) — Se sid. 30 n. 8 & sid. 67 n. 4, 5.

Fig. 2. Viola palustris var. L: *Sp. Pl.* (ed. I) p. 934, ed. II p. 1324. — Se sid. 64 n. 33 & sid. 81 n. 43.

Fig. 3. Gentiana 9 L: *Hort. Cliff.* p. 81. — (Erythræa litoralis E. Fries *Nov. Fl. Svec.* (ed. I) p. 29, 101 & ed. II p. 72.) — Se sid. 82 n. 44.]

[Fig. 1. Veronica verna L. *Spec. Plant.* (ed. I) p. 14, ed. II p. 19. — Se sid. 70 n. 26 & sid. 80 n. 33.
Fig. 2. Hydnum auriscalpium L: *Sp. Pl.* (ed. I) p. 1178, ed. II p. 1648. — Se sid. 76 n. 2.
Fig. 3. Ophrys monorchis L: *Sp. Pl.* (ed. I) p. 947, ed. II p. 1342. — Se sid. 82 n. 46.
Fig. 4. Plantago maritima var. L. *Sp. Pl.* (ed. I) p. 114. ed. II p. 165. — Se sid. 79 n. 26.
Fig. 5. Lichen pyxidatus β L: *Sp. Pl.* (ed. I) p. 1151, ed. II p. 1619. — Se sid. 76 n. 5.]

Förklaringar och anmärkningar.

1 »O, hvilken underlig kraft oss drager till fädernejorden,
Hon, hvilkens ljufva behag aldrig förglömma man kan.»
OVIDIUS Lib. I e Ponto Eleg. IV. v. 35, 36.

Huru innerligt LINNÆUS var och blef fästad vid detta »solum natale», framlyser, så snart hans tankar föras dit. Se hans *Flora Lapponica* p. 272, *Öländska och Gotländska Resa* s. 315—319. *Skånska Resa* s. 45 och 416—420 samt i brefven till syskonen 1763 $^{22}/_{3}$ och 1768 $^{1}/_{1}$, tryckta i CARL VON LINNÉS Svenska Arbeten b. 2. Sthlm 1880 s. 94—96 och 104—107. Lifligast skildrar han dessa känslor i »Resorna». På hemresan från Öland besöktes d. 8—13 Aug. 1741 Stenbrohult »wid stranden af den stora siön Möcklen, som här går in med en stor wik och formerar en den angenämaste situation. De höga Ahlar förhindra watnet, at åhrligen bortskiära landet, där de wäxte i sielfwa wattenbrynen. Trägården, som min far, Kyrkoherden Her NILS LINNÆUS, har anlagt, hade flere slags örter, än någon trägård i Småland haft, och denne trägård har med modermiölken inflammerat min hog med en outsläckelig kärlek til örter. Örter wäxte wildt wid Stenbrohult en hel hop, som eljest äro ganska sällsynta i Swerige, jag hade mitt nöje at besöka dem på samma ställen, som jag med dem sjelf upwuxit. — Råshults Södre gård hade jag sist lust at se, förr än jag quitterade denna ort, emedan jag honom sedt här i werlden aldraförst». — Under nedresan till Skåne kom L. 15 Maj 1749 till Stenbrohult. »Här fant jag», säger han, »foglarna [föräldrarna] utöddde, boet upbränt och ungarna förskingrade, at jag näppeligen igenkände det rum, der jag sjelf blifwit utkläkt. Jag tyckte mig se campum, ubi olim Troja, på det stället der min salig Fader Kyrkoherden NILS LINNÆUS anlagt den trägården, som fordom blänkte af de raraste örter i Swerige, hwilken en häftig wådeld aldeles förstört [natten till den 20 April 1746], förr än tiden honom bårtrykte, förledit år d. 12 Maji.» [Modren dog redan d. 6 Juni 1733.] »Mina ungdoms nöjen, de raraste wäxter, som wäxa wildt på denna ort, hade ej hunnit ännu framkomma». — Den 6 Aug. på återvägen såg L. fädernehemmet för sista gången. I förkänslan deraf säger han ock: »Blomstren, mina ungdoms leksyskon wid Stenbrohult jämte Möklens stränder, bad jag nu fara wäl. Den lilla *Cornus* herbacea (Fl. [Svecia ed. I 1745 sp.] 132) fägnade mig här mycket, som sedermera up åt landet icke gärna fins i Småland. *Lycopodium* clava singulari (Fl. 862), stod ännu wid stränderna af södra hage, endast på de ställen, som om wintern öfverswämmas af sjön Möklen. Ilagräset (Fl. 268) hölt sig ännu i Fähushålan. *Serpillum* (Fl. 477), som min Fader planterat på de skarpne backar wid wäderqwarne-backen, lyste ännu med sina blommor. *Dortmanna* (Fl. 714), *Elatine* (Fl. 327), *Plantago* monanthos (Fl.

128), *Scirpus* minimus (Fl. 43), *Spongia* (Fl. 1132), *Fontinalis* (Fl. 866) täckte stränderna under wattnet».

De trädgårdar, hvilka fadren, en för sin tid och sitt stånd ovanlig blomsterälskare, anlagt först i Råshult och sedan i Stenbrohult, hafva genom sonen, som der »med modersmjölken fått en outsläcklig kärlek till örter», blifvit verldsberyktade. Nu mer vet man om dem i Stenbrohult knappast mer, än hvar de fordom funnits. Skäl torde derföre vara att inrymma plats bland LINNÆI ungdomsarbeten äfven åt hans »ADONIS STENBROHULTENSIS» eller förteckning öfver trädgårdens i Stenbrohult växter, upprättad 1732, hvilken i ett af honom sjelf handskrifvet, men beklagligtvis ofullständigt exemplar förvaras i Kongl. Vet. Akad:s bibliotek.

Sin kännedom om Smålands vilda växter har L. i tryck meddelat, utom i sina så kallade »Resor», dels i sin »Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland» i *Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar* för år 1741 s. 179—210, dels i 4 kap. »Om Smålands Natural-Historia» s. 20—23, hvilket kapitel L. nedskref på SAM. ROGBERGS begäran i dennes »*Historisk Beskrifning om Småland*, tryckt i Carlscrona 1770, först 10 år efter ROGBERGS död. Ur dessa, jemte några andra, källor har sammanförts följande förteckning öfver de »wäxter i Småland upfundne», hvilka L. i sina tryckta arbeten särskildt och senare angifver för sin födelsebygd, men hvilka ej äro upptagna i de båda ofvan lemnade katalogerna af år 1728 och 1729:

Scirpus acicularis L: *Spec. plant.* ed. II p. 71; *Fl. Lapp.* p. 272 och *Skånska Resan* s. 417.

Scirpus lacustris L: *Sp.* p. 72; *Fl. Lapp.* p. 272 och *Smål:s Beskr.* kap. 4. s. 21.

Poa aquatica L: *Sp.* p. 98; »wid Husaby järnbruk» *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 185.

Arundo phragmites L: *Sp.* 120; *Fl. Lapp.* p. 272, *Smål:s Beskr.* s. 21.

Potamogeton natans L: *Sp.* p. 182; *Fl. Lapp.* p. 272, *Smål:s Beskr.* s. 21.

Campanula persicifolia L: *Sp.* pl. (ed. I) p. 164; »Crescit in Svecia Wexioniæ inque monte Oesterby» *Hort. Cliff.* p. 65.

Hedera Helix L: *Sp. pl.* ed. II p. 292; »i Hallaryd socken» *Fl. Svec.* och *Smål:s Beskr.* s. 21.

Thesium alpinum L: *Sp.* p. 301; *Skånska Resan* s. 22 under den oriktiga genusbestämningen Stellera, »wid Notebäck uptäckt af Mag. KALLENBERG» *Smål:s Beskr.* s. 21, jfr L: *Fl. Svec.* ed. II sp. 211, der denna växt orätt hänföres till arten Linophyllon.

Cicuta virosa L: *Sp.* p. 366; *Ölands Resan* s. 321.

Juncus squarrosus L: *Sp.* p. 465; »per Smolandiam frequens» L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 302, jfr *Smål:s Beskr.* s. 22.

Alisma Plantago aquatica L: *Sp.* p. 486; *Öl:s R.* s. 321, *Smål:s Beskr.* s. 20.

Elatine Hydropiper L: *Sp.* p. 527; Stenbrohults prestgård »wid stränderna» *Öl:s R.* s. 316, *Sk. R.* s. 417, *Smål:s Beskr.* s. 21.

Spergula arvensis L: *Sp.* p. 630; *Smål:s Beskr.* s. 20.

Lythrum Salicaria L: *Sp.* p. 640; *Smål:s Beskr.* s. 20.

Reseda Luteola L: *Sp.* p. 643; *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 195.

Nymphæa lutea L: *Sp.* p. 729; *Smål:s Beskr.* s. 21.

Nymphæa alba L: *Sp. pl.* ed. II p. 729; *Smål:s Beskr.* s. 21.

Trollius europæus L: *Sp.* p. 782; »ad pagum Slätthult in Stenbrohult & alibi» L: *Fl. Sv.*

Nepeta Cataria L: *Sp.* p. 796; *Öl:s R.* s. 321.

Galeopsis Tetrahit L: *Sp.* p. 810; *Smål:s Beskr.* s. 20.

Marrubium vulgare L: *Sp.* p. 816; *Öl:s R.* s. 321.

Thymus Serpyllum L: *Sp.* p. 825; *Sk. R.* s. 417.

Dracocephalum Ruyschiana L: *Sp.* p. 830; »in pratis Huhlu paroeciæ Hwitlandæ in Smolandia, H. Bark» L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 537.

Lepidium sativum L: *Sp.* p. 899; »ad rudera arcis Westervicensis» L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 571.

Brassica campestris L: *Sp.* p. 931; »inter segetem æstivam frequens vitium in Smolandia» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 546, ed. II sp. 608; jfr *Smål:s Beskr.* s. 20.

Scorzonera humilis L: *Sp.* p. 1112; *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 203, *Smål:s Beskr.* s. 22.

Carduus heterophyllus L: *Sp.* p. 1154; *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 657, ed. II sp. 721, *Smål:s Beskr.* s. 22.

Carduus acaulis L: *Sp.* p. 1156; inter Junecopiam & Wadstenam *Fl. Sv.*, jfr *Smål:s Beskr.* s. 22.

Artemisia vulgaris L: *Sp.* p. 1188; »frequens Vitium Agrorum Smolandiæ» L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 731.

Senecio sylvaticus L: *Sp.* p. 1217; »ad Wrikstad in pratis sylvosis» L: *Fl. Sv., Öl:s R.* s. 326.

Chrysanthemum segetum L: *Sp.* p. 1254; »Wäxte uti åkren wid Stenbrohults Kyrka i Smoland» *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 207.

Matricaria suaveolens L: *Sp.* p. 1256; »in areis ad pagos Stenbrohult Smolandiæ» L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 766.

Ophrys cordata L: *Sp.* p. 1340; wid Kronobergs Slott på rudera» *Smål:s Beskr.* s. 22.

Sparganium natans L: *Sp.* p. 1378 } L: *Fl. Lapp.* p. 272 och *Smål:s*
Myriophyllum spicatum L: *Sp.* p. 1409 } *Beskr.* s. 21.

Carpinus Betulus L: *Sp. pl.* (ed. I) p. 998; »Afwen-Bok eller Carpinus wäxte mycket i södra Wang» [Stenbrohults prestgård] *Öl:s R.* s. 316, »allmän i Skåne går föga öfwer Stenbrohults sockn» *Smål:s Beskr.* s. 21.

Viscum album L: *Sp. pl.* ed. II p. 1451; »in Smolandia Sunnerboensi paroeciæ Wittaryd» L: *Fl. Sv.*, jfr *Smål:s Beskr.* s. 22.

Humulus Lupulus L: *Sp.* p. 1457; in sepibus Smolandiæ rarius L: *Fl. Sv.*

Mercurialis perennis L: *Sp.* p. 1465; »i Sunnarbo» *Smål:s Beskr.* s. 22.

Taxus baccata L: *Sp.* p. 1472; »in maritimis Smolandiæ» L: *Fl. Sv.*

Eqvisetum fluviatile L: *Sp.* p. 1517; *Smål:s Beskr.* s. 21.

Osmunda regalis L: *Sp.* p. 1521; »Safsa-Buske i Wirestad Socken på en liten holme uti Fanhults å» *Sk. R.* s. 40, jfr *Smål:s Beskr.* s. 21.

Pilularia globulifera L: *Sp.* p. 1563; »wid Diö å» [Stenbrohults s:n] *Smål:s Beskr.* s. 21.

Isoëtes lacustris L: *Sp.* p. 1563; »Calamistrum *Fl.* [*Sv.* ed. I sp.] 996 i siön Möcklen ej långt från landet» *Öl:s R.* s. 316, Marsilea L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 996; jfr *Sk. R.* s. 417—420.

Lycopodium inundatum L: *Sp. pl.* ed. II p. 1565; ad littora lacus Möcklen Smolandiæ, prope natale Stenbrohult, versus Söra hagen, locis sabulosis It. Scan. 417» L: *Fl. Sv.;* »wid stranden af Gåsöen» *Öl:s R.* s. 316.

Fontinalis antipyretica L: *Sp.* p. 1571; *Sk. R.* s. 417.

Jungermannia epiphylla L: *Sp.* p. 1602; »Hypophyllum wäxer i Smoland allmän på Sidlänta ängar eller wid grafwar» *K. Vet. Akads:s Handl.* 1741 s. 209, »Jungermannia hypophyllum *Fl.* [*Svec.* ed. I sp.] 930 wid qwarnbäcken [Stenbrohults prestgård] med stamina nog tydelige denna tiden [Aug. 9] aldrig tilförne af nogon märkte» *Öl:s R.* s. 316, jfr *Westg. Resan* s. 213.

Jungermannia pinguis L: *Sp.* p. 1602; »in paludibus Smolandiæ ad Stenbrohult in Maën» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 929 ed. II sp. 1048.

Blasia pusilla L: *Sp.* p. 1605; *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 209.

Riccia minima L: *Sp.* p. 1605; »Wäxer där watnet, som stådt öfwer wintren uttorkats, såsom wid Nydala och Stenbrohult i Smoland» *K. Vet. Akad:s Handl.* 1741 s. 209, »in Smolandiæ pascuis, ubi aquæ per hyemem stagnarunt» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 934 ed. II sp. 1054, »Riccia under Bökerna» *Öl:s R.* s. 316.

Lichen Fagineus L: *Sp.* p. 1608; »in truncis Fagorum Smolandiæ» L: *Fl. Sv.* ed. II sp. 1066, jfr *Sk. R.* s. 59.

Lichen Carpineus L: *Sp.* p. 1608; »in Carpini truncis per Scaniam & partem Smolandiæ L: *Fl. Sv.* ed II sp. 1067, jfr *Sk. R.* s. 47.

Lichen pulmonarius L: *Sp.* p. 1612; »præsertim in fagetis Smolandiæ & Scaniæ» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 960 ed. II sp. 1087.

Lichen jubatus L: *Sp.* p. 1622; præsertim in Fagetis Gothicis» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 986 ed. II sp. 1124.

Lichen vulpinus L: *Sp.* p. 1623; »in Smolandia frequens L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 990 ed. II sp. 1129.

Lichen floridus L: *Sp.* p. 1624; »in Smolandiæ & Scaniæ Fagetis L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 991 ed. II sp, 1130.

Hydnum auriscalpium L: *Sp.* p. 1648; »in sylvis Smolandiæ» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 1100 ed. II sp. 1260.

Phallus impudicus L: *Sp.* p. 1648; »wid Wexiö åhr 1740 uti en mager ock mossig Jordmån» J. Rothman *K. Vet. Akad:s Handl.* 1742 s. 19 och 20 tab. 2 fig. 1, »in Smolandia» L: *Fl. Sv.* (ed. I) sp. 1101, ed. II sp. 1261.

Lycoperdon Carpobolus L: *Sp.* p. 1654; »ofwanför Jönköping» *Smål:s Beskr.* s. 21.

2 Jfr »Egenhändiga Anteckningar» s. 10, 11 och 103. Der nämnas åtminstone två lärjungar, Benzelius och Retzius. — Mathias Benzelius l. Benzelstjerna, född 1713 $^{8}/_{9}$ i Upsala, son af teol. prof. i Lund slutl. ärkebiskopen Jakob Benzelius, blef slutl. öfverpostdirektör och statssekreterare, död 1791 $^{11}/_{3}$ i Stockholm. — Nils Retzius, född 1712 $^{17}/_{4}$, systerson till biskopen i Lund And. Rydelius, i hvars hus den faderlöse uppfostrades, blef fil. & med. dokt., provincial medikus öfver hela Skåne, död 1757 $^{17}/_{1}$ i Christianstad.

3 Resan räckte från sista dagarne af Juni till och med den 9 Juli, utom en eller annan dag för återresan till Upsala. Jfr Linnæi här förut intagna Vita s. 6—8 och 20 noten 60.

4 i Granfjärden.

5 Joseph Pitton de Tournefort föddes i Aix (Provence) den 5 Juni 1656. Ämnad af sin fader till det andliga ståndet, för hvilket han dock icke hyste någon förkärlek, utbytte han efter dennes död (1677) studiet af kyrkofäderne mot det af patres medicorum et botanicorum, bereste södra Frankrike, Pyreneerna och Savoyen, besökte högskolorna i Montpellier och Barcelona samt blef vid 27 års ålder professor i botanik och föreståndare för den kungliga trädgården i Paris. Förespråkare till denna tidiga befordran var hans företrädare, arkiater Guido Crescentius Fagon. Efter resor i Spanien, Portugal, Holland och England för att rikta den kungliga trädgården med naturalster, utrustades T. år 1700 af Konung LUDVIG XIV att i sällskap med en Tysk läkare Andr. Gundelsheimer och en Fransk målare Cl. Aubriet genomforska Grekland och Mindre Asien. Med rikt byte återvände T. efter tvenne år till Paris för att ordna och beskrifva sina samlingar. Frukten häraf blef »*Corollarium Institutionum Rei Herbariæ*, in quo plantæ 1356 in orientalibus regionibus observatæ recensentur et ad genera revocantur» Lutetiæ Parisiorum 1703, hvilket utgafs såsom appendix till andra (1700) och tredje (1719) upplagorna af hans sekulararbete »*Institutiones Rei Herbariæ*» (1 Vol. text och 2 Vol. planscher i 4:to). Redan år 1694 hade nemligen detta arbete utkommit under titel: »*Elementa Botanica* s. *Methodus plantas cognoscendi*» Parisiis 8:vo. — Innan han ännu hunnit till trycket befordra sin »*Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roi*» (den utkom i 2:ne band i 4:to Paris 1717 samt öfversattes på Engelska London 1718. 4:to och Holländska Amsterdam 1737. 8:vo), hade han, då hans hästar skyggade och vagnen slungades mot en vägg, nästan krossad framdragits ur spillrorna och efter 5 à 6 månaders svåra plågor dött i Paris d. 28 Nov. 1708. — Tournefort gjorde inom botaniken revolution genom sitt ofvan nämnda systematiska arbete, hvari han fördelade växterna i 22 klasser efter blomkronans när- eller frånvaro samt efter dess form. Hans förnämsta förtjenst var dock fastställandet af genusbegreppet och just derför vann och bibehöll han så länge och så allmänt erkännande. Artbegreppet var deremot ej klart för honom, han sammanblandade arter och afarter samt gaf ofta de senare lika vigt i systematiskt hänseende som de förra. Derjemte har man med skäl förebrått honom, att han i sitt system höll fast vid de gamles särskiljande af växterna i träd och buskar samt örter. Sin trognaste anhängare i sitt eget fädernesland fann han uti Antoine de Jussieu, hvilken ock ombesörjde 3:dje uppl. af *Institutiones Rei Herbariæ*.

6 Anmärkningsvärdt är Linnæi försök här dels att frigöra sig från auctoritetstro, då han vågar uppställa nya slägten och gifva andra genusnamn, än de af Tournefort och Ol. Rudbeck fil. använda, dels att begagna tillfället att hedra sin gynnare Ol. Celsius d. ä. och på samma gång söka vinna Rudbeck. — *Tetralix* återföres dock senare af L: eller redan i *Hort. Cliff.* p. 148, till slägtet *Erica*. De här brukade genusnamnen *Celsia* och *Rudbeckia* utbytas ock redan i *Flora Lapp.* mot *Andromeda* och *Linnæa*, hvarvid dock bör märkas: att L. i *Syst. Nat.* (ed. I) och *Gen. pl.* (ed. I) n. 518 och 669 öfverflyttade namnen *Celsia* och *Rudbeckia* till andra slägten, för att ej tala om att det senare namnets omflyttning redan skett i den här nedan intagna ADONIS UPLANDICUS af år 1731; jfr L: *Hort. Cliff.* p. 321 och 420 samt »Caroli Linnæi *Egenhändiga Anteckningar* s. 138—141. — Hvad just detta här brukade namnet eller ordet *Rudbeckia* angår, föreligger den egendomlig-

heten, att i originalhandskriften ordet tydligen blifvit först efter radering ditskrifvet och att af första skriften qvarstår ett ganska tydligt L. sådant Linnæus vanligen skref, ändradt till R. Måhända skulle den förmodan kunna vågas, att Linnæus först skrifvit *Linnæa*, då han ämnade behålla dessa anteckningar för egen del, men sedan, när han tillegnade dem åt prof. L. Roberg (i hvars händer dock handskriften måhända aldrig kom), ansåg sig böra akta sig för den mannens åtlöje.

7 Med »*Fundamenta mea Botanica*» menade L. vid olika tidpunkter icke detsamma. Ett första utkast härtill tänkte sig nog L. redan år 1730 att döma efter en af honom egenhändig handskrift i Linnean Society i London: »Caroli Linnæi *Smol-Sveci Medicin. et Histor. naal. stud. Fundamenta Botanica* qvibus Nova et naturalis plantarum Methodus superstruitur, exhibita per regulas ultra centum æternæ veritatis, non e libris, sed ab ipsius Naturæ thesauro haustas, in qvarum explicatione Methodi omnes hactenus principales, experimentis infallibilibus, observationibusqve innumeris plane novis destruuntur. Doctis in arte scribo, indoctos docebo. Upsal: 1730. — Ostende meliora si potes et tum carpe mea et tibi gratias habebo. — Cujusvis hominis est errare, nullius nisi insipentis in errore perseverare Cic.»

Då detta tilltänkta arbete vid denna tid stannade vid den anförda titeln och ett företal, som i många afseenden är anmärkningsvärdt och kännetecknande för L:i studier och sinnesförfattning vid så unga år, torde äfven det här böra återgifvas:

»Lect. Benevol.

Här gifwer jag, gunstige Läsare, dig mine förste meditationes, huru och på hwad fötter wår förfalne Botaniqve bör ställas, som nu förmedelst [de] fläste botanicorum wårdslöshet är nästan ruinerad, åtminstone förträffeligen confunderad. Antalet på plantorna växer dageligen till, och med dem fördubblas dageligen fehlen, att jag intet wett, om Gudarne gifwit oss method, antingen då de woro gode äl:r onde. Jag tror wärkel. aldrig, att Botaniqven komet på sådant afbräck, om Botanici begynt tillforna att skrifwa institutiones och dem dagel. raffinerat; men är dett icke oförswarligt att icke en alt här till wågat dett giöra, förn wij. Har någon biudit till, så har han dett giort äfter Botanicorum Auctoritet och eij äfter Naturen äl:r Autopsien, ty har han giort wärre och icke bättre, Hwad methodici artis speciales hafwa budet till, är giort allenast för sin egen methods maintenerande och eij att utforska sanningen. Säg mig L. B. hwad någonsin något omistligare är för en incipient, än att hafwa reglor, hwar äfter han sig ställa skall?

Och som jag siälf swårl. måst ärfarit, hwad Præjudicier förmått, ty afråder jag och beder, att ing. läs denna min lilla tractat illotis manibus i. e. som är ifrån sitt sanna förnuft drifwen af Auctoriteter och förblindad af tycke för någon särdeles method, eij heller den som tror sig wara lärd af böcker, ty för dem har jag desse ej skrifwit, utan allenast för sådana som wetta bruka sitt egit förnuft med förstånd och som med egne ögon kunna se sanningen af siälfwa objecto. Ty när jag först ransakade naturen siälf och såg henne sträfwa mot Autorers mening, ty aflade jag alla præjudicier, blef en scepticus och tviflade om alt, då öpnades först ögonen, då kunne jag först märka sanningen.

Jag will icke förmoda någon tillräcknar mig, att jag wågat uprächna några stora botanicorum, såsom Tournefortii, Rivini, Waillanti [Vaillantii], Boerhaavi, Dilleni, Pontederæ &c. fehl, hwars meriter jag tillstår äro store;

h:ket jag sannerl. intet giort, såsom jag skulle willia bana mig wäg genom deras ruin, quod a me et omni christiano longe absit, utan allenast till att utforska sanningen, som för all Autoritet bör hafwa præferancen; Ty de lärde männerna äro också menniskior och en annors ögon äro så klare som deras, ej heller kan en attendera alt. Såsom deras fehl förläggas, h:ka äro få, altså berömes där emot alt dett, som är sannt. De lärdes förseelse drages altid fram, men ignoranters blifwa stående, såsom de förlägga sig siälfwe, och äro eij wärde att nämnas, Ingen konst hade warit, att giöra detta widlöftigare och med många ord utföra denna meningen, men dett hafwer jag undflyt för alt, såsom jag ingen bok läs med större wämielse än stororiges, h:ka som en fradga förswinna i munnen.

Jag hade nog tänkt præmittera mina *Nuptias Plantarum*, uti h:ka jag gifwer en fulkomen method öfwer örterna, tagen af stamina och stylo, men som jag hafwer några flere observationer af nöden, måste jag wänta till sommaren är förbij, då jag försäkrar läsarne i dem skola finna sitt fulla nöje.

Strax där på skall, där Gud gifwer hälsan, min *Hortus Uplandicus* follia, som innehålla skall alla *plantas hortenses totius Uplandiæ*, ställte äfter min method uti *Nuptiis Plantar.*, men species betecknade med nya namn, äfter *Fundamenta Botanica* med där till lagde synonymis.

Straxt där äfter skall min *Nova Methodus Avium* utkoma med generibus och speciebus på alla foglar i Sverige, som wähl stiga till 200. Och där äfter, Deo volente, en utförlig *berättelse* om alla *Insecta*, jag har funnit i Sverige (hvartill jag på desse 2:ne föregående somrar samlat 500), alla ställte äfter en ny, men aldeles naturel method.

Regnum minerale, så mycket Sverige tillkomer, har D. Bromel Arch. Reg. Sv. redan begynt på och lärer fuller drifwa till ända, hwar af årl. sedan 1724 är att se uti Act. Lit. Svec. och hvad desidereras lärer Kil. Stobæus Prof. Lundensis Hist. naalis nogsamt upfylla. *Plantas sylvestres Uplandiæ* uti sin *Flora Uplandica* får den lärda wärlden oförtöfwat se af D:r O. Celsio. *Pisces* att på en naturel och god method ställa wäntas af D:no Pet. Arctædio, amico nostro integerrimo, som utan alla præjudicier giör läsaren nöje. Vir ad historiam naalem maxime inclinatus, cui multa debeo, præprimis divisionem Arctædianarum [= ? Umbelliferarum].

Att ingen ting må fattas till Regni Sveciæ dilucidation uti historia naali, som här af ingom är med förnuft examinerad, om man undantager de store Rudbeckar pater et filius, hwars härliga wärk härutinnan [*Campi Elysii* s. *Glysis Wald*] den bedröfweliga elden 1704 [d. 16 Maj 1702] borttog, af h:kt allenast Tomus 1:us och 2:dus är öfrig, doch få exemplar.

De *Plantis Laponicis* vid: Act. Lit. Sv. 1720 [Trimestre Quartum p. 95—100] a Rudbeck Fil. editis, patrono nostro summe venerando. Rudbeck Pat. *Hortus Upsaliensis* [»Ubsaliæ» 1658 och ed. III »Upsalæ». 1685, båda i 8:vo] tracterar sina örter utan synonyma; likaså Franckenius in *Speculo Botanico* [Ups. 1638, ed. II. Ups. 1659, båda i 4:to]. Bromelius [Olaus] pater är temelig accurat, såsom synonyma tilläggas in *Chloride gothica* [s. *Catalogus Stirpium circa Gothoburgum nascentium* Gbg 1694. 8:vo min.]. Linder där emot går utan synonyma uti *Flora Wicksbergensi* [Stockh. 1716, ed. II 1728. 8:vo]. Tillands uti *Catalogo pl.* [*quæ prope*] *circa Aboam* [*in cultis et incultis locis inventæ sunt* Åbo 1683. 12:mo] rensade fuller up generice sina örter med synonymis fast utan citationer. Martin [Petrus] exhibet *Catalogum* [*plant.*

novarum] *rariorum herbarii musei* [JOACH. BURSERI in museo horti botanici Reg. Acad. Upsal. adhuc asservati] in Act. Lit. Sv. [Upsal. 1724 p. 495.].

Gack därför uht min lilla Book och submittera dig hela wärldsens omdöme, i. e. qvot capita tot sensus. Men jag will doch säga dig föruht några dina fata och hwad swårigheter du måste undergå. Ty [du] blifwer illa liden hoos alla Botanici, som något wärk utgifwet, emedan jag wett, att din mening är emot deras. Ty för än fläste delen af dem skulle låta sina scripta förläggas och [de] sina galne satzer revocera, skulle all veritas stiga till Stygs att blifwa bunden af mörksens kädjor. Komer här till att alle som äro professores och hafwa disciplar, förn de skulle ändra sina satzer, fast alt för galne, för skulle de cedera bonis; ty deras Autoritet skulle förminskas, om de antogo sanningen, och förlade sina partes ingenii, ty apan fruchtar och för sina barn. — Komer du till ynglingar, blifver du aflagd, emädan du will hafwa något nytt på banne, och de äro omogne att examinera dina skiähl. — Komer du till någon, som är intagen af TOURNEF: RAJI äl:r RIVINI methoder, blifwer du hållen för en pärlesteckare och lämnat med begabberij. — Komer du till någon, som begynner äl:r hafwer i wärket skrifwa någon book, ach hur snart blifwer du drifwen på dörren, emädan du föreskrifwer en börda, som deras länder är altför swår att bära. Tu tager frå dem all den frihet, som deras antecessores ägt, och lägger på deras axlar träldom. Ty måste du med tolamod en tid ligga utan condition. Men gläd dig dock att tu af några, som jag till namnet käner, blifwer uptagen, och hälst af sådana som hafwa största vota, jag wett och att den ängelska nationen, — fast du och wähl des utan finner dina gynnare. Och will jag dig försäkra, att med tiden få boo uti Botanices principum palats, ja ofta blifwa deras geheime råd. Valeas ita, te temet commendo omnibus, qvi rem herbariam amant coluntqve cum ratione.»

Derefter följa följande hexametrar:

»*Naturæ* qverela ad JOVEM».

»Alma diu jacuit totum *Natura* per orbem
neglecta et sine honore fuit, sine numine numen.
Ad solium *Jovis* ibat et has de corde qverelas
expromsit laceras, ut erat, diffusa capillos:
Nemo meos agnoscit opes, nec scilicet herbis
numen inesse putat, qvamvis latet abdita in meis
visceribus vis magna, ex coelo ducta potestas.
Cur hominum tam segne genus, pravumqve moraris
hactenus, at solio tum Jupiter infit ab alto.
arridens blandam alloqvitur sermone ministram.
Pelle metus mea nata et disjice nubila frontis
namqve, ni fallor, erit; neqve enim procul abfore credo
tempus, qvo nova gens priscos renovabit honores.
Tum pater inspiciens arcana volumina fati
ERESIUS primo se ostendit margine chartæ
proximus huic longo, sed proximus intervallo
PEDACIUS se offert, atqve una PLINIUS exstat.
Plurima tunc atro fuit obscurata colore
pagina, Botanicæ longumqve inviderat arti.
Donec jam tandem revolutis ordine lustris
MATTHIOLUS priscos instauraturus honores

communi impensa frætus regumqve favore.
Hunc seqvitur serie felici atqve ordine longo
illinc Cæsalpinus et hinc par nobile fratrum
Bauhini, atqve hac parte Columna et Clusius illa
pluraqve perpetua qvæ virent numina fama.
Excipit hinc sacros argentea pagina visus,
Breynius, Hermannus, Rheed et Morisonus in una
heu minimum brevis ipse ævi! mors improba coeptis
invidet et vitam medio in conamine rumpit.
Rajus hic implet opus, summaqve coronide figit
aureaqve explicuit Plukneti litera nomen.
Unus in hoc sacro Turnefortius margine splendit
Rivinus resplendenti sese exerit ære.
Apparent instructi acie, sed non tamen omnes
felices operum, infelix Kramerus et ausis
ipse suis impar.» — Fortsättning saknas. Huruvida detta företal, som i originalet är egenhändigt nedskrifvet utaf L. under senare hälften af år 1730, äfven hvad den latinska delen angår, måste tillskrifvas honom annat än som lån, har ej med någon grad af sannolikhet kunnat utrönas. — I »Egenh. Anteckningar» säger L. om denna tid s. 16: »Nu begynte han skrifwa sin *Bibliotheca Botanica*, sina *Classes Plantarum*, sin *Critica Botanica* och sina *Genera Plantarum*, att han ingen minut åsidosatte, så länge han vistades i Upsala». — Då L. den 3 Maj 1731 för andra gången såsom vikarie för Ol. Rudbeck d. y. började sina offentliga föreläsningar i Upsala univ:s botaniska trädgård och helsar sin åhörarekrets, säger han om det tilltänkta arbetet *Fundamenta Botanica*. »Jag har likwähl siälf komit så wida, att jag hint hop sättia 150 Regulas universales, h:ka jag eij deducerat af böcker äl:r Auctores utan af naturens egen anledning. Desse lofwar jag alle med probationer och exempel till allas tiänst med första under titel af *Fundamenta Botanica* skola publicera, då jag ingalunda twiflar med mindre Botaniqven skall få annat lius.»

Bland *Manuscripta Mennandriana* Vol. I. i Kongl. Bibl. i Stockholm (se noten 94 å sid. 25 härofvan) finnes ock i afskrift: »Caroli Linnæi St. Wredian. *Fundamenta Botanica* quæ Majorum operum Prodromi instar Theoriam Scientiæ Botanices per breves aphorismos sistit. — Viris Amplissimis et per orbem Celebratissimis D. D. Hermanno Boerhaavio, D. D. Antonio Jussieo, D. D. Joh. Jac. Dillenio, Angliæ, Galliæ, Bataviæqve Luminibus Scientiæ Botanices has primitias D. D. D. auctor. Dabam 1733 die 2 Aprilis Upsaliæ. — L. B. Cum vastissimam Regni vegetabilis sylvam absqve filo Ariadneo intrare esset immenso mari sine gubernaculo sese committere; hinc omnes Botanici, nomine tanto digni, tale filum sub titulo methodi s. systematis connectere tentarunt, cujus adminiculo etiam Tyro Botanices plus anni unius spatio progredi potest, quam eo destitutus per omnem vitam. Ut enim noster filum hocce methodicum sequi incipiat, ecce caterva nodorum Gordianis inexplicabiliorum, dubia puto, falsæ hypotheses, auctorum dissidia, Naturæqve contradictiones talibus eum labyrinthis implicant, ut, quo modo se inde extricare possit, plane nesciat. — *Bibliothecam* enim si consulit Botanicam, inter mille auctores, ah! quam paucos reperiet, qui quid natura ferat, ferreve recuset recte observarunt. *Systemata* autem inter se dissentire, principio ut putat irreconciliabili, videbit, quodnam tutissimum sit, nescius; quisqve enim suum maximi æstimat, quasi id ita omnibus numeris per-

fectum esset, ut nihil perfectius, naturæqve convenientius dari vel excogitari, immo ita firmum, ut totum regnum vegetabile huic fundamento superstrui posse sibi persuadeat. *Terminos* inter millenos artis, plerosqve æquivocos, indeterminatos varieqve usurpatos, observabit. *Fructificationem*, quam post Cæsalpinum omnes saniores Botanici pro fundamento scientiæ hujus primario assumserunt, non solum a variis varie accipi, sed etiam a Novatoribus, qui supra alios sapere sibi videntur, negligi, cum vix ab ullo demonstratum sit, attonitus aspicit. *Sexum*, in quo Essentia fructificationis et tota salus Botanices consistit, non solum lusum ingenii esse, vel curiosum tantum, sed etiam cum Pontedera fictitium proclamari audiet. *Characteres* tam varie componuntur, modo longiores, modo breviores, vel ex Fructu vel Petalis, quasi stamina, pistilla, calyces etc. essent partes supervacaneæ vel lusus naturæ, et quasi characteres omni methodo applicabiles dare impossibile foret. *Nomina generica* hæc vel illa laudat alter, alter vituperat. Ideo talem [tale] quod palato ipsorum non arrideat, et quod aliud aptius videatur [contemnunt], proprium arbitrium rationis sufficientis loco habentes. *Differentiæ* ad myriades usqve confectæ sunt, cujus autem sint usus, auctores ipsos sæpius nescire, testatur effectus. *Numerum specierum* supra 24000 ascendisse docent auctorum libri, vix autem 12000 adhuc innotuisse bona fide dico, innumeræ enim variationes specierum numerum non augent. *Synonymorum* continuationem post C. Bauhinum anxie exspectavit orbis, hactenus frustra. *Descriptiones*, in quas omnes nervos intenderunt veteres Epitomatores, jam superfluæ, nisi plane nova detegatur planta, judicantur, licet vix 100 plantas in vastis eorum voluminibus recte descriptas reperias. *Icones*, quarum egregia specimina nuper dedit Cel. Dillenius, quam paucæ a plerisqve rite exsculptæ sint. *Virium* cognitio ex veterum Græcorum, Romanorum et Arabum scriptis, nec non e formulis medicamentosis, licet decies decompositis hauritur. — Ex his omnibus colligere licet, quo loco sit scientia nostra Botanica, quæ tamen ad summum perfectionis gradum jam dudum adscendisse a multis visa est. Canones itaqve 365 tantum brevissime pono, qui non ex inanibus speculationibus nati sunt, sed plus quam 3000 plantarum examini debentur. Si editor sese obtulerit, primo quoqve tempore eos habebis, una cum observationibus et exemplis ac demonstrationibus, et quidem 1:o *Bibliothecam* Bot: 2:o *Systemata* omnia contracta et reformata. 3:o *Philosophiam* Bot: 4:o *Nomina* Bot: 5:o *Characteres* naturales. 6 & 7 *Species* cum suis variationibus atqve differentiis. Nec non *Floram Lapponicam*, *Lachesin Lapponicam*, *Historiam Insectorum Sueticorum*, *Aves Sueticas*, *Diætam naturalem* ex principiis Zoologicis — Appendicis loco *Methodum* nostram *Sexualem* addidi, nec non aliam quam e calyce confecimus, prior magis naturalis est. Breviter dicam, quod nulla methodus (: si modo genera naturalia non ex male assumtis principiis diviserit :) a fructificatione desumta unquam nocuit. Sed plures etiamnum utiles sunt, immo necessariæ. Hisce interim vale et fave.»

Uti Joh. Kohls *Hamburgische Berichte von gelehrten Sachen* 1732—35, delvis aftryckte af D. H. Stöver i Leben des Ritters Carl von Linné Th. II. Hamburg 1792. 8:vo min. S. 244—253, dels bebådas, dels omtalas såsom under tryckning, dels sökes förläggare till Linnæi ungdomsarbeten. Om *Fundamenta Botanica* meddelas af Kohl (*Hamb. Berichte* 1732 N:o 12 S. 94, se Stöver anf. st. S. 244—247) i utdrag af ett bref från »Upsala vom Februar. 1732: Unser geschickter Studiosus Medicinæ Herr Carolus Linnæus lässt ein Botanisches Werk unter dem Titel: *Fundamenta Botanica* unter die

hiesige Presse legen, das aus diesen XII. Theilen bestehen soll», hvarpå följer en utförligare redogörelse för dessas innehåll. »Im 1. erzählet er die Botanichen Bücher und die Geschichte der Verfasser auf eine ganz neue und Kunstmässige Art. Im 2. berührt er alle bisherige Lehr-Arten und Lehr-Begriffe, nach den Classen, Abschnitten und allgemeinen Namen der Pflanzen, nemlich des Cæsalpini, Monsoni [Morisoni], Hermanni, Jenautii [Knautii], Raji, Rivini, Tournefortii, Pontederæ nebst seiner eigenen Lehr-Art, welcher er auch des Magnolii seine, so bald er desselben rares Buch überkommen wird, beyzufügen gedenket. Bey den *Methodis Specialioribus* wird er die *Characteres genericos* beobachten. Z. E. in *Muscis* des Dillenii, und seiner eigenen. In *Fungis* des Dillenii; in *Graminibus* des Raji, Scheuchzeri und seiner eigenen; in *Plantis Umbelliferis* des Morisoni, Pontederæ &c. Im 3. kommen vor die Theile der Fructification, was sie seyn, wie sie unterscheiden; dabey in verschiedenen Beyspielen gezeiget wird, wie dieselbe richtig zu ordnen und einzutheilen. Im IV. behandelt er den *Sexum* der Pflanzen, und erweiset denselben ausführlich. Im V. unterscheidet er die wahrhafte allgemeine Kennzeichen von den falschen, und lehret, wie behutsam man dabey zu Werke zu gehen, und wie man nicht nur Einen, sondern alle Theile der *Fructification* in Acht zu nehmen, in zweifelhaften Fällen aber auf die äusserliche Gestalt vornehmlich zu sehen habe. Er behauptet, dass man die meisten Pflanzen an der Blüthe erkennen könne. Die Irrthümer aber der mehresten Botanicorum rühren daher, dass sie einige Haupt-Regeln nicht wüssten. Im VI. verwirft er mit bündigen Beweissthümern mehr als D. C. C. allgemeine Benennungen von Pflanzen. Im VII. redet er von den *Differentiis specificis*, die man, aus Unwissenheit des rechten Weges sie ausfündig zu machen, bey den wenigsten Namen beobachtet. Im VIII. berichtet er die *Variationes Plantarum* und weiset, wie sie a *Specierum notis* zu entscheiden. Im IX. führet er die nach dem Tournefortio von verschiedenen, Z. E. den Herrn Rivino, Pontedera, Jenautio [Knautio], Boerhaavio, Buxbaumio, Vaillantio &c. erfundene neue Arten von Pflanzen an, dabey er die 200 neue Arten des Tourneforts bis auf 75 einziehet. Im X. *De Synonymis*, quo ordine allegari debeant, et quid in unoquoque observandum. Im XI. folget eine Belehrung wegen Einrichtung der Beschreibungen der Planzen, mit zur Erläuterung dienenden Beyspielen. Im XII. schliesset er damit, dass er zeiget, wie grossen Nutzen die nach der Natur selbst eingerichteten Classen und Ordnungen haben, wie vielerley deren seyn, und welche Pflanz-Arten zu jeder Classe müssen gerechnet werden. — Der Herr Verfasser setzet noch diesen Vorberichte hinzu: Hæc omnia C.CXXX regulis s. Canonibus superstructa, exemplisque stabilita sunt. Observationes autem omnes ἀυτοψιᾶ auctoris nituntur. Earum in classes distributio a certa corporis parte desumitur, sectiones characteres generici prorsus nova Methodo instituuntur. Nomina specifica nova unicuique tribuuntur, allegatis synonymis.» Jfr härmed L:i bref d 1 Oct. 1733 till landshöfdingen i Umeå Gabr. G:son Gyllengrip, tryckt i S. Hedins *Minne* af von Linné *Fader och Son*, andra afd., Stockholm 1808 s. 65—68 och i något förändrad ordställning i »*Egenhänd. Anteckn.*» s. 169—172 samt i C. v. Linnés *Svenska Arbeten* Bd. 2: s. 78—83. — I *Hamb. Berichte* för år 1734 N:o 59 (se Stöver anf. st. S. 252) meddelas ett utdrag af ett bref till utgifvaren J. Kohl: »Aus Greifswald schreibt uns Herr D:r Nettelbladt unterm 12:ten Juli 1734, dass folgendes bey ihm angekommen sey: Carol. Linnæi Stipend. Wredian: *Fundamenta Botanica*, quæ majorum

operum prodromi instar theoriam scientiæ Botanices per breves aphorismos sistunt, in 4:to, von einigen Bogen, wozu ein Verleger verlangt wird. Es finden sich dabey 2 Tabellen. 1. Systema vegetabilium sexuale &c. staminibus et pistillis constructum. 2. Systema vegetabilium calycinum: e calycis diversis speciebus compositum. Der H:r Doctor hat das Manuscript in Händen, und kann sich der, welcher zum Verlag Belieben hat, bey ihm melden. Der H:r LINNÆUS ist übrigens ein zwar junger, aber sehr geschickter Botanicus in Schweden, welcher mit der Zeit sehr vieles in der Kräuterwissenschaft leisten wird, und schon wirklich leistet.» I ett bref af d. 24 Sept. 1735, nu i Linnean Soc:s i London arkiv, skrifver prof. CHR. NETTELBLADT från Leipz. till LINNÆUS: »för några dagar sedan har jag undfått H:r Doctorns bref af d. 9 Aug. och där utaf inhemtat H:r Doctorns åstundande angående des Botaniske Tr. Jag har ännu intet kunnat fåt någon förläggare till denna Tr. och will therföre efter Högl:de H:r D:r begiäran med holländska Bookhandlare som nu äro hijt ankomne skicka then sama under H:r BURMANNI Couvert öfwer till Amsterdam. Men skulle H:r D:r behaga gifwa sig tålamod till näst komande Påsk, så skall Tractaten blij tryckter här i Leiptzig.» L. synes icke hafva hyst stora förhoppningar, att löftet om tryckningen i Leipzig skulle gå i fullbordan, hvarföre han, som nu befann sig i Holland och der hoppades finna förläggare, höll fast vid sin begäran att få sin handskrift dit öfversänd. Den utkom ock under nästan alldeles oförändrad titel, sådan denna sist här ofvan anfördes, i Amsterdam 1736. 36 pag. i 8:vo. — Nästan samtidigt utgafs ock (med samma tryckort, tryckår och förläggare — SALOMON SCHOUTEN) CAROLI LINNÆI *Bibliotheca Botanica* etc. cum explicatione *Fundamentorum Botanicorum. Pars I:ma.* Sitt *Systema vegetabilium sexuale* offentliggjorde som bekant LINNÆUS redan i *Systema Naturæ* (ed. I) Lugd. Bat. 1735 fol. max., men åt *Systema vegetabilium calycinum* inrymdes plats först i CAROLI LINNÆI Med. Doct. *Classes Plantarum* seu Systemata Plantarum omnia a fructificatione desumta, quorum XVI universalia et XIII partialia, compendiose proposita etc. *Fundamentorum Botanicorum Pars II.* Lugd. Bat. 1738. 8:vo apud CONR. WISHOFF. Från sistnämnda tryckeri hade föregående år utgått CAROLI LINNÆI *Critica Botanica* etc. seu *Fundamentorum Botanicorum pars IV.* De öfriga delarne i det ursprungliga utkastet till plan för det då tilltänkta arbetet af L. med titel *Fundamenta Botanica* utarbetades ock samt uppgingo dels i hans samtida dels i hans senare arbeten, *Genera Plantarum*, *Species Plantarum* och *Philosophia Botanica* utan att dock vid deras offentliggörande i tryck framhölls, att äfven dessa utgjorde delar af *Fundamenta Botanica.* — Häri skulle nu ligga åtminstone delvis en förklaring på L:i egna ord om sig sjelf: — — »Alt hade han conciperat för sig, innan han ännu war 23 åhr gammal: alt utarbetat förrän han kom tillbakas hem till fäderneslandet, »Egenh. Anteckn.» s. 123. — Jfr äfven företalet till C. LINNÆI *Adonis Uplandicus* här nedan.

I Linnean Soc:s i London arkiv finnas, belysande denna utveckling, trenne handskrifter med följande titlar: 1:mo »CAROLI LINNÆI *Prælect. Bot.* in Hort. Acad. Ups. *Fundamentorum Botanicorum Tomus IV* continens Variationes, Conclusiones, Synonyma, Adumbrationes, Historias Classesqve naturales, ubiqve novis et propriis observationibus plenus flosculisqve characteristicis undiqve collectis coronatus, falsa et erronea ejiciens, Reiqve Herbariæ ad summum perfectionis gradum evehendum, incumbens. Ups. 1731. Jun: 24.» Mss, 8:vo min., 194 icke talmärkta sidor. 2:do »CAROLI LINNÆI *Fundamenta Botanica* in qvorum *Tom: VII Differentiæ Specierum* part: antecedentis» Mss 8:vo min.

(odaterad och opaginerad; 2 + 408 + App. 30 sid.) samt 3:tio »Caroli Linnæi M. S. *Fundamenta Botanica* in qvorum Tom VIII Differentiæ Specierum part: poster: Mens tamen ad sylvas et sua lustra redit. Claudianus lib: 3 præfationis. 1733.» Mss. 8:vo min. (opaginerad; 4 + 362 + 10 sid.) — Ehuru det icke var mig möjligt (år 1881) att framför annat hinna afskrifva af dessa ganska vidlyftiga handskrifter stort mer, än nyss anförda titlar, torde jag dock ur mina minnesanteckningar om den sistnämda böra anföra den från sid. 56 hemtade, hvilken just är den der upptagna synonymiken för Linnæa:

»Campanula serpillifolia. *C. B:* [*pin.* p.] 93. *prodr.* 35. Rudb: *Lapp.* 96 f. 1.

Nummularia norvegica flore purpureo. Kyll: *act. hafn.* 2. 346.

Nummularia norv. repens. folio dentato, fl: geminis. Pet: *cent.* 76.

Nummularia major rigidioribus et rarius crenatis foliis, flore purpureo gemello. Pluck: *alm.* 264.

Serpillifolia. Buxb: *act. petr.*

Nummularia foliis et facie virginiana flosculis parvis tubulosis, summo ramo binatim junctis. Pluk: *mant.* 136.

Rubeola virginiana nummulariæ foliis binatis, flosculis in summo purpureo coeruleis.

Rubia parva latifolia foliis ad genicula binis flore rubente. Bannist:

Nummularia Saxatilis minima repens, foliis crenatis, villosis, floribus albis. Sloan: *cat. jam.* 90.»

8 Lannerus se sid. 2 och sid. 13 noten 11 härofvan.

9 William Sherard, född 1659 i Bushby (Leicestershire), död 1728 $^{12}/_{8}$ i Eltham (Kentshire).

Redan år 1790 hade Sh. skickat J. Rajus växtgeografiska uppgifter från sina naturhistoriska forskningsresor i Cornwales, på ön Jersey, i Jura och Schweizeralperna. Han blef Engelsk konsul i Smyrna 1703—1721. Der anlade han en botanisk trädgård och förskaffade sig så rika växtsamlingar, att han icke blott kunde deraf meddela åt sin samtids mera framstående botanister, utan ändock sjelf egde ett herbarium, beräknadt innehålla 12000 arter, hvilket efter hans död och enligt hans förordnande tillföll univ. i Oxford. Före sin utresa hade han ombestyrt utgifvandet af P. Hermanni *Paradisus Batavus* Lugd. Bat. 1698, 1705. 4:to och efter sin återkomst öfvertalade han H. Boerhaave att till trycket befordra Seb. Vaillants *Botanicon Parisiense.* Han förmådde ock prof. Joh. Jac. Dillenius att från Giessen flytta till brodrens, Jac. Sherards gods Eltham och taga vård om dennes trädgård. För egen del önskade han Dillenii hjelp med utarbetande af en fortsättning på Casp. Bauhini *Pinax Theatri Botanici.* På det denne mera ostördt och med mera trygghet i ekonomiskt hänseende skulle få egna tid och krafter åt detta vidtomfattande arbete, testamenterade W. Sherard till Oxfords universitet ett så stort kapital, att räntan deraf borde räcka för upprättande af en särskild botanisk profession vid detta univ., med förbehåll att denna befattning skulle erbjudas Dillenius. Denne mottog kallelsen och öfverlefde sin gynnare i nära tjugo år, utan att dock hinna fullfölja dennes önskan. — Om Subularias upptäckt och förekomst skrifver Rajus anf. st.: »Sub aquis nascitur sabuloso solo inter Gladiolum lacustrem Clus: in lacu Hibernico *Lough Neagh*, qua territorium oppidi *Kilmore* alluit prope *Moyra* D:r Sherard».

10 »Gåthåsa» L:i *Öländska Resa* s. 320 och »Gåttåsa» L:i *Skånska Resa* s. 420; gästgifvaregård mellan Stenbrohult och Alfvestad.

11 »Ossea Rupp: 82. Cornus foemina Tourn: 641. C. B. 447». C. Linnæi *Hortus Uplandicus*, handskriften på Leufsta; se nedan. Jfr s. 39 n. 136 och s. 43 n. 21 härofvan.

12 August Quirinus Rivinus, född 1652 $^{9}/_{12}$ i Leipzig och död derst. 1723 $^{30}/_{12}$; professor i botanik i sin födelsestad. R. framträdde kort före eller nästan samtidigt med Tournefort såsom växtsystematiker genom sin *Introductio generalis in rem herbariam* Leips. 1690 fol., 1696. 12:mo och 1720. 8:vo. Han öppnade dermed en ny väg inom systematiken. Till indelningsgrund för sina 18 växtklasser, eller som han kallade dem, ordningar, valde han blommans och egentligen blomkronans byggnad och regelmässighet samt kronbladens antal. Genom strängt fasthållande af denna princip för indelningen var det honom möjligt att skapa ett lättfattligt och logiskt riktigt system, hvilket dock just derför måste blifva artificielt. I sin nyssnämnda afhandling, hvari han först framträdde med sitt system, uppställde han ock goda grundsatser för växternas namngifvande och karakteristik, hvarför R. är Linnæi närmaste föregångare och delvis mönster i methodisk nomenklatur. Han var vidare den förste, som från sitt system uteslöt den af mången då hårdnackadt försvarade indelningen af växterna i träd, buskar och örter. Under åren 1690—1699 utgaf han i Leipzig sitt praktfulla verk: *Ordines plantarum, quæ sunt flore irregulari monopetalo, tetrapetalo et pentapetalo* i folio med 386 st. kopparstick. Hela sin icke obetydliga förmögenhet offrade han på utgifvandet häraf. Efter hans död utkommo, enligt uppgift genom C. G. Ludwig, tabellerne utan text till *plantæ irregulares hexapetalæ*. Sitt förnämsta erkännande vann R. i Tyskland och sin kännedom om hans uppställning erkänner sig Linnæus hafva fått utaf J. H. Heucheri *Hortus Wittenbergensis* Wittenbergæ 1711. 4:o och utaf H. B. Ruppii genom J. H. Schutte först utgifna *Flora Jenensis* Francofurti & Lipsiæ 1718. 8:vo, ed. II ibdm 1726. 8:vo genom Frölich (äfven en ed. III utkom Jenæ 1745 genom Alb. von Haller). I sina ungdomsarbeten hänvisar Linnæus ofta till den första, någon gång till andra upplagan af *Flora Jenensis*, hvilken senare han då plägar särskildt anmärka. Alb. v. Haller höll troget fast vid Rivini, likasom Ant. de Jussieu vid Tourneforts samt J. J. Dillenius vid John Raji systematiska framställning af växtverlden.

13 Nu finnes denna ej i Linnés herbarium; jfr C. Hartman, Annotationes de plantis Scandinavicis herbarii Linnæani, in musæo Societ. Linnæanæ Londin. asservati, separataftryck ur *K. Vet. Akad:s Handlingar* för åren 1849 och 1851 s. 55—58.

14 »Habitat in monticulo nemoroso in itinere inter Lundinum & Christianopolim Scaniæ, interque diversoria Horva & Hörby septentrionem petenti a sinistra juxta viam publicam, item ad Öfwidskloster, Krageholm, alibi.» L: *Fl. Svec.* (ed. I) sp. 529, ed. II sp. 583. — Hvarken af Leche anf. st. eller i L:i *Skånska Resa* omnämnes Lunaria. — Horva eller Hurfva, som det vanligen skrifves, är närmaste gästgifvaregården åt n. o. från Lund på 19 kilometers afstånd och är nu station på Eslöf—Ystad banan. Hörby, beläget 17 kilom. från Hurfva, är slutstation för bibanan från Hör.

15 Station vid Gärds härads jernbana, 33 kilom. från Kristianstad.

16 Att anteckningen »*pent. irr.*» här icke berodde på en blott tillfällighet eller en misskrifning för »*tetr. irr.*» eller att L: med full afsigt räknade redan nu *Impatiens* till herbæ flore irregulari pentapetalo, då den af Rivinus och efter honom af Ruppius upptogs bland herbæ flore irregulari tetrapetalo, bevisas bäst deraf, att såväl i L: *Gen. pl.* (ed. I) Lugd. Bat. 1737. 8:vo p. 268 g. 680, som ännu i ed. VI Holmiæ 1764. 8:vo p. 458 g. 1008 om *Impatiens* angifves: »*cor pentapentala*». Häraf framgår ock L:i noggranna iakttagelse och sjelfständighet.

17 Carl Schultén, född 1672 $^{12}/_{6}$ i Svedvi socken i Westmanland, prof. i logik och i historia vid univ. i Pernau 1705—1709, i vältalighet vid univ. i Lund 1715, derefter i österländska språk och slutl. i teologi vid samma univ., död derstädes 1730 $^{5}/_{10}$.

18 John Wray l. Ray, hvilket senare skrifsätt för tillnamnet han enligt Alb. v. Haller (*Bibliotheca Botanica* Tom. I. Tiguri 1771. 4:o p. 500) från år 1670 begagnade, föddes i Black Notley nära Braintree (Essex) den 29 Nov. 1628 och dog derst. den 17 Januari 1705. — Den framstående plats i botanikens historia, v. Haller i nyssnämnda arbete lät Ray intaga, försvarade han till fullo så väl genom naturlig begåfning och skarp iakttagelseförmåga som genom grundliga, omfattande studier och sjelfkritik i ovanligt hög grad. Under säregna lifsvilkor kom han ock att egna en lång följd af år, oaktadt ekonomiskt tryck och bruten helsa, åt en mångsidig författareverksamhet, hvilken särskildt inom botaniken (enligt v. Haller) fann en motsvarighet först i Linnés. — Efter genomgångna pröfvoår inom Trinity College vid universitetet i Cambridge och med framstående förstudier, synnerligen i latin och grekiska, blef han der »Prælector Primarius» och »Junior Dean» samt två gånger »College Steward». Härunder kom han ock i tillfälle att blifva »tutor» eller protector för yngre medlemmar inom Trinity College af förmögna slägter, bland hvilka han i Francis Willughby (* 1635) fann ej blott en flitig lärjunge och en liksinnad vän, utan ock snart en mångpröfvad gynnare. Willughby, som med förkärlek idkade zoologiska studier, lyckades snart väcka och vinna Wrays intresse för naturalhistoriska undersökningar i Cambridge omnejd. Wray valde för sin del växtverlden och en frukt af dessa hans forskningar blef en alfabetisk förteckning »*Catalogus Plantarum circa Cantabrigiam nascentium*». Cantab. 1660. 12:mo. Dessa utfärder eller »intineraries» utsträcktes ock 1658—1662 med samma eller likasinnade följeslagare öfver största delen af England, Wales och delvis äfven till Skottland. Under tiden fullbordade Wray sina förberedelser för inträde på den presterliga banan och blef ordinerad prest i Dec. 1660 samt qvarstod såsom medlem af Trinity College ända till Sept. 1662. Drifven af samvetsbetänkligheter vägrade han då att enligt den så kallade »Bartolomew Actens» fordran underskrifva en öppen protest mot de reformertas »solemn league and covenant», men måste derför ock lemna universitetet i Cambridge och afstå från all tanke på befordran inom den anglikanska kyrkan. — Från denna tid synes Willughby hafva varit hans räddare. Följande vår anträdde båda för samlande af naturalier på kontinenten en flerårig resa, hvilken utsträcktes till Malta och Sicilien. Efter återkomsten till England 1666 fann Wray oftast sitt hem hos Willughby på Middleton Hall i Warwickshire och bådas tid upptogs med ordnandet och bearbetandet af de gjorda samlingarna. Innan dessa arbeten hunnit afslutas eller åtminstone innan de kunde offentliggöras, utkastades planer för en gemensam naturhistorisk resa till Amerika,

hvilka dock omintetgjordes genom Willughbys plötsliga frånfälle den 3 Juli 1672. På grund af sin väns yttersta vilja kände sig Ray pliktig så väl att vaka öfver dennes båda söners uppfostran som att till trycket befordra hans efterlemnade ännu ofullbordade zoologiska handskrifter. Willughby hade ock tillförsäkrat Ray en lifstidspension af 60 L., hvilken nu blef den store mannens förnämsta inkomst under hans återstående lif. Sedan Willughbys moder Lady Cassandra dött, drog sig Ray från Middleton Hall och tillbragte de sista 25 åren i närheten af sitt eget barndomshem Black Notley. — Af Willughbys handskrifter publicerade Ray i dennes namn: *Ornithologiæ libri tres* London 1676 fol. och en engelsk öfversättning London 1678 fol. samt *De Historia Piscium libri quatuor, jussu & impensis Societatis Regiæ Londinensis editi.* Oxonii 1686 fol. Huru stor andel häraf rätteligen torde tillkomma Ray, blir nog svårt afgöra. Sjelf säger han om det förra: »totum opus recognovit, digessit, supplevit Johannes Raius och om det senare: »totum opus recognovit, coaptavit, supplevit, librum etiam primum & secundum integros adjecit Johannes Raius». Säkert är, att Rays granskning och tillägg blefvo en vetenskaplig vinst. Hans egen håg var dock afgjordt riktad åt växtverlden, der han ock vann sina skönaste segrar. Hithörande hufvudverk blefvo: *Methodus Plantarum nova* London 1682. 12:o, *emendata & aucta* London [Leidæ, jfr E. Lankaster, *Memorials of* John Ray Lond. 1846. 8:o p. 50] 1703. 8:o; *Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum* Lond. 1690. 8:o, »editio secunda» Lond. 1696. 8:o (ed. III Lond. 1724. 8:o genom Joh. Jac. Dillenius) samt *Historia Plantarum* T. I—III London 1686—1704. fol.

Ej tillfredsställd af föregåendes (A. Cæsalpini och R. Morisons) eller af samtidas (Rivini och Tourneforts) försök att endast i fruktens eller i blommans byggnad söka grunden för en systematisk framställning af växtverldens mångskiftande former, tvingades Ray, ehuru skild från bibliotek och botaniska trädgårdar, att framträda med en sjelfständig, delvis på växternas allmänna habitus grundad, method, hvilken han senare underkastade mycken sjelfkritik och ändringar. Hans genera, motsvarande andra författares klasser men derjemte grupper af lägre ordning, vexlade ock. Genusbegreppet i Tourneforts och senares mening var således ej för Ray klart. Bibehållande och försvarande den gamla indelningen i träd, buskar och örter, kom Ray särskildt härom i meningsbyte med Rivinius. Äfven mot Tourneforts grupperingar uppträdde han kritiserande. Förnämligast genom Joh. Jac. Dillenius och Hans Sloane bland sina landsmän känd och beundrad, vann dock Ray utom England föga erkännande såsom systematiker. Linnæi stränga omdöme om Rajus i bref till v. Haller 1737 (Epist. 145 p. 322) mildrar han sjelf i sina *Classes Plant.* och *Hort. Cliff.*, i hvilket senare arbete han säger om Raji *Historia Plantarum:* Opus immensi laboris.

Många jemförelsepunkter finnas i Rays och Linnés lif. Båda, ämnade till prester, fingo på annat sätt lägga i dagen sin oskrymtade gudsfruktan och förkunna Guds under; sedan båda under några år fått draga fördel af ädel täflan med en i naturanlag likasinnad ungdomsvän (Ray och Willughby, Linnæus och P. Artedi) måste de helt plötsligt sörja sin förlust samt åt samtid och efterverld söka bevara dessas minne genom offentliggörande af deras handskrifter. Rörande var deras sorg, ovanskliga blifva deras minnesvårdar. Båda arbetade för antagandet af en allmänt gillad terminologi samt gåfvo genom trägna och sjelfständiga undersökningar i naturen många vigtiga bidrag till en

sundare uppfattning af densamma. Bådas biologiska iakttagelser äro synnerligen anmärkningsvärda perlor i Charles Darwins tid, särskildt för deras landsmän. Linnæi egen spådom (se sid. 95 härofvan) har gått i bokstaflig uppfyllelse.

Man skulle väl vänta, att L: vid tillämpningen af Methodum Rajanam följde den här ofta åberopade Raji *Synopsis* ed. III. Att så dock ej skedde, visar sig genast vid första gruppen, dit L: räknade Chara, som af Rajus l. Dillenius fördes jemte Ophioglossum till Genus Quartum: Herbæ Capillares & Affines. — Jfr »Præcognoscenda» [p. VII] i Raji *Methodus Plantarum emendata & aucta.* 1703. 8:o. — Hvad de här inom klammer angifna Genusnumren beträffar, hänvisa dessa liksom de följande till »Clavis Classium Raji» i Linnæi *Classes Plantarum* Lugd. Bat. 1738. 8:o p. 67 och 68.

19 Jfr *Meth. Pl.* p. 8 och Linnæi *Classes Plant.* p. 67—71.

20 Anmärkningsvärdt är, att L: här låter gräs och halfgräs intaga plats tvärt emot Raji ordningsföljd; detta häntyder på en aning om, att med de ofullkomligaste växterna såsom utgångspunkt för den systematiska framställningen, fortskridandet till de allt fullkomligare måste fordra en omkastning af Raji *Dicotyledones* och *Monocotyledones* eller med andra ord ett försök gjordes här af L: att anse de senare såsom ofullkomligare. Att en sådan plan sedan ej genomfördes, utan att i det följande en sammanblandning sker, synes antyda, att L: väl redan i vissa fall insåg rätta skilnaden mellan dessa grupper, men i andra följde Raji anvisningar. — Jfr L:i *Classes Plant.* p. 98.

21 »*Sidd.* (pl. er) f. vattensjukt ställe, sank ort, liten däld Götal., äfven i Sveal». J. E. Rietz, *Svenskt Dialect-Lexikon* Lund 1867. 4:o sid. 562.

22 Peter Martin, född 1687 i Gefle, med. d:r i Leyden 1710, assessor i coll. med. och prov. läkare i Södermanland 1711, med. adj. vid univ. i Upsala 1719, död derst. 1727 $^{20}/_{6}$; måg åt Ol. Rudbeck d. y. Sacklén anf. st. D. I s. 80.

23 Vacuum i originalet.

24 Jfr s. 6 och 7 härofvan.

25 Jfr Raji *Synopsis* (ed. III) p. 134.

26 Jfr Raji *Meth. Pl.* (ed. II) p. 27—30.

27 Jfr Raji *Meth. Pl.* (ed. II) p. 67—69.

28 Jfr s. 8 och s. 20 noten 61 härofvan. — Här vågar dock L: försöket att föra *Sceptrum Carolinum* Rudb: f. till genus *Pedicularis.*

29 Jfr Raji *Meth. Pl.* (ed. II) p. 20 och 94—100, *Synopsis* (ed. III) p. 291 och 304 samt Linnæi *Classes Plant.* p. 92 och 93.

30 När L: första gången insamlade *Draba incana* vid Upsala har ej kunnat utredas, antagligen var den förut funnen der af Ol. Celsius. Den är ej anförd af Rajus eller Dillenius. — *Cardamine impatiens* torde L: funnit under sin vistelse i Stockholm under sommaren 1731, se sid. 9 här ofvan. Denna är upptagen i Raji *Synopsis* (ed. III) p. 299.

31 Jfr Raji *Meth. Pl.* p. 101 och 102, *Synopsis* p. 318 och Linnæi *Class. Pl.* p. 94.

32 Jfr Raji *Meth. Pl.* p. 83 och 85, *Synopsis* p. 282 och 286; Linnæi *Classes* p. 89.

33 Jfr Raji *Meth. Pl.* p. 115—120, *Synopsis* p. 369—375; Linnæi *Classes* p. 96.

34 Jfr Raji *Meth. Pl.* p. 121—123, *Synopsis* p. 376—385; Linnæi *Classes* p. 97.

35 Jfr Raji *Meth. Pl.* p. 94—100, *Synopsis* p. 308—317; Linnæi *Classes* p. 93.

36 Denna appendix förskrifver sig från en senare tid än det föregående. — Hvad som afsågs med Gentiana Wgoth har ej kunnat utredas.

Tryckfel.

Sid.	67	raden	11	nedifrån	står lineai läs lineas
»	78	»	8	uppifrån	» CYPERIODES läs CYPEROIDES
»	80	»	14	nedifrån	» MELAMPYNUM läs MELAMPYRUM

CAROLI LINNÆI

M. ET H. N. C.

HORTUS UPLANDICUS

SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM,

QUÆ IN VARIIS HORTIS UPLANDIÆ, IMPRIMIS AUTEM IN HORTO BOTANICO UPSALIENSI COLUNTUR.

METHODO TOURNEFORTIANA IN CLASSES REDACTÆ.

[Cl. 1.] HERBÆ CAMPANIFORMES.

1. APOCYNUM erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus parvis, obsolete purpurascentibus *Tourn:* 91. Apoc. [latifolium] syriac. incan. erectum, floribus umbellatis, minoribus, obsolete purpurascentibus, siliqvis folliculatis rugosis *Herm:* 52. Apocynum majus, syriacum, rectum *Cornut:* p. 90, [fig. bon.] descript. p. 91. Apocynum medium, peregrinum, flore umbellato, ex obsoleto dilute purpurascente, petalis reflexis *Moris:* III. p. 609, § 2. Apocynum rectum americanum majus s. latifolium *Volck:* 38.

2. RUBIA tinctorum sativa *Tourn:* 114. *C. B:* 333. Rubia sativa *Matth:* 598. Rubia *Dodon:* 349 [in ed. 1583, p. 352 in ed. 1616].

[Ej upptagen i Leufsta ex., men i Linn. Society's ex. förekommer densamma på två ställen.]

3. MALVA foliis crispis *C. B:* 315. *Tourn:* 95. Malva crispa *Dod:* 642. *Besl: æstiv. ord.* 6. fol. 9. fig. 1. Margines foliorum undulati.

4. MALVA folio Ficus *C. B: Prod:* 137. Malva folio Ficus altera *C. B:* 315. Alcea rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, nigricante et aspero *Tourn:* 98. Malva mauritiana *Rupp:* 13 [in ed. 1745, p. 10 in ed. 1726], ubi dilucidatur.

Calyx infer. 3-folius, flores purpurei in alis foliorum. Folia ad medium 3-fida, obtusa, mediâ laciniâ longiori.

Originalet in 12:o helt och hållet egenhändigt skrifvet af Linnæus år 1730 (före Leufsta ex. N:o 1) eges af Linn. Society i London och omfattar 86 sidor, hvaraf bladet 13, 14 var löst $^{29}/_{7}$ 1881. I slutet äro 4 blad oskrifna. Boken har tydligen varit inbunden, men bandet är nu afslitet; 2:ne pergamentshäftor sitta ännu qvar i ryggen.

1. Asclepias syriaca *L: Spec. Pl.* I. 214, II. 313; Hort. Ups. 53. **2.** Rubia tinctorum *β L: Spec. Pl.* I. 109, II. 158; H. 28. **3.** Malva crispa *L: Spec. Pl.* I. 689, II. 970; H. 200. **4.** M. mauritiana *β L: Spec. Pl.* I. 689, II. 970; H. 200.

5. MALVA rosea, folio subrotundo *C. B:* 315. Malva major *Matth:* 339.

[Ej i Leufsta ex.]

Calyx inferior monophyllus, 5-fidus. Folia mollia leviter incana. Hujus variationes a colore floris desumptæ sunt.

MALVA ros. fol. subrot. flore dilutius rubente *Tourn:* 94.
— — — — flore saturatius rubente *Tourn:* 95.
— — — — flore ex rubro nigricante *Tourn:* 95.
— — — — flore simplici luteo *Tourn:* 95.

6. MALVA frutescens folio rotundiore incano *Rupp:* 16 [p. 12 in ed. II, p. 15 in ed. III]. Althæa frutescens, folio rotundiore incano *C. B:* 316. *Tourn:* 97. Arbor perennis.

7. MALVA palustris mollis et incana [P. Herman]. *Rupp:* 16 [p. 12 in ed. II. p. 15 in ed. III]. Althæa Dioscoridis et Plinii *Tourn:* 97. *C. B:* 315. Althæa *Matth:* 600. Althæa Ibiscus *Dod:* 644 [in ed. 1583, p. 655 in ed. 1616]. Calyx inferius multifidus et laciniatus.

8. MALVA sylvestris altissima, folio cannabino, flore amplo. *Rupp:* 16. Alcea vulgaris major *C. B:* 316. Alcea vulgaris major flore ex rubro roseo *Tourn:* p. 97. Alcea vulgaris major flore candidiore *Tourn:* 97, Varietas prioris.

Folia inferiora integra fere, superiora maxime laciniata.

9. BAMMIA *Riv. apud Rupp:* 38 [in ed. 1718, p. 31 in ed. 1726, p. 39 in ed. 1739]. Ketmia vesicaria vulgaris *Tourn:* 101. Alcea vesicaria *C. B:* 317. *Dod:* 646 [in ed. 1583, p. 657 in ed. 1616]. Hypecoum *Matth:* 673.

10. CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore coeruleo *Tourn:* 108. *C. B:* 94. Campanula pulchra, a Tossano Carolo missa *J. B:* 807. Hujus varietas tantum est:

CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore albo *C. B:* 94. *Tourn:* 109. Folia in hac specie glabra ut et calyces.

11. CAMPANULA vulgatior foliis Urticæ, flore duplici et triplici coeruleo *Tourn:* 109. Varietas antecedentis.

---

5. Alcea rosea L: *Spec. Pl.* I. 687, II. 966; H. 204. **6.** Lavatera triloba L: *Spec. Pl.* I. 691, II. 972. **7.** Althæa officinalis L: *Spec. Pl.* I. 686, II. 966; H. 204. **8.** Malva Alcea L: *Spec. Pl.* I. 689, II. 971; H. 201. **9.** Hibiscus Trionum L: *Spec. Pl.* I. 697, II. 981; H. 206. Jfr. L: Hort. Cliff. p. 349. **10.** Campanula latifolia L: *Spec. Pl.* I. 165, II. 233. **11.** Campanula Trachelium L: *Spec. Pl.* I. 166, II. 235.

12. TITHYMALUS palustris fruticosus *C. B:* 292. *Tourn:* 87, Esula palustris *Riv: tetr. irr.* tab. 240. Ezula maior *Dod:* 370 [in ed. 1583, 374 in ed. 1616].

Magnitudine bicubitali a ceteris abunde differt.

13. CUCUMIS sativus vulgaris, maturo fructu subluteo *C. B:* 310. *Tourn:* 104. Cucumis vulgaris *Dod:* 651 [in ed. 1583, p. 662 in ed. 1616].

14. MELO vulgaris *C. B:* 310. *Tourn:* 104. Melo s. Melopepo vulgo, Cucumis Galeni *Dod:* 652 [in ed. 1583, p. 663 in ed. 1616].

15. PEPO oblongus *C. B:* 311. *Tourn:* 105. Pepo major oblongus *Dod:* 654 [in ed. 1583, p. 665 in ed. 1616].

16. MOMORDICA vulgaris *Tourn:* 103. Balsamina rotundifolia repens, s. mas *C. B:* 306. Balsamina *Matth:* p. 793.

17. RUBIA tinctorum. Se N:o 2.

18. RUSCUS myrtifolius aculeatus *Tourn:* 79. Ruscus *C. B:* 470. *Matth:* p. 751.

Folia in acutum mucronem desinunt.

19. RUSCUS angustifolius, fructu folio innascente *Tourn:* 79. Laurus alexandrina, fr. pediculo insidente *C. B:* 304. Hippoglossum *Matth:* 741.

Foliolum e medio folio enascitur, intra qvod fructificatio collocatur.

20. CONVOLVULUS major albus *C. B:* 294. *Tourn:* 82. Smilax lævis major *Dod:* 388 [in ed. 1583, 392 in ed. 1616]. Convolvulus vulgaris major albus seu flore majore albo *Moris:* II. p. 12 s. 1 t. 3 f. 6. Folia satis distincta.

21. CONVOLVULUS purpureus, folio subrotundo *C. B:* 295. *Tourn:* 82. *Moris:* II, p. 183 [13] s. 1 t. 3 f. 7.

Folia

---

12. Euphorbia palustris L: *Spec. Pl.* I. 462, II. 662. **13.** Cucumis sativus L: *Spec. Pl.* I. 1012, II. 1437; H. 292. **14.** Cucumis Melo L: *Spec. Pl.* I. 1011, II. 1436; H. 292. **15.** Cucurbita Pepo β L: *Spec. Pl.* I. 1010, II. 1435; H. 291. **16.** Momordica Balsamina L: *Spec. Pl.* I. 1009, II. 1433; H. 293. **17.** Se N:o 2. **18.** Ruscus aculeatus L: *Spec. Pl.* I. 1041, II. 1474; H. 300. **19.** R. Hypoglossum L: *Spec. Pl.* I. 1041, II. 1474; H. 300. **20.** Convolvulus sepium L: *Spec. Pl.* I. 153, II. 218. **21.** Convolvulus purpureus L. *Spec. Pl.* II. 219; H. 38.

[Cl. II.] INFUNDIBULIFORMES.

22. VALERIANA hortensis *Dod:* 346 [in ed. 1583, p. 340 in ed. 1616]. Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis *C. B:* 164. *Tourn:* 132. Phu magnum *Matth:* 34 [in ed. 1570].

Folia infima integra, superiora pinnata.

23. LOCUSTA *Riv: m. irr.* I. tab. 6. Valerianella arvensis præcox, humilis, semine compresso *Tourn:* 132. Valeriana campestris inodora major *C. B:* 165. Album Olus *Dod:* 636 [in ed. 1583, p. 647 in ed. 1616].

24. BORRAGO floribus coeruleis *Tourn:* 133. Buglossum latifolium, Borrago, flore coeruleo *C. B:* 256. Buglossum s. Borrago *Matth:* 737. — BORRAGO floribus albis *Tourn:* 133. Buglossum latifol. Borrago fl. candido *C. B:* 256. Varietas prioris.

[Ej sammanförda i Leufsta ex.]

25. LITHOSPERMUM majus erectum *C. B:* 258. *Tourn:* 137. Lithospermum minus *Matth:* 596.

26. BUGLOSSOIDES *Kram:* 106. Echioides flore pullo, calice amplo *Riv:* apud *Rupp.* ed. II. p. 177. Buglossum procumbens, annuum, pullo minimo flore; *Moris:* III. p. 439, s. 11. t. 26. f. 11.

27. SYMPHYTUM consolida major, fl. purpureo, qvæ mas *C. B:* 259. *Tourn:* 138. Symphytum majus s. consolida major *Matth:* 620. — SYMPHYTUM consolida major, fl. albo, quæ foemina *C. B:* 258. *Tourn:* 138.

[Ej sammanförda till en i Leufsta ex.]

28. CERINTHE qvorundam [minor] flavo flore *Tourn:* 80. Cerinthe minor *C. B:* 258.

29. PRIMULA veris pallido flore elatior *Tourn:* 124. Primula veris major *Dod:* 147 [in ed. 1583]. Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum *C. B:* 241.

Diameter disci floris är æqvalis med longitudo ejusdem, qva nota a sylvestri differt, cui alias satis similis.

---

22. Valeriana Phu L: *Spec. Pl.* I. 32, II. 45; H. 13. **23.** Valeriana Locusta *α* olitoria L: *Spec. Pl.* I. 33, II. 47; H. 14. **24.** Borago officinalis L: *Spec. Pl.* I. 137, II. 197; Borrago i Hort. Ups. p. 34 och Phil. Bot. **25.** Lithospermum officinale L: *Spec, Pl.* I. 136, II. 195. **26.** Lycopsis vesicaria L: *Spec. Pl.* I. 138, II. 198; H. 35. **27.** Symphytum officinale L: *Spec. Pl.* I. 136, II. 195. **28.** Cerinthe minor L: *Spec. Pl.* I. 137, II. 196. **29, 30** och **31.** Primula veris *β* elatior L: *Spec. Pl.* I. 143, II. 204; H. 37. Jfr Hort. Cliff. p. 50.

30. PRIMULA veris prolifera flore majore *Tourn:* 125.

Varietas antecedentis calyce colorato.

31. PRIMULA veris multiflora *Tourn:* 124. *Tabern:* II. 34. Verbasculum sylvestre magno plenoqve flore *C. B:* 242.

Est eadem species fl. pleno.

32. PRIMULA veris caulifera, prolifera, odorata *Tourn:* 125. Verbasculum proliferum *C. B:* 242. Primula veris prolifera *Tabern:* II. 33.

Est eadem species ac illa, qvæ in pratis nostris et officinis prostat, et ab eadem tantum calyce colorato differens.

33. PRIMULA veris, hortensis, flore ferrugineo, umbellato *Tourn:* 124.

Est sylvestris nostra, colore floris diversa. Varietas pratensis.

34. AURICULA ursi flore purpureo *Tourn:* 120. Sanicula alpina *C. B:* 242. — AURICULA ursi flore magno, atropurpureo, holoserico [simplici], umbone candido, amplissimo *Tourn:* 120. — AURICULA ursi flore variegato *Tourn:* 121. Flos ex luteo et nigro variegatur; hæ tres plantæ tantum varietates sunt.

[Ej sammanförda till en i Leufsta ex.]

35. LYSIMACHIA humifusa folio rotundiore, flore luteo *Tourn:* 141. Nummularia supina s. Nummularia officinarum *Rupp:* 19. Nummularia major lutea *C. B:* 309.

36. BLATTARIA lutea, folio longo laciniato *C. B:* 240. *Tourn:* 147. Blattaria *Matth:* 718. Blattaria annua, ramosa, floribus luteis, staminibus purpureis *Moris:* II. p. 489. s. 5. t. 9.

37. OXYS lutea *Tourn:* 88. Trifolium acetosum, corniculatum *C. B:* 330. Trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus repens vel item procumbens *Moris:* II. p. 183. s. 2. t. 17. f. 2. Planta ramosa.

[Bland Campaniformes hos Tournefort och i Leufsta ex.]

38. VINCA *Riv:* apud *Rupp:* 127 [ed. 111]. Pervinca vulgaris, latifolia, flore coeruleo *Tourn:* 119. Clematis daphnoides major *C. B:* 302. *Dod:* 401 [in ed. 1583, p. 406 in ed. 1616].

39. JALAPA flore purpureo *Tourn:* 129. Mirabilis Rivini *Rupp:* 1. Solanum mexicanum flore magno *C. B:* 168. Mirabile peruvianum *Moris:* III. 598. s. 15. t. 1. f. 1. Viola peruviana *Tabern:* II. 31.

---

32 och **33.** Primula veris var. L: **34.** Primula auricula var. L: Jfr. Hort. Cliff. p. 50. 2. **35.** Lysimachia Nummularia L: *Spec. Pl.* I. 148, II. 211. **36.** Verbascum Blattaria L: *Spec. Pl.* I. 178, II. 254; H. 46. **37.** Oxalis corniculata L: *Spec. Pl.* I. 435, II. 623; H. 116. **38.** Vinca major L: *Spec. Pl.* I. 209, II. 304. **39.** Mirabilis Jalapa L: *Spec. Pl.* I. 177, II. 252; H. 43.

Eicon 315 e Tournef. — JALAPA flore exalbido *Tourn:* 129. — JALAPA flore ex purpureo et luteo mixto *Tourn:* 129. Hæ tres tantum varietates.

[Ej sammanförda till en i Leufsta ex.]

40. NICOTIANA major latifolia *C. B:* 169. Hyoscyamus peruvianus *Dod:* 449 [in ed. 1583, p. 452 in ed. 1616].

41. PETUM *Riv:* apud *Rupp:* 24 [ed. 1745]. Priapeia qvibusdam. Nicotiana [s. Tabacum minus] *J. B:* III. 630.

42. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo *Tourn:* 119. Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo *C. B:* 168.

43. POLEMONIUM vulgare, coeruleum *Tourn:* 145. Vulneraria alata Blattariæ flore coeruleo *Moris:* III. 605. Valeriana coerulea *C. B:* 164. — POLEMONIUM vulgare, album *Tourn:* 146. Valeriana alba *C. B:* 164. Varietas antecedentis a colore floris.

[Ej sammanförda i Leufsta ex.]

44. ASPARAGUS sativa *C. B:* 489. *Tourn:* 300. Asparagus *Matth:* 349. Asparagus hortensis *Dod:* 691 [in ed. 1583, p. 703 in ed. 1616].

[Jfr p. 26 i Leufsta ex: »Rosacei» och hos *Tourn.*]

45. SANGUISORBA minor, montana, lævis, hirsuta *Rupp:* 58. Pimpinella sanguisorba minor hirsuta *C. B:* 160. *Tourn:* 157. *Moris:* III. p. 263. s. 8. t. 18. f. 1. Stamina plurima.

46. SANGUISORBA major, pratensis *Rupp:* 58. Pimpinella sanguisorba major *C. B:* 160. *Tourn:* 156. *Moris:* III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 7. Spica rubra. Stamina 4.

47, SANGUISORBA canadensis, flore albo spicato *Rupp:* 58 [in ed. I, p. 50 in ed. II, p. 63 in ed. III]. Pimpinella maxima canadensis *Tourn:* 157. Pimpinella sanguisorba canadensis, major, spicata, flore longiore albo *Moris:* III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 12. Spica longa, alba. Stamina 4.

48. SOLANUM fruticosum, bacciferum *C. B:* 166. *Tourn:* 149. Psevdocapsicum *Dod:* 706 [in ed. 1583, p. 718 in ed. 1616]. Arbor.

49. LYCOPERSICUM Galeni *Tourn:* 150. Solanum pomiferum [fructu rotundo striato molli] *C. B:* 167. Aurea mala *Dod:* p. 455 [in ed . 1583, p. 458 in ed. 1616.]

---

40. Nicotiana Tabacum L: *Spec. Pl.* I. 180, II. 258; H. 45. **41.** N. rustica L: *Spec. Pl.* I. 180, II. 258; H. 45. **42.** Datura Stramonium L: *Spec. Pl.* I. 179, II. 255; H. 43. **43.** Polemonium coeruleum L: *Spec. Pl.* I. 162, II. 230. **44.** Asparagus officinalis γ altilis L: *Spec. Pl.* I. 313, II. 448; H. 84. **45.** Poterium Sanguisorba L: *Spec. Pl.* I. 994, II. 1411; H. 288. **46.** Sanguisorba officinalis L: *Spec. Pl.* I. 116, II. 169. **47.** S. canadensis L: *Spec. Pl.* I. 117, II. 169. **48.** Solanum Pseudocapsicum L: *Spec. Pl.* I. 184, II. 263; H. 48. 1. **49.** Solanum Lycopersicum L: *Spec. Pl.* I. 185, II. 265.

50. SOLANUM tuberosum, esculentum, fl. albo *Tourn:* 149. *C. B:* 167. Prod: 89. *Moris:* III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 19. Bekant. Potatoes.

51. CAPSICUM siliqvis longis, propendentibus *Tourn:* 152. Piper indicum vulgatissimum *C. B:* 102. Piper indicum *Matth:* 400. Solanum urens [Capsicum dictum], siliqva propendente rubra *Moris:* III. p. 258. s. 13. t. 2. f. 1.

52. ALKEKENGI officinarum *Tourn:* 151. Solanum vesicarium *C. B:* 166. Solanum vesicarium [perenne], vulgatius repens, fructu et vesica rubra *Moris:* III. p. 526. s. 13. t. 3. f. 16.

[Cl. III.] PERSONATI.

53. ARISTOLOCHIA Clematitis recta *C. B:* 307. *Tourn:* 162. *Moris:* III. p. 509. s. 12. t. 7. [17]. fig. 5. Aristolochia multiflora *Riv: mon. irr.* [I. tab. 116]. Aristolochia saracenica *Dod:* 324 [in ed. 1583, p. 326 in ed. 1616].

54. DIGITALIS purpurea *Dod:* 169 [in ed. 1616]. *Tourn:* 165. Digitalis purpurea, folio aspero *C. B:* 243. Variat fl. albo.

55. GRATIOLA *Knaut:* 116. *Tabern:* 11. 84. *Matth:* 471. Gratiola centauroides *C. B:* 279. Digitalis minima, Gratiola dicta *Tourn:* 165. Folia perfecte serrata.

56. SCROPHULARIA fl. luteo *Tourn:* 166. *Riv: mon. irr.* [tab. 107]. *C. B:* Pin. p. 236, Prod. 112 c: fig. Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo *Moris:* II. p. 486. s. 5. t. 8. f. 2. Labium superius petali dupplicatum.

57. ADHATODA Zeylanensium *Tourn:* 175. *Herm: H. L. B.* 643. Ecbolium *Riv: mon. irr.* [I. tab. 88]. Dictamno forte affinis, indica, arborescens, Lauri americani foliis sive Ecbolium Zeylanensium, foliis laurinis *Breyn: Prodr:* 2. 41. c. descr.

58. ANTIRRHINUM flore albo, oris luteis *Tourn:* 168. Antirrhinum majus alterum folio longiore *C. B:* 211. Antirrhinum 1. *Tabern.* II. 524.

---

50. S, tuberosum L: *Spec. Pl.* I. 185, II. 265; H. 48. 2. **51.** S. annuum L: *Spec. Pl.* I. 188, II. 270; H. 47. **52.** Physalis Alkekengi L: *Spec. Pl.* I. 183, II. 262; H. 49. **53.** Aristolochia clematitis L: *Spec. Pl.* I. 962; II. 1364; H. 279. **54.** Digitalis purpurea L: *Spec. Pl.* I. 621, II. 866; H. 178. **55.** Gratiola officinalis L: *Spec. Pl.* I. 17, II. 24. **56.** Scrophularia vernalis L: *Spec. Pl.* I. 620, II. 864; H. 177. **57.** Justicia Adhatoda L: *Spec. Pl.* I. 15, II. 20; H. 7. **58.** Antirrhinum majus L: *Spec. Pl.* I. 617 *β*, II. 859; H. 175.

[Cl. IV.] LABIATI.

59. HORMINUM coma purpureo-violacea *Tourn:* 178. Horminum sativum *C. B:* 238.

60. SCLAREA pratensis, foliis serratis, flore coeruleo *Tourn:* 179. Horminum pratense *Riv: mon. irr.* [I. tab. 36]. Horminum pratense foliis serratis *C. B:* 238. *Moris:* III. p. 393.

61. SALVIA minor aurita et non aurita *C. B:* 237. *Tourn:* 181.

62. MOLDAUICA Betonicæ folio, fl. coeruleo *Tourn:* 184. Melissa peregrina, folio oblongo *C. B:* 229. Melissa moldavica *Matth:* 550. Cedronella *Riv.* apud *Rupp:* ed. I. 219. Pseudomelissa *Riv: m. irr.* I. tab. 73. — MOLDAUICA Betonicæ folio, flore albo *Tourn:* 184. Varietas antecedentis.

[Ej i Leufsta ex., der endast en art finnes.]

63. MARUM *Matth:* 489. Pseudomarum *Riv: mon. irr.* tab. 13. Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis *Tourn:* 205. Tragoriganum latifolium *C. B:* 221.

[Ej i Leufsta ex.]

64. CHAMÆPITYS lutea vulgaris, s. folio trifido *C. B:* 249. *Tourn:* 208. Chamæpitys *Riv: m. irr.* [tab. 14. fig. 1]. *Matth:* 608. Chamæpitys prima *Dod:* 46.

65. OCIMUM vulgatius *C. B:* 226. *Tourn:* 204. Ocymum majus [magnum] *Tabern:* II. 55.

66. PULEGIUM latifolium *C. B:* 222. Pulegium *Riv: m. irr.* [I. tab. 23]. Mentha aqvatica s. Pulegium vulgare *Tourn:* 189.

67. MENTHA crispa *Riv: m. irr.* [I. tab. 50]. Mentha rotundifolia, crispa, spicata *C. B:* 227. *Tourn:* 189. Planta spicata, folia crispa undulata.

68. MENTHA sylvestris rotundiore folio *C. B:* 227. *Tourn:* 189. Menthastrum folio rugoso, rotundiore, s. spontaneum, flore spicato, odore gravi *J. B:* III. 220.

---

59. Salvia Horminum L: *Spec. Pl.* I. 24, II. 34. **60.** S. pratensis L: *Spec. Pl.* I. 25, II. 35; H. 10. **61.** S. officinalis *β* L: *Spec. Pl.* I. 23, II. 34. **62.** Dracocephalum Moldavica L: *Spec. Pl.* I. 595, II. 830; H. 166. **63.** Teucrium Marum L: *Spec. Pl.* I. 564, II. 788; H. 159. **64.** Teucrium Chamaepitys L: *Spec. Pl.* I. 562, II. 787; H. 160. **65.** Ocimum minimum var. L: *Spec. Pl.* I. 597, II. 833. **66.** Mentha Pulegium L: *Spec. Pl.* I. 577, II. 807. **67.** M. crispa L: *Spec. Pl.* I. 576, II. 805; H. 168. **68.** M. viridis *γ* rotundifolia L: *Spec. Pl.* I. 576, II. 805.

69. MENTHA rotundifolia palustris s. aqvatica major *Tourn:* 189. *C. B:* 227. Mentha palustris spicata *Riv: m. irr.* [I. tab. 49]. Planta verticillata, minime spicata.

70. MASTICHINA *Boerh:* [*Ind: alt: pars prim: p. 156*]. Marum *Riv: m. irr.* [I. tab. 40]. Marum vulgare sive Clinopodium *Dod:* 271. Thymbra hispanica, Majoranæ folio *Tourn:* 197. Sampsuchus s. Marum, Mastichen redolens *C. B:* 224.

71. THYMUS vulgaris folio latiore, flore purpureo *C. B:* 219. Thymus vulgaris, folio latiore *Tourn:* 196. — 72. THYMUS vulgaris folio latiore, flore albicante *C. B:* 219.

[Ej sammanförda till en i Leufsta ex.]

73. SCORDIUM *C. B:* 247. Chamædrys palustris canescens s. Scordium officinarum *Tourn:* 205.

74. SATUREIA sativa *Tourn:* 197. Satureja *Riv: m. irr.* [I. tab: 44. f: 1]. Satureja hortensis s: Cunila sativa Plinij *C. B:* 218. Satureja annua Cunila dicta vulgaris *Moris:* III. p. 411. s. 11. t. 17. f. 1.

75. LAVANDULA angustifolia *C. B:* 216. *Tourn:* 198. Lavendula *Matth:* 29.

76. VERBENA communis, coeruleo flore *C. B:* 269. *Tourn:* 200. Verbena [Verbenaca] *Matth:* 667.

77. MAJORANA vulgaris *C. B:* 224. *Tourn:* 199. Majorana *Riv: m. irr.* [I. tab. 58. fig. 1]. Amaracus *Matth:* 487.

78. MELISSA hortensis *C. B:* 229. *Tourn:* 193. Melissa *Riv: mon. irr.* [I. tab. 45.]

79. HYSSOPUS officinarum, coerulea, spicata *C. B:* 217. *Tourn:* 200. *Riv: m. irr.* [I. tab. 68].

80. —— vulgaris alba *Tourn:* 201. *C. B:* 218.

81. —— rubro flore *Tourn:* 201. *C. B:* 217. Hæ tres tantum colore floris differunt.

[Ej sammanförda till en i Leufsta ex.]

82. BETONICA purpurea *C. B:* 235. *Tourn:* 203. Betonica *Riv: m. irr.* [I. tab. 28].

83. —— alba *C. B:* 235. *Tourn:* 203. Varietas antecedentis.

[Ej sammanförda till en i Leufsta ex.]

---

69. M. aqvatica L: *Spec. Pl.* I. 576, II. 805. **70.** Satureja mastichina L: *Spec. Pl.* I. 567, II. 827; H. 160. **71** och **72.** Thymus vulgaris *β* L: *Spec. Pl.* I. 591, II. 825; H. 160. **73.** Teucrium Scordium L: *Spec. Pl.* I. 565, II. 790. **74.** Satureja hortensis L: *Spec. Pl.* I. 568, II. 795; H. 161. **75.** Lavandula Spica L: *Spec. Pl.* I. 572, II. 800; H. 162. **76.** Verbena officinalis L: *Spec. Pl.* I. 20, II. 29. **77.** Origanum Majorana L: *Spec. Pl.* I. 590, II. 825; H. 161. **78.** Melissa officinalis L: *Spec. Pl.* I. 592, II. 827; H. 163. **79—81.** Hyssopus officinalis L: *Spec. Pl.* I. 569, II. 776; H. 162. **82—83.** Betonica officinalis L: *Spec. Pl.* I. 573, II. 810; H. 164.

84. ROSMARINUS hortensis, angustiore folio *Tourn:* 195. *C. B:* 217. Rosmarinus *Riv: m. irr.* [I. tab. 39]. Rosmarinum coronarium *Matth:* 524.

[Cl. V.] CRUCIFORMES.

85. THLASPIDUM foliis Iberidis *Rupp:* 259 [ed. I]. *Dill: N: pl: gen.* 123 [tab. VI]. Thlaspi creticum qvibusdam, flore rubente *Tourn:* 213. Thlaspi umbellatum, creticum, Iberidis folio *C. B:* 106. Thlaspi VI [IIII] *Matth:* 395. Draba s. Arabis aut Thlaspi Candiæ *Dod:* 701 [in ed. 1583, p. 713 in ed. 1616].

86. NASTURTIUM hortense vulgatum *C. B:* 103. *Tourn:* 213. Nasturtium *Matth:* 394.

87. NASTURTIUM hortense crispum *C. B:* 104. *Tourn:* 213. Folia multifida marginibus repandis. Varietas forte.

88. COCHLEARIA folio subrotundo *C. B:* 110. *Tourn:* 215. Cochlearia major batavica, subrotundo folio *Moris:* II. p. 308. s. 3. t. 2[20] f. 1. Cochlearia *Dod* 583 [in ed. 1583, p. 594 in ed. 1616].

89. ARMORACIA *Riv:* apud *Rupp:* 77 [ed. I]. Cochlearia folio cubitali *Tourn:* 215. Raphanus rusticanus *C. B:* 96. Raphanus rusticanus et vulgaris *Matth:* 333.

90. LEPIDIUM latifolium *C. B:* 97. *Tourn:* 216. Lepidium *Fuchs:* 484.

91. BRASSICA capitata alba *C. B:* III. *Tourn:* 219. Brassica capitata albida *Dod:* 612 [in ed. 1583, p. 623 ed. 1616]. Brassica capitata *Matth:* 345. Hwit Hufwud kåhl.

92. BRASSICA alba vel viridis *C. B:* 111. *Tourn:* 219. Brassica vulgaris sativa *Dod:* 610 [in ed. 1583, p. 621 in ed. 1616]. Hwit gemen kåhl.

93. BRASSICA cauliflora *C. B:* 111. *Tourn:* 219. *Dod:* 613 [in ed. 1583, p. 624 in ed. 1616].

94. HESPERIS montana, pallida, noctu olens *Volck:* 209. Hesperis montana, pallida, odoratissima *C. B:* 202. *Tourn:* 222. Flores ferruginei.

---

84. Rosmarinus officinalis *β* L: *Spec. Pl.* I. 23, II. 33; H. 11. **85.** Iberis umbellata L: *Spec. Pl.* I. 649, II. 906; H. 184. **86—87.** Lepidium sativum *α* et *β* L: *Spec. Pl.* I. 644, II. 899; H. 183. **88.** Cochlearia officinalis L: *Spec. Pl.* I. 647, II. 903. **89.** Cochlearia Armoracia L: *Spec. Pl.* I. 648, II. 904. **90.** Lepidium latifolium L: *Spec. Pl.* I. 644, II. 899. **91—93.** Brassica oleracea var. L: *Spec. Pl.* I. 667, II. 932; H. 189. **94.** Hesperis tristis L: *Spec. Pl.* I. 663, II. 927; H. 187. 1.

95. HESPERIS hortensis, flore purpureo *C. B:* 202. *Tourn:* 222. *Moris:* II. p. 251. s. 3. t. 10 f. 1.

96. HESPERIS hortensis, flore candido *C. B:* 202. *Tourn:* 222. Viola hiemalis flore albo II. *Tabern:* II. 25. Varietas antecedentis.

97. HESPERIS hortensis, flore pleno albo *Tourn:* 222. Antecedentis varietatis plenitudo.

98. KEIRI luteum vulgare *Rupp:* 70 [ed. I.]. Leucojum luteum vulgare *C. B:* 202. *Tourn:* 221. Leucojum aureum *Matth:* 575.

99. NAPUS sativa, radice alba *C. B:* 95. *Tourn:* 229. Napus *Matth:* 331. *Dod:* 663 [in ed. 1583, p. 674 in ed. 1616].

100. RAPHANUS major orbicularis vel rotundus *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Raphanus I. *Matth:* 332. Raphanis s: Radicula sativa *Dod:* 655 [in ed. 1583, p. 676 in ed. 1616]. Radix glabra, alba, terra tecta.

101. RAPHANUS major orbicularis vel rotundus, floribus candidis *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Velut in antecedenti flores purpurascunt, ita in hac candicant. Varietas prioris.

102. RAPHANUS niger *Tourn:* 229. *C. B:* 96. Radix terra tegitur, nigra, rugosa.

103. RAPHANUS minor, oblongus *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Raphanus II *Matth:* 332. Radicula sativa minor *Dod:* 665 [in ed. 1583, p. 676 in ed. 1616]. Dimidia pars radicis supra terram visibilis evadit.

[CL. VI.] ROSACEI.

104. RANUNCULUS echinatus, arvensis *C. B:* 179. *Tourn:* 289. *Moris:* II. p. 440. s. 4. t. 29. f. 23. Semina plana, maxime echinata.

105. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno *C. B:* 179. *Tourn:* 290 Ranunculus erectus, hortensis fl. pleno *Besl: vern.* Ord. I. fol. 13, fig. II. Caulis erectus.

106. RANUNCULUS dulcis, flore pleno *C. B:* 179. *Tourn:* 290. Caulis procumbens.

95—97. H. matronalis L: *Spec. Pl.* I. 663, II. 927; H. 188. 2. **98.** Cheiranthus Cheiri L: *Spec. Pl.* I. 661, II. 924; H. 187. 1. **99.** Brassica Napus β L: *Spec. Pl.* I. 666, II. 931; H. 190. **100—103.** Raphanus sativus α et β L: *Spec. Pl.* I. 669, II. 935; H. 188. **104.** Ranunculus arvensis L: *Spec. Pl.* I. 555, II. 780. **105.** R. acris β L: *Spec. Pl.* I. 554, II. 779. **106.** Ranunculus repens var. L: *Spec. Pl.* I. 554, II. 779.

107. HEPATICA flore pleno, coeruleo *Rupp:* 146 [ed. I. 1718]. Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno, coeruleo *Tourn:* 287. Trifolium hepaticum, flore pleno *C. B:* 330.

108. HEPATICA flore pleno, purpureo *Rupp:* 146 [ed. I]. Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno purpureo *Tourn:* 287. Varietates.

109. ADONIS hortensis, flore minore, atrorubente *C. B:* 178. Adonis *Dod:* 260. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli flore minore, atrorubente *Tourn:* 291. Petala 5.

110. ADONIS montanus, perennis, flore amplo, luteo *Rupp:* 144 [ed. I.]. Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore *Boerh:* I. 35 [*Ind. alt. pars.* I. 109]. Adonis præcox, perennis, flore luteo, caule plano *Moris:* III. p. 26. s. 6. t. 9. f. 1. Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice *Tourn:* 291. Helleborus niger tenuifolius, Buphthalmi flore *C. B:* 186. Helleborus Hippocratis *Tabern:* II. 398.

111. PENTAPHYLLOIDES rectum, fruticosum, eboracense *Moris:* II. 193. *Tourn:* 298.

112. FRAGARIA fructu parvi Pruni magnitudine *C. B:* 327. *Tourn:* 296. Fragaria fructu magno *Besl: vern.* 7. fol. 8.

113. CLEMATIS [CLEMATITIS] erecta *C. B:* 300. *Tourn:* 294. Clematis pannonica, flore coeruleo surrecto *J. B:* II. 129. Flammula pannonica erecta, folio Vincetoxici, flore amplo *Rupp:* 62 [ed. I.]. Folia integra, fl. coerulei.

114. CLEMATIS s: Flammula repens *C. B:* 300 *Tourn:* 293. Flammula *Rupp:* 61 [ed. I. 1718]. *Dod:* 400 [in ed. 1583]. Folia divisa, flores albi.

115. VITICELLA *Dill: Nov. pl. g.* 165. Clematitis purpurea repens *C. B:* 300. *Tourn:* 294. Clematis altera *Matth:* 617.

116. HYPECOON latiore folio *Tourn:* 230. Hypecoum *C. B:* 172. Hypecoon *Dod:* 446 [in ed 1583, p. 449 in ed. 1616]. Hypecoon siliqvis erectis, articulatis, incurvis *Moris:* II. p. 279. Cuminum sylvestre *Matth:* 506.

[Obs. till Cl. V. Cruciformes enl. Tournef.]

107—108. Anemone Hepatica var. L: *Spec. Pl.* I. 538, II. 758. **109.** Adonis annua *β* atrorubens L: *Spec. Pl.* I. 457, A. autumnalis II. 771. **110.** Adonis vernalis L: *Spec. Pl.* I. 457, II. 771; saknas i Hort. Ups. **111.** Potentilla fruticosa L: *Spec. Pl.* I. 495, II. 709; saknas i Hort. Ups. **112.** Fragaria vesca *β* sativa L: *Spec. Pl.* I. 495, *β* pratensis II. 709; H. 133. **113.** Clematis integrifolia L: *Spec. Pl.* I. 544, II. 767; H. 156. **114.** Clematis Flammula L: *Spec. Pl.* I. 544, II. 766. **115.** C. Viticella L: *Spec. Pl.* I. 543, II. 765. **116.** Hypecoum procumbens L: *Spec. Pl.* I. 124, II. 181; H. 31.

117. EPIMEDIUM *C. B:* 323. *Tourn:* 232. *Moris:* II. p. 196. s. 2. t. 20. f. 5.

[Obs. Cl. V. Cruciformes enl. Tournef.]

118. ONAGRA latifolia *Tourn:* 302. Lysimachia lutea, corniculata *C. B:* 245. et app. 516. Lysimachia lutea, corniculata, non papposa, virginiana, major *Moris:* II. 271.

119. CHAMÆNERION villosum, magno flore purpureo *Tourn:* 303. Epilobium hirsutum, magno flore et specioso *Dill:* 131. Lysimachia siliqvosa, hirsuta, major, fl. purpureo *C. B:* 245.

120. VERATRUM flore subviridi *Tourn:* 273. Helleborus albus, flore subviridi *C. B:* 186. *Moris:* III. p. 485, s. 12. t. 4. f. 1. Elleborum album *Matth:* 785.

121. PAPAVER hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio *C. B:* 170. *Tourn:* 237. Fl. albus.

122. PAPAVER flore pleno, album *Tourn:* 238.

123. PAPAVER hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio *C. B:* 170. *Tourn:* 237.

124. PAPAVER pleno flore, nigrum *C. B:* 171. *Tourn:* 238.

125. PAPAVER cristatum, floribus rubris, semine nigro *C. B:* 171. *Tourn:* 237. Hæ omnes 5 plantæ varietates tantum sunt. Planta glabra.

126. PAPAVER erraticum majus, ῥοίας Dioscoridi, Theophrasto et Plinio *C. B:* 171. *Tourn:* 238.

127. PAPAVER erraticum pleno flore *Tourn:* 238. Varietas antecedentis. Hæc differt a priori specie caule hirsutie stricta obsito.

128. GLAUCIUM flore luteo *Tourn:* 254. Papaver corniculatum, luteum *C. B:* 171. Papaver corniculatum majus *Dod:* 445 [in ed. 1583, p. 448 in ed. 1616].

129. RUTA hortensis latifolia *C. B:* 336. *Tourn:* 257. Ruta *Matth:* 493.

130. NIGELLA angustifolia, flore majori, simplici, coeruleo *C. B:* 145. *Tourn:* 258. Melanthium damascenum *Dod:* 301 [in ed. 1583, p. 304 in ed. 1616].

---

117. Epimedium alpinum L: *Spec. Pl.* I. 117, II. 171; H. 29. **118.** Oenothera biennis L: *Spec. Pl.* I. 346, II. 492; H. 94. **119.** Epilobium hirsutum L. *Spec. Pl.* I. 347, II. 494. **120.** Veratrum album L: *Spec. Pl.* I. 1044, II. 1479. **121—125.** Papaver somniferum L: *Spec. Pl.* I. 508, II. 726; H. 135. **126—127.** Papaver Rhoeas L: *Spec. Pl.* I. 507, II. 726; H. 136. **128.** Chelidonium Glaucium L: *Spec. Pl.* I. 506, II. 724; H. 137. **129.** Ruta graveolens γ L: *Spec. Pl.* I. 383, II. 548; H. 102. **130—131.** Nigella damascena α et β L: *Spec. Pl.* 534, II. 753; H. 153.

131. NIGELLA flore majori pleno, coeruleo *C. B:* 145. *Tourn:* 258. Plenitudo prioris.

132. HELLEBORUS niger, hortensis, flore viridi *C. B:* 185 *Tourn:* 272. Helleborus niger sylvestris, ramosus, latiore folio, [flore viridi] deciduo *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 5. Caulis ramosus multis floribus ornatus.

133. HELLEBORUS niger, tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo *Tourn:* 272. Helleboroides hyemalis *Boerh: Ind. pl.* pars prim. I. 297. Helleborus ranunculoides, præcox, tuberosus, fl. luteo *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Aconitum unifolium, luteum, bulbosum *C. B:* 183. Aconitum *Rupp:* 149 [ed. 1718]. Fl. singulari.

134. CHRISTOPHORIANA americana, racemosa, baccis niveis *Moris:* II. p. 8. s. 1. t. 2. f. 7. *Tourn:* 299.

135. PHYTOLACCA americana, majori fructu *Tourn:* 299. Solanum virginianum rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis canaliculatis *Moris:* III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 22.

136. PORTULACA latifolia s. sativa *C. B:* 288. *Tourn:* 236. Portulaca sativa *Dod:* 650 [in ed. 1583, p. 661 in ed. 1616].

137. ANACAMPSEROS radice Rosam spirante, major *Tourn:* 264. Rhodia radix *C. B:* 286. Telephium luteum, minus, radice Rosam redolente *Moris:* III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8.

138. OPUNTIA vulgo herbariorum *Tourn:* 239. Ficus indica folio spinoso, fructu majore *C. B:* 458. Ficus indica *Matth:* 211.

139. GRANADILLA triphylla, flore roseo, clavato *Volck:* 199. Granadilla hispanis, flos passionis italis *Tourn:* 240. Passiflora foliis crenatis, tripartito divisis *Pluk: alm.* 281. Clematitis trifolia, flore roseo, clavato C. *B:* 301.

140. AMARANTHUS maximus, semine rubello, qui granis rubris Petri Ciecæ *C. B:* 121. *Tourn:* 235. Blitum paniculis propendentibus, semine rubro *Volck:* 66.

---

132. Helleborus viridis L: *Spec. Pl.* I. 558, II. 784; H. 158. **133.** H. hyemalis L: *Spec. Pl.* I. 557, II. 783; H. 158. **134.** Actæa spicata *β* alba L: *Spec. Pl.* I. 504, II. 722; H. 138. **135.** Phytolacca americana L: *Spec. Pl.* I. 441, Ph. decandra II. 631; H. 117. **136.** Portulaca oleracea *β* L: *Spec. Pl.* I. 455, II. 638; H. 146. **137.** Rhodiola rosea L: *Spec. Pl.* I. 1035, II. 1465. **138.** Cactus Opuntia L: *Spec. Pl.* I. 468, II. 669; H. 120. **139.** Passiflora incarnata L: *Spec. Pl.* I. 959, II. 1360; H. 278. **140.** Amaranthus caudatus L: *Spec. Pl.* I. 990, II. 1406; H. 285.

141. GERANIUM Cicutæ folio, moschatum *C. B:* 319. *Tourn:* 268. *Rupp.* 272. Geranium supinum *Dod:* 63. Pediculus flores plurimos sustentat.



142. GERANIUM folio Altheæ *C. B:* 318. *Tourn:* 268. Geranium VI. *Matth:* 568. Folia integra fere.

143. GERANIUM batrachiodes [batrachioides], flore variegato *C. B:* 318. *Tourn:* 267. Geranium anglicum variegatum *Besl: vern.* ord. I. fig. 9. Folia angulata, ad petiolum varie multifida, flores in uno petiolo solitarii, rarius duo.

144. GERANIUM phæum s. fuscum, petalis reflexis [rectis] s: planis *Moris:* II. p. 515. *Tourn:* 267. Geranium montanum, fuscum *C. B:* 318. Gruinalis montana, petalis nigro fuscis et obscuris planioribus *Rupp:* 117. Floris petala reflexa, in medio floris macula nigra. Radix annua.

[Cl. VII.] UMBELLATI.

145. ANETHUM hortense *C. B:* 147. *Tourn:* 318. Anethum *Dod:* 296 [in ed. 1583, p. 298 in ed. 1616].

146. FOENICULUM vulgare germanicum *C. B:* 147. *Tourn:* 311. Foeniculum *Dod:* 295 [in ed. 1583, p. 297 in ed. 1616]. *Matth:* 517.

147. MEUM foliis Anethi *C. B:* 248. *Tourn:* 312. Meum *Dod:* 302 [in ed. 1583, p. 305 in ed. 1616]. Meum vulgare tenuifolium *Moris:* III. 270.

148. PEUCEDANUM germanicum *C. B:* 149. Pevcedanum majus brevioribus foliis germanicum *Moris:* III. p. 312. s. 9. t. 15. f. 2.

---

141. Geranium cicutarium β moschatum L: *Spec. Pl.* I. 680, G. moschatum II. 951. **142.** G. malacoides L: *Spec. Pt.* I. 680, II. 952; H. 198. **143.** Geranium pratense var. L: *Spec. Pl.* I. 681, II. 954. **144.** G. phæum L: *Spec. Pl.* I. 681, II. 953; H. 198. **145.** Anethum graveolens L. *Spec. Pl.* I, 263, II. 377; H. 66. **146.** Anethum Foeniculum L: *Spec. Pl.* I. 263, II. 377; H. 66. **147.** Athamantha Meum L: *Spec. Pl.* I. 245, II. 353; H. 60. **148.** Peucedanum officinale α L: *Spec. Pl.* I. 245, II. 353; H. 60.

149. ODORATA *Riv: p. irr:* [III. tab. 290]. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata *C. B:* 160. *Tourn:* 315. Myrrhis perennis alba odorata *Moris:* III. p. 301. s. 9. t. 10. f. 1.

150. PASTINACA sativa, latifolia *C. B:* 155. *Tourn:* 319. Pastinaca domestica *Matth:* 500. Pastinaca latifolia sativa *Dod:* 669 [in ed. 1583, p. 680 in ed. 1616].

151. IMPERATORIA *Riv: p. irr.* [tab. 241]. Imperatoria major *C. B:* 156. *Tourn:* 317. Imperatoria *Matth:* 516.

152. ANGELICA sativa *C. B:* 155. *Matth:* 729. Imperatoria sativa *Tourn:* 317.

153. LEVISTICUM *Riv: p. irr.* [III. tab. 293]. Levisticum vulgare *Dod:* 309 [in ed. 1583, p. 311 in ed. 1616]. Ligusticum vulgare: an Libanotis fertilis Theophrasti? *C. B:* 157. Angelica montana, perennis, Paludapii folio *Tourn:* 313.

154. CICUTARIA latifolia, foetida *C. B:* 161. *Tourn:* 322. Cicuta latifolia, foetidissima *Moris:* III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Cicutaria foetida *Tabern:* II. 465.

155. PIMPINELLA saxifraga major *C. B:* 159. Tragoselinum majus *Tourn:* 309.

156. CHÆROPHYLLUM sativum *C. B:* 152. *Tourn:* 314. Chærophyllum *Dod:* 688 [in ed. 1583, p. 700 in ed. 1616]. Cerefolium *Riv: p. irr.* [III. p. 276].

157. ASTRANTIA major, corona floris purpurascente *Tourn:* 314. Astrantia nigra major *Moris:* III. p. 279. s. 9. t. 4 f. 1. Helleborus niger Saniculæ folio major *C. B:* 186. Veratrum nigrum Dioscoridis *Dod:* Pempt. 381 [in ed. 1583, p. 377 in ed. 1616]. Floret Junio.

[Ej upptagen i Leufsta ex.]

158. SISARUM Germanorum *C. B:* 155. *Tourn:* 309. Sisarum *Riv: p. irr.* [III. tab. 289]. Siser *Matth:* 334.

159. DAUCUS sativus, radice lutea *Tourn:* 307. Staphylinus sativus *Riv: p. irr.* [III. tab. 262]. Pastinaca tenuifolia, sativa *C. B:* 151. *Dod:* 667 [in ed. 1583, p. 678 in ed. 1616].

---

149. Scandix odorata L: *Spec. Pl.* I. 256, II. 368; H. 64. **150.** Pastinaca sativa β L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 378. **151.** Imperatoria Ostruthium L: *Spec. Pl.* I. 259, II. 371; H. 65. **152.** Angelica Archangelica L: *Spec. Pl.* I. 250, II. 360. **153.** Ligusticum Levisticum L: *Spec. Pl.* I. 250, II. 359; H. 62. **154.** Ligusticum peloponnesiacum L: *Spec. Pl.* I. 250, II. 360; H. 62. **155.** Pimpinella Saxifraga γ & δ major L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 378; Jfr Hort. Cliff. p. 107. **156.** Scandix Cerefolium L: *Spec. Pl.* I. 357, II. 368. **157.** Astrantia major L: *Spec. Pl.* I. 235, II. 379; jfr Hort. Cliff. 88. **158.** Sium Sisarum L: *Spec. Pl.* I. 251, II. 361; H. 62. **159.** Daucus Carota β L: *Spec. Pl.* I. 242, II. 348; H. 50.

160. CORIANDRUM majus *C. B:* 158. *Tourn:* 316. Coriandrum *Riv: pent. irr.* [III. tab. 303—305].

161. APIUM dulce, Celeri Italorum *Tourn:* 305. Apium palustre et Apium officinarum *C. B:* 154. *Tourn:* 305. Apium *Riv: p. irr.* [III. tab. 314—317]. Eleoselinum *Dod:* 683 [in ed. 1583, p. 695 in ed. 1616]. Celeri.

162. APIUM hortense, s. Petroselinum vulgo *C. B:* 153. *Tourn:* 305. Apium hortense *Dod:* 682 [in ed. 1583, p. 694 in ed. 1616]. *Matth:* 511. Persilia, grönpersilia.

163. APIUM vel Petroselinum crispum *C. B:* 153. *Tourn:* 305. Apium crispum *Riv: p. irr.* [III. tab. 317]. *Tabern:* I. 252. A priori marginibus foliorum crispis differt.

[Cl. VIII.] CARYOPHYLLÆI.

164. TUNICA latifolia, floribus umbellatis *Rupp:* 106. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, ruber *C. B:* 208. *Tourn:* 332. Caryophyllus carthusianorum *Tabern:* II. 3. Fl. purpureo.

165. TUNICA. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, albus *Tourn:* 332.

166. TUNICA. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, diversicolor *Tourn:* 332. Varietates.

Flores in capitulum æqvale congesti, qvorum sqvamæ calycum in setas desinunt longitudine cum petalis æqvales.

167. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo, major *C. B:* 203. *Tourn:* 334. Lychnis calcedonica *Tabern:* II. 9. Calyx cylindraceus, hirsutus, ut et tota planta.

168. LYCHNIS sylvestris, qvæ Saponaria vulgo *Tourn:* 336. Saponaria major, lævis *C. B:* 206. Saponaria vulgaris simplex *Moris:* II. p. 547. s. 5. t. 22. f. 52. Styli duo.

169. LYCHNIS Coronaria Dioscoridis sativa, flore rubro et veluti flammeo fulgente *C. B:* 203. *Tourn:* 334. Lychnis Coronaria sativa, flore rubro *Moris:* II. p. 540. *Dod:* 170.

---

160. Coriandrum sativum L: *Spec. Pl.* I. 256, II. 367; H. 63. **161.** Apium graveolens L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 379; H. 67. **162.** A. Petroselinum L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 379; H. 67. **163.** A. Petroselinum β L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 379: H. 67. **164—166.** Dianthus barbatus L: *Spec. Pl.* I. 409, II. 586; H. 105. 6. **167.** Lychnis chalcedonica L: *Spec. Pl.* I. 436, II. 625; H. 115. **168.** Saponaria officinalis L: *Spec. Pl.* I. 408, II. 584; H. 106. **169—170.** Agrostemma Coronaria L: *Spec. Pl.* I. 436, II. 625; H. 115.

170. LYCHNIS Coronaria Dioscoridis sativa, flore dilute rubente *C. B:* 203. *Tourn:* 334. Varietas antecedentis. Calycis laciniæ longitudine cum petalis æqvales evadunt.

171. LYCHNIS purpurea, multiplex *C. B:* 204. *Tourn:* 335. Calyx globosus et inflatus.

172. LYCHNIS viscosa [purpurea], latifolia, lævis *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Armerius flos qvartus *Dod:* 176. Viscaria sativa *Tabern:* II. 14. Fructus 3-locularis, planta annua.

173. LYCHNIS frutescens, myrtifolia, Behen albo similis *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Ocimoides fruticosum *Camer: H. M.* p. 109. fig. XXXIII. Trilocularis, perennis.

174. CUCUBALUS *Tourn:* 339. Alsine scandens, baccifera *C. B:* 250. Cucubalus quibusdam, vel Alsine baccifera *J. B:* II. 175.

175. LINUM sativum *C. B:* 214. *Tourn:* 339.

[Cl. IX.] LILIACEI.

176. LILIUM album vulgare *Tourn:* 369. Lilium album, flore erecto et vulgare *C. B:* 76. Lilium *Matth:* 547.

177. LILIUM purpureo-croceum, majus *Tourn:* 369. *C. B:* 76. Lilium purpureum tertium *Dod:* 199. Lilium cruentum bulbiferum *Besl: vern.* 5. f. 7. Bulbi in alis foliorum.

178. MARTAGON sylvaticum *Rupp:* 118 [ed. II. 1726]. Lilium floribus reflexis montanum, flore rubente *C. B:* 77. *Tourn:* 370. Lilium flore nutante ferrugineo, majus vel minus *J. B:* II. 692.

179. MARTAGON. Lilium floribus reflexis montanum, flore albicante *Tourn:* 370. *C. B:* 77. Varietas antecedentis.

180. CORONA imperialis *Tourn:* 372. *Dod:* 202. Lilium s. Corona imperialis *C. B:* 79.

181. FRITILLARIA præcox, purpurea, variegata *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Meleagris *Dod:* 233.

---

171. ?Lychnis dioica L: *Spec. Pl.* I. 437, II. 626; Cucubalus Hort. Cliff. 171. 5 var. **172.** Silene Armeria L: *Spec. Pl.* I. 420, II. 601; H. 110. **173.** S. fruticosa L: *Spec. Pl.* I. 417, II. 597; H. 111. **174.** Cucubalus baccifera L: *Spec. Pl.* I. 414, II. 591; H. 109. **175.** Linum usitatissimum L. *Spec. Pl.* I. 277, II. 397; H. 71. **176.** Lilium candidum L: *Spec. Pl.* I. 302, II. 433; H. 80. 1. **177.** L. bulbiferum L: *Spec. Pl.* I. 302, II. 433; H. 80. 2. **178—179.** L. Martagon L: *Spec. Pl.* I. 303, II. 435; H. 81. 4. **180.** Fritillaria imperialis L: *Spec. Pl.* I. 303, II. 435; H. 81. 1. **181—184.** F. Meleagris L: *Spec. Pl.* I. 304, II. 436; H. 81. 1.

182. FRITILLARIA alba, variegata *C. B:* 64. *Tourn:* 377.

183. FRITILLARIA alba, præcox *C. B:* 64. *Tourn:* 377.

184. FRITILLARIA polyanthos, flavo-viridis *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Flores 4, 5 à 6 in eodem caule.

185. TULIPA lutea lituris qvibusdam viridibus et sanguineis distincta, flore maximo laciniato *Tourn:* 376. Petala laciniata.

186. LEUCOJUM bulbosum, vulgare *C. B:* 55. Leucoion bulbosum hexaphyllon *Dod:* 230. Narcisso-Leucojum vulgare *Tourn:* 387. Narcissus VII *Matth:* 770. Petala æqvalia.

187. LEUCOJUM bulbosum, trifolium, minus *C. B:* 56. Leucoion bulbosum triphyllon *Dod:* 230. Narcisso-Leucojum trifolium minus *Tourn:* 387. Petala alterna dissimilia.

[Ej i Leufsta ex.]

188. NARCISSUS albus, circulo purpureo *C. B:* 48. *Tourn:* 353. Narcissus medio purpureus *Dod:* 223. Corolla petalis brevior, monanthos.

189. NARCISSUS totus niveus, multiplex *C. B:* 54. *Tourn:* 357. Narcissus albus pleno flore *Svert:* I. tab: 26. f. 5. Plenitudo antecedentis.

190. NARCISSUS medio luteus, copioso flore, odore gravi *C. B:* 50. *Tourn:* 354. Narcissus medio luteus alter *Dod:* 224. Polyanthos.

191. NARCISSUS sylvestris, pallidus, calyce luteo *C. B:* 52. *Tourn:* 356. Narcissus luteus sylvestris *Dod:* 227. Pseudo-Narcissus luteus simplici et gemino flore *Tabern:* II. 311. Corolla petalis æqvalis, monanthos.

192. NARCISSUS multiplex, totus flavus *C. B:* 54. *Tourn:* 357. Plenitudo antecedentis.

193. COLCHICUM commune *C. B:* 67. *Tourn:* 348.

194. CROCUS sativus *C. B:* 65. *Tourn:* 350. Autumno flores coeruleos profert.

195. CROCUS vernus, angustifolius, magno flore violaceo *C. B:* 67. *Tourn:* 352. Fl. coerul.

---

185. Tulipa gesneriana L: *Spec. Pl.* I. 306, II. 438; H. 82. **186.** Leucojum vernum L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 414; H. 74. **187.** Galanthus nivalis L: *Spec. Pl.* I. 288, II. 413. **188.** Narcissus poëticus L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 414; H. 74. 1. *α*. **189.**? N. poeticus L: var. **190.** N. Tazetta L: *Spec. Pl.* I. 290, II. 416; H. 74. 3. **191.** N. Pseudo-Narcissus L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 414; H. 74. 2. **192.**? N. Pseudo-Narcissus L: var. **193.** Colchicum autumnale L: *Spec. Pl.* I. 341, II. 485; H. 90. **194.** Crocus sativus *α* officinalis L: *Spec. Pl.* I. 36. II. 50; H. 15. **195—197.** C. sativus *β* vernus L: *Spec. Pl,* I 36, II. 50; H. 15.

196. CROCUS vernus, angustifolius, magno flore candido *C. B:* 67. *Tourn:* 352.

197. CROCUS vernus, angustifolius, variegatus *C. B:* 67. *Tourn:* 353. Color floris albus, lineis purpureis pictus.

Hi tres Croci posteriores tantum varietates sunt. A primo tempore florendi maxime differunt, qvoad totum habitum alias cum autumnali conveniunt, hinc tantum varietates ejus erint.

198. YUCA foliis Aloës *Dill: n: pl: g:* p. 111. tab. V. *C. B:* 91. *Moris:* II. p. 415. s. 4. t. 22. f. 1.

199. ALOË folio in oblongum aculeum obeunte *C. B:* 286. *Tourn:* 366. *Moris:* II. p. 415. s. 4. t. 22. f. 2 & 3. Aloë ex America *Dod:* 355 [p. 359 in ed. 1616]. Aloë spuria s: Metl: Americanorum *Rupp:* 364 [ed. I. 1718]. Folia in aculeos rigidos et acutissimos desinunt.

200. ALOË vulgaris *C. B:* 286. *Tourn:* 366. Aloë *Matth:* 463. *Dod:* 355 [in ed. 1583, p. 359 in ed. 1616]. Folia ad margines ubiqve aculeis minus acutis instruuntur.

201. ALOË africana margaritifera minor *Rupp:* 261 [ed. I.], 201 [ed. II.], 248 [ed. III]. Folia Sedi s: Sempervivi simillima, hinc illinc verrucis glabris, margaritis similibus, ornata.

202. IRIS vulgaris germanica, s: sylvestris *C. B:* 30. Iris vulgaris violacea s: purpurea [hortensis et] sylvestris *J. B:* II. 709. Folia erecta, ensiformia.

203. IRIS lutea sativa *C. B:* 32. Flores ex luteo et coeruleo eleganter picti. Caulis humilis.

204. IRIS bulbosa tota violacea vel coerulea *Chabr:* 239. Flores maximi, pallidi, coerulei; caulis cubitalis.

205. IRIS graminea, cui pereunt qvotannis folia, flore variegato *Chabr:* 243. Folia graminea, erecta.

206. IRIS pratensis angustifolia humilior *C. B:* 32. Folia graminea, procumbentia.

207. GLADIOLUS floribus uno versu dispositis major et procerior *C. B:* 41. *Tourn:* 365. Gladiolus *Riv: m. irr.* [I. tab. 110].

---

198. Yucca gloriosa L: *Spec. Pl.* I. 319, II. 456; H. 88. 1. **199.** Agave americana L: *Spec. Pl.* I. 323, II. 461; H. 87. **200.** Aloë vera L: *Spec. Pl.* I. 320, A. perfoliata π vera *Spec. Pl.* II. 458; H. 86. 3. **201.** A. pumila β L: *Spec. Pl.* I. 322, II. 460. **202.** Iris germanica L: *Spec. Pl.* I. 38, II. 55; H. 16. 1. **203.** I. variegata L: *Spec. Pl.* I, 38, II. 56; H. 16. 2. **204.**? I. Xiphium β L: *Spec. Pl.* I. 40. II. 58; H. 17. 7. **205.** I. graminea L: *Spec. Pl.* I. 39, II. 58; H. 17. 6. **206.**? I. sibirica L: var. vel? I. spuria L: *Spec. Pl.* I. 39, II. 58; H. 17. 5. **207.** Gladiolus communis L: *Spec. Pl.* I. 36, II. 52; H. 16.

208. CANNACORUS latifolius vulgaris *Tourn:* 367. Arundo indica latifolia *C. B:* 19.

209. TRADESCANTIA s. Ephemerum virginianum flore coeruleo minori *Tourn:* 368. Allium s: Moly virginianum *C. B:* 516.

210. LILIO-ASPHODELUS phoeniceus *Tourn:* 344. Lilium rubrum, Asphodeli radice *C. B:* 80. Asphodelus liliaceus rubens [II] *Tabern:* II. 436. Flores rubicundi, caulis altior.

211. LILIO-ASPHODELUS luteus *Tourn:* 344. Liliasphodelus luteus *Svert:* I. tab: 47. Lilium luteum, Asphodeli radice *C. B:* 80. Asphodelus liliaceus luteus I. *Tabern:* II. 436. Fl. lutei sed distincta species, qvamqvam admodum seqventi similis.

212. HYACINTHUS orientalis caule maculato *C. B:* 44. *Tourn:* 345. Hyacinthus orientalis *Matth:* 669.

213. MUSCARI obsoletiore flore *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus, moschatus *C. B:* 43. Bulbus vomitorius *Matth:* 415. Flores ovati.

214. MUSCARI arvense, juncifolium, coeruleum minus *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus, coeruleus, minor, juncifolius *C. B:* 43. Hyacinthus racemosus *Dod:* 217. Hyacinthus coeruleus VI. *Tabern:* II. 320. Flores globosi.

215. ORNITHOGALUM spicatum, flore viridi lactescente *C. B:* 70. *Tourn:* 379. Flores in caule sparsi.

216. ORNITHOGALUM umbellatum, medium, angustifolium *C. B:* 70. *Tourn:* 378.

Flores in umbellam congesti.

217. STELLARIS. Ornithogalum coeruleum byzantinum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, coeruleus, amoenus *C. B:* 46.

Flores sparsi in caulem homomalli.

218. STELLARIS *Dill: n. pl. g.* p. 110. Ornithogalum spicatum cinereum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, spicatus, cinereus *C. B:* 46. Flores in spicam congesti.

[Ej uppt. i Leufsta ex.]

---

208. Canna indica L: *Spec. Pl.* I. 1, II. 1; H. 1. 1. **209.** Tradescantia virgineana L: *Spec. Pl.* I. 288, II. 411; H. 73. **210.** Hemerocallis Lilio. Asphodelus β fulvus L: *Spec. Pl.* I. 324, Hemerocallis fulva II. 462; H. 88. 1. α. **211.** H. Lilio-Asphodelus α flavus L: *Spec. Pl.* I. 324, Hemerocallis flava II. 462; H. 88. 1. β. **212.** Hyacinthus orientalis L: *Spec. Pl.* I. 317, II. 454; H. 85. 1. **213.** H. Muscari L: *Spec. Pl.* I. 317, II. 454; H. 85. 3. **214.** H. racemosus L: *Spec. Pl.* I. 318, II. 455. **215.**? Ornithogalum comosum L: *Amoen. Acad.* vol. IV. p. 312, *Spec, Pl.* II. 440. Jfr. O. pyrenaicum L: *Spec. Pl.* I. 306, II. 440; *It. Scan.* p. 220. **216.** O. umbellatum L: *Spec. Pl.* I. 307, II. 441; H. 84. 2. **217.** Scilla amoena L: *Spec. Pl.* I. 309, II. 443. **218.**? S. italica L: *Spec. Pl.* I. 308, II. 442.

219. PHALANGIUM flore majore s: minus ramosum *Rupp:* 142 [ed. I]. Phalangium aliud pulchrius, emaculato Lilii candore conspicuum *Chabr:* 222.

220. MOLY alpinum caule maculato *Rupp:* 138 [ed. 1718]. Victorialis longa *Besl: vern.* 4. f: 13. Allium alpinum. Victorialis mas *Tabern:* II. 195. Allium montanum, latifolium, maculatum *C. B:* 74.

221 MOLY latifolium, luteum, odore Allii I. *C. B:* 75. *Moris:* II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 4. Moly flavo flore *Svert:* I. t. 60. f. 2. Allium latifolium luteum *Tourn:* 384. Flores in umbellam congesti.

222. ALLIUM sativum *C. B:* 73. *Tourn:* 383. Radix multifida.

223. ALLIUM sativum alterum: s. Allioprasum caulis summo circumvoluto *C. B:* 73. *Tourn:* 383. *Moris:* II. p. 387. s. 4. t. 15. f. 10. Råckenbåll. Radix integra.

225. PORRUM commune, capitatum *Tourn:* 382. Porrum commune *Matth:* 386. Porrum *Tabern:* II. 192.

225. CEPA vulgaris floribus et tunicis purpurascentibus *Tourn:* 382. *C. B:* 71.

226. CEPA vulgaris floribus et tunicis candidis *C. B:* 71. *Tourn:* 281. Varietas. Ambo nomine Rödlök venduntur.

227. CEPA ascalonica *Matth:* 389. *Tourn:* 382. Cepa sterilis *C. B:* 72. Eschalottes. Flores nostris in oris nunqvam profert.

228. CEPA sectilis, juncifolia, perennis *Tourn:* 283. Porrum sectivum, juncifolium *C. B:* 72. Gräslök.

229. CEPA oblonga *C. B:* 371. *Dod:* 675 [in ed. 1583, p. 687 in ed. 1616]. *Tourn:* 382. Piplök. Johannislök. Folia concava, rotunda, crassitie digiti minimi.

[Cl. X.] PAPILIONACEI.

230. FABA rotunda, oblonga, s. cylindracea minor, s. eqvina, alba *Tourn:* 392. Faba minor s: eqvina *C. B:* 338. Gemena Bönor.

---

219. Anthericum Liliago L: *Spec. Pl.* I. 310, II. 445; H. 83. 4. Jfr. Ruppii Flora Jenensis ed. III. (1745) p. 150. **220.** Allium Victorialis L: *Spec. Pl.* I. 295, II. 424. **221.** A. Moly L: *Spec. Pl.* I. 301, II, 432; H. 76. 1. **222.** A. sativum L: *Spec. Pl.* I. 296, II. 425; H. 76. 2. **223.** A. Scorodoprasum *β* L: *Spec. Pl.* I. 297, II. 425; H. 77. **224.** A. Porrum L: *Spec. Pl.* I. 295, II. 423; H. 77. 4. **225—226.** A. Cepa L: *Spec. Pl.* I. 300, II. 431; H. 77. 3. **227.** A. ascalonicum L: *Amoen. Acad.* Vol. VI. p. 454, *Spec. Pl.* II. 429; H. 79. 9. **228.** A. Schoenoprasum L: *Spec. Pl.* I. 301, II. 432; H. 79. 8 *β*. **229.** A. fistulosum L: *Spec. Pl.* I. 301, II. 432; H. 78. 7. **230—233.** Vicia Faba L: *Spec, Pl.* I. 137, II. 1039; H. 218.

231. FABA rotunda, oblonga, s. cylindracea minor, s. eqvina, nigra *Tourn:* 292. Varietas prioris seminibus nigris.

232. FABA flore candido, lituris nigris conspicuo *C. B:* 338. *Tourn:* 391. Faba *Riv: tetr. irr.* II. tab. 148. A prima magnitudine duppla differt. Wälska bönor.

233. FABA fructu ex purpura nigrescente *C. B:* 338. *Tourn:* 292. Seminibus nigris a priori differt.

234. FOENU græcum sativum *C. B:* 348. *Tourn:* 409. Foeno græcum *Matth:* 317. Fol.

235. LUPINUS sativus, flore albo *C. B:* 317. *Tourn:* 392. Lupinus flore albo *Riv: tetr. irr.* II. tab. 150. Lupinus *Matth:* 328.

236. LUPINUS angustifolius, coeruleus, elatior *Tourn:* 392.

237. LUPINUS sylvestris, flore luteo *C. B:* 348. *Tourn:* 392. Lupinus flore luteo *Riv: tetr. irr.* II. tab. 151. Varietates tres fl. colore variantes.

238. PHASEOLUS vulgaris *Tourn:* 412. Phaseolus *Riv: tetr. irr.* II. tab. 155. Smilax hortensis, s. Phaseolus major *C. B:* 239. Semina alba.

239. PHASEOLUS vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituris distincto *Tourn:* 412. Semina alba nigris lituris picta.

240. PHASEOLUS vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato. *Tourn:* 412. Semina purpurea venis nigris ornata. Hæ tres caule scandente a reliqvis differunt.

241. PHASEOLUS puniceo flore *Tourn:* 414. Phaseolus indicus fl. coccineo sive puniceo *Moris:* II p. 69. s. 2. t. 5. f. 4.

Caulis vix cubitalis, erectus.

242. PISUM cortice eduli *Tourn:* 394. Pisa sine cortice duriore *C. B:* 343. Pisa leptoloba, qvæ simul cum folliculis comeduntur *Camerar. Volck:* 333. Siliqvæ destituuntur membrana interiori cartilaginea.

243. PISUM hortense, siliqva maxima *Tourn:* 394. Siliqvæ maximæ, planæ.

---

234. Trigonella Foenum græcum L: *Spec. Pl.* I. 777, II. 1095; H. 229. **235.** Lupinus albus L: *Spec. Pl.* I, 721, II. 1015; H. 209. **236.** L. angustifolius L: *Spec. Pl.* I. 721. II. 1015. **237.** L. luteus L: *Spec. Pl.* I. 722, II. 1015; H. 209. **238—240.** Phaseolus vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 723, II. 1016; H. 213. **241.** Ph. coccineus L: *Spec. Pl.* I. 774, Ph. vulgaris β coccineus II. 1016. **242—247.** Pisum sativum L: *Spec. Pl.* I. 727, II, 1026; H 215.

244. PISUM hortense, fructu nigra linea maculato *Tourn:* 394. Sub fructu intelliguntur semina.

245. PISUM hortense majus, flore fructuqve: [semina]: variegato *C. B:* 342. *Tourn:* 394.

246. PISUM arvense, fructu viridi *C. B:* 343. *Tourn:* 394. Gröna ärter.

247. PISUM arvense, fructu albo *C. B:* 243. *Tourn:* 394. Siliqvæ in his duobus posterioribus cylindraceæ, in antecedentibus planæ.

248. LATHYRUS arvensis, repens, tuberosus *C. B:* 344. *Tourn:* 395. Lathyrus arvensis *Riv: tetr. irr.* II. tab. 167. Lathyrus arvensis, radice tuberosa repente *Moris:* II. p. 51. S. 2. t. 2. f. 1. Pseudoapios *Matth:* 785. Radix perennis, folio rotundo.

249. LATHYRUS siculus *Riv: tetr. irr.* II. 170; p. 251 (1718). *Rupp:* 25. Radix annua, folia rotunda. Odor floris moschatus.

250. LATHYRUS angustissimo folio, americanus, variegatus *C. B:* 344. *Tourn:* 395. Folia angustissima, acuta. Flos eleganter variegatus ex albo, nigro et purpureo.

251. CLYMENUM hispanicum, flore vario, siliqva plena *Tourn:* 396.

252. LOTUS tetragonolobos, flore rubro *Riv: tetr: irr:* II. tab. 205. Lotus ruber, siliqva angulosa *C. B:* 332. *Tourn:* 403. Lotus siliqvosa flore fusco tetragonolobus *J. B:* 358.

253. MELILOTUS officinarum Germaniæ flore albo *Tourn:* 407. *C. B:* 331. Melilotus siliculis pendentibus, curtis, candida, major *Moris:* II. s. 2. t. 16. f. 1. Flores in spicam laxam oblongam congesti.

254. MELILOTUS major, odorata, violacea *Moris:* II. p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. *Tourn:* 407. Melilotus cœrulea *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 134]. Lotus hortensis odora *C. B:* 331. Flores in capitulum arcte congesti.

255. ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris, s. sylvestris *Moris:* II. p. 107. *Tourn:* 416. Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo pallescentibus *C. B:* 352.

---

248. Lathyrus tuberosus L: *Spec. Pl.* I. 732, II. 1033; H. 216. **249.**? L. odoratus α siculus L: *Spec. Pl.* I. 732, II. 1032. **250.** L. articulatus L: *Spec. Pl.* I. 731, II. 1031; H. 217. **251.** Lathyrus Clymenum L: *Spec. Pl.* I. 732, II. 1032; H. 217. **252.** Lotus tetragonolobus L: *Spec. Pl.* I. 773, II. 1089; H. 220. **253.** Trifolium Melilotus officinalis L: *Spec. Pl.* I. 765, II. 1078; H. 223. **254.** T. Melilotus coerulea L: *Spec. Pl.* I. 764, II. 1077; H. 223. **255.** Astragalus glycyphyllos L: *Spec. Pl.* I. 758, II. 1067.

[Cl. XI.] ANOMALI.

256. VIOLA martia, purpurea, flore simplici odoro *C. B:* 199. *Tourn:* 419. Planta humifusa, rotundifolia.

257. VIOLA martia, multiplici flore coeruleo *C. B:* 199. *Tourn:* 419. Plenitudo antecedentis.

258. VIOLA tricolor, hortensis, repens, an φλὸξ καὶ φλόγιον Theophrasti *C. B:* 199. *Tourn:* 420. Planta ramis erectis et procumbentibus, foliis oblongis.

259. FUMARIA bulbosa, radice solida, calcari ex folio cristato *J. B:* II. [III. B. 205]. Fumaria bulbosa, radice non cava, major *C. B:* 144. *Tourn:* 422. Ligulæ foliaceæ, floribus intermixtæ, laciniatæ sunt.

260. BALSAMINA fœmina *C. B:* 306. *Tourn:* 418. *Tabern:* II. 541.

261. ACONITUM Lycoctonum, albis pallidisue floribus *C. B:* 183. Aconitum VI. Matthioli *Tabern:* II. 292. Galea cylindracea.

262. ACONITUM coeruleum s. Napellus 1 *C. B:* 183. *Tourn:* 425. *Moris:* III. p: 463. s. 12. t. 3. f. 9. Napellus flore cœruleo *Rupp:* 276. [ed. I].

263. ACONITUM s. Napellus I, flore ex coeruleo et albo variegato *C. B:* 183. *Tourn:* 425. Varietas prioris.

264. ACONITUM flore luteo *Heuch:* 48. Aconitum salutiferum s. Anthora *C. B:* 184. *Tourn:* 425. Napellus fl. luteo *Rupp:* 275 [ed. I. 718]. Flore luteo a reliqvis abunde dignoscitur.

265. RESEDA foliis Calcitrapæ flore albo *Tourn:* 423.

266. LUTEOLA *Dill:* 92. Luteola herba Salicis folio *C. B:* 100. *Tourn:* 423.

267. CARDAMINDUM ampliore folio et majore flore *Tourn:* 430. Cardamindum majus *Riv: pent.* tab. 324.

256—257. Viola odorata L: *Spec. Pl.* I. 934, II. 1324; H. 276. **258.** Viola tricolor *β* L: *Spec. Pl.* I. 936, II. 1326; H. 276. **259.** Fumaria bulbosa *γ* solida L: *Spec. Pl.* I. 699, II. 983. **260.** Impatiens Balsamina L: *Spec. Pl.* I. 938, II. 1328; H. 276. **261.** Aconitum Lycoctonum L: *Spec. Pl.* I. 532, II. 750. **262—263.** A. Napellus L: *Spec. Pl.* I. 532, II. 751. **264.** A. Anthora L: *Spec. Pl.* I. 532, II. 751; H. 152. **265.**? Reseda alba L: *Spec. Pl.* I. 449, II. 645; H. 149. Jfr. Ruppii Fl. Jen. ed. II. p. 234. **266.** R. Luteola L: *Spec. Pl.* I. 448, II. 643, **267.** Tropæolum majus L: *Spec. Pl.* I. 345, II. 490; H. 93. Jfr. Hort. Cliff. 143.

268. DELPHINIUM hortense, flore majore et simplici coeruleo *Tourn:* 426. Consolida regalis hortensis, fl. maj. et simpl. coeruleo *C. B:* 142.

269. DELPHINIUM hort: fl: maj: et sim. coerulo-purpureo *Tourn:* 427.

270 DELPHINIUM h: fl: maj: et simpl. albo *Tourn:* 427.

271. DELPHINIUM h: fl: maj: et simpl. ex coeruleo-purpureo *Tourn: 427.*

272. DELPHINIUM h: fl: maj: et multiplici albo *Tourn:* 427.

273 DELPHINIUM h: fl: m: et multiplici purpureo *Tourn:* 427.

274. DELPHINIUM clatius fl: incarnato *Tourn:* 427.

275. AQUILEGIA flore albo simplici *Tourn:* 428.

276. AQUILEGIA hort. simplex fl. incarnato *Tourn:* 428.

277. AQUILEGIA stellata fl. violaceo *C. B:* 145. *Tourn:* 429. Tubis melliferis caret.

278. AQUILEGIA fl. roseo multiplici *C. B:* 145. *Tourn:* 429. Plenitudo antecedentis.

COMPOSITI.

[Cl. XII.] FLOSCULOSI.

279. CARDUUS albis maculis notatus, vulgaris *C. B:* 381. *Tourn:* 440. Carduus Leucographus *Dod:* 710 [in ed. 1583, p. 722 in ed. 1616].

280. CINARA hortensis, foliis non aculeatis *C. B:* 383. *Tourn:* 442. Carduus non aculeatus *Matth:* 454.

281. SERRATULÆ species, Crupina belgarum *Knaut:* 142. *Rupp:* 173 [ed. I]. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore *Tourn:* 444. Chondrilla fol: lacin: serr: purp: fl. *C. B:* 130. Folia inferiora integra, superiora laciniata.

282. CARTHAMUS officinarum, flore croceo *Tourn:* 457. Cnicus sativus sive Carthamus officinarum *C. B:* 378. Cnicus *Matth:* 797. Cnicus s. Carthamus *Dod:* 358 [in ed. 1583, p. 362 in ed. 1616].

---

268. Delphinium Ajacis L: *Spec. Pl.* I. 531, II. 748; H. 180. Jfr. Hort. Cliff. 113. **275—278.** Aqvilegia vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 533, II. 752; H. 152. **279.** Carduus marianus L: *Spec. Pl.* I. 823, II. 1153; H. 250. **280.** Cynara Scolymus γ L: *Spec Pl.* I. 827, II. 1159; H. 251. **281.** Centaurea Crupina L: *Spec. Pl.* I. 909, II. 1285. **282.** Carthamus tinctorius L: *Spec. Pl.* I. 830, II. 1162; H. 251.

283. ECHINOPUS *Tourn:* 463. Echinopus major, flore candido, staminibus in medio coeruleis *Pont: Diss.* VIII. p. 191. Carduus sphærocephalus, latifolius, vulgaris, flore candido, staminibus in medio coeruleis *C. B:* 381. Carduus sphærocephalus *Dod:* 710 [in ed. 1583, 722 in ed. 1616].

284. CNICUS pratensis, Acanthi folio, flore flavescente *Tourn:* 450. Carduus pratensis, latifolius *C. B:* 376. Cirsium fibrosum, foliis latioribus divisis, viridibus, floribus albicantibus *Moris:* III. p. 150. s. 7. t. 29. f. 20. Cirsium acanthoides pratense, flore ochroleuco *Vaill: Botan. Paris.* p. 38. Folia divisa.

285. CNICUS sylvestris, hirsutior, s. Carduus benedictus *C. B:* 378. *Tourn.* 450. Carduus benedictus *Matth:* 541. Carduus luteus, procumbens, sudorificus et amarus *Moris:* III. p. 160. s. 7. t. 34. f. 1. Folia integra.

286. CYANUS montanus latifolius, vel Verbasculum Cyanoides *C. B:* 273. *Tourn:* 445. Cyanus major *Dod:* 250 [in ed. 1583, 251 in ed. 1616]. Cyanus montanus, perennis, latifolius, flore grandi *Moris:* III. [p. 134] s. 7. t. 25. f. 1. Radix perennis.

287. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s. orientalis major, fl. luteo *Tourn:* 446.

288. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s. orientalis major, flore albo *Tourn:* 446.

289. CYANUS segetum, atropurpurascente flore *Vaill:* [Act. Reg. Scient. Paris 1728 p. 184 spec.] 4.

290. CYANUS flore rubo *Tourn:* 446.

291. CYANUS segetum flore albo *Tourn:* 446.

292. CYANUS segetum, disco carneo c. corona alba.

293. CYANUS segetum, disco cœruleo c. corona candida. *Tourn:* 446.

Tertia hæc species annua est et varietas vulgaris in agris provenientis.

294. SCABIOSA alpina, foliis Centaurii majoris *C. B:* 270: *Tourn:* 464. *Moris:* III. p. 46. s. 6. t. 13. f. 10. Scabiosa alpina centauriodes *Besl: vern* [ord. 9] f. 8. Altitudo hominis. In Wennegarn.

---

283. Echinops sphærocephalus L, *Spec. Pl.* I. 814, II. 1314; H. 248. **284.** Cnicus oleraceus L: *Spec. Pl.* I. 886, II. 1156. **285.** C. benedictus L: *Spec. Pl.* I. 826, Centaurea benedicta *Spec. Pl.* II, 1296; H. 250. **286.** Centaurea montana L: *Spec. Pl.* I. 911, II. 1289; H. 270. **287—288.** C. moschata L: *Spec. Pl.* I. 909, II. 1286; H. 271. **289—293.** C. Cyanus L: *Spec. Pl.* I. 911, II. 1289. **294.** Scabiosa alpina L: *Spec. Pl.* I. 98, II. 141; H. 26.

295. SCABIOSA peregrina, rubra, capitulo oblongo *C. B:* 270. *Tourn:* 464. *Moris:* III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26.

296. DIPSACUS sylvestris aut Virga pastoris major *C. B:* 385. *Tourn:* 466. Labrum Veneris alterum *Matth:* 450. Discus pyramidalis.

297. DIPSACUS sylvestris capitulo minore, vel Virga pastoris minor *C. B:* 385. *Moris:* III. p. 168. s. 7. t. 36. f. 5. Virga pastoris *Matth:* 451.

298. ERYNGIUM latifolium, planum *C. B:* 386. *Tourn:* 327. Eryngium spurium *Dod:* 720 [in ed. 1583, 732 in ed. 1616]. Fl. coeruleo.

299. ERYNGIUM latifolium, planum, flore et caule ex viridi albescente, fl. albo *C. B:* 386. *Tourn:* 327.

300. PETASITES major et vulgaris *C. B:* 197. *Tourn:* 451.

301. CONYZA Linariæ folio *Tourn:* 455. Coma aurea germanica *Boerh: ind. alt.* tom. 1. p. 121. Linaria folioso capitulo luteo major *C. B:* 213. Virga aurea Linariæ folio, floribus congestis et umbellatim dispositis *Moris:* III. 125.

302. ELICHRYSUM orientale *C. B:* 264. *Tourn:* 453. Gnaphalium luteum, peregrinum, specioso flore luteo *Volck:* 193. Flores lutei. Annua.

303. ELICHRYSUM americanum latifolium *Tourn:* 453. Gnaphalium latifolium americanum *C. B:* 263. Helichrysum s. Chrysocome repens, foliis deciduis, flore externe albo, intus flavescente *Moris:* II. t. III. p. 88. Calyces nivei, radix perennis.

304. ABSINTHIUM ponticum, tenuifolium, incanum *Tourn:* 457. *C. B:* 138. *Tourn:* 457. Absinthium tenuifolium *Dod:* 24. Absinthium ponticum *Matth:* 465.

305. ABROTANUM mas angustifolium majus *C. B:* 136. *Tourn:* 459. Abrotanum mas *Dod:* 21. Folia capillacea, multifida.

306. ABROTANUM Lini folio, acriori et odorato *Tourn:* 459. Dracunculus hortensis *C. B:* 98. Draco herba *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. Dragoncellus *Matth:* 410. Folia integra.

---

295. S. atropurpurea L: *Spec. Pl.* I. 100, II. 144; H. 26. **296.** Dipsacus fullonum L: *Spec. Pl.* I. 97, II. 140; H. 25. 1. **297.** D. pilosus L: *Spec. Pl.* I. 97, II. 141; H. 25. 2. **298—299.** Eryngium planum L: *Spec. Pl.* I. 223, II. 336; H. 57. **300.** Tussilago Petasites L: *Spec. Pl.* I. 866, II. 1215. **301.** Chrysocoma Linosyris L: *Spec. Pl.* I. 841, II. 1178. **302.** Gnaphalium orientale L: *Spec. Pl.* I. 583, II. 1195; H. 256. **303.** G. margaritaceum L: *Spec. Pl.* I. 850, II. 1198; H. 255. **304.** Artemisia pontica L: *Spec. Pl.* I. 487, II. 1187; H. 257. **305.** Artemisia Abrotanum L: *Spec. Pl.* I. 845, II. 1185; H. 257. **306.** A. Dracunculus L: *Spec. Pl.* I. 849, II. 1189; H. 256.

307. SANTOLINA foliis teretibus *Tourn:* 460. Abrotanum foemina, foliis teretibus *C. B:* 136. Abrotanum foemina *Matth.* 468.

308. TANACETUM foliis crispis *C. B:* 132. *Tourn:* 461. Folia multifida, crispa.

309. TANACETUM hortense, foliis et odore Menthæ *Tourn:* 461. Balsamita major *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. f. 1. *Boerh:* I, 125. Mentha hortensis corymbifera *C. B:* 226. Folia plana, integra, serrata.

[Cl. XIII.] SEMIFLOSCULOSI.

310. PILOSELLA polyclonos, repens, major, flore amplo aurantiaco *Moris:* III p. 78. s. 7. t. 8. f. 7. Pilosella peregrina, flore saturate croceo *Rupp:* 196 [ed. I.]. Hieracium hortense, floribus atropurpurascentibus *C. B:* 128. *Tourn:* 471. Pilosella indica *Cornut:* 209.

311. LACTUCA sativa *C. B:* 122. *Tourn:* 473. Lactuca florescens *Matth:* 371.

312. LACTUCA capitata *C. B:* 123. *Tourn:* 473.

313. LACTUCA crispa *C. B:* 123. *Tourn:* 473.

314. SONCHUS asper arborescens *C. B:* 124. *Tourn:* 474. Sonchus paludosus, altissimus, hastato folio *Moris:* III. p. 61. Sonchus tricubitalis, folio cuspidato *Raj:* S. ed. II. p. 163.

315. SCORZONERA latifolia sinuata *C. B:* 275. *Tourn:* 476. *Moris:* II. 81.

316. TRAGOPOGON purpureo-coeruleum, Porri folio, qvod Artifi vulgo *C. B:* 274. *Tourn:* 477. Tragopogon alterum *Matth:* 380.

[Cl. XIV.] RADIATI.

317. XERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore *Tourn:* 499. Stoebe *Rupp:* 206 [ed. I.]. Jacea Oleæ folio, capitulis simplicibus *C. B:* 272. Ptarmica altera *Dod:* 698. [ed. 1583]. Ptarmice austriaca 710 [ed. 1616].

---

307. Santolina ChamæCyparissus L: *Spec. Pl.* I. 842, II. 1179; H. 252. **308.** Tanacetum vulgare *β* crispum L: *Spec. Pl.* I. 845, II. 1184; H. 254. **309.** T. Balsamita L: *Spec. Pl.* I. 845, II. 1184; H. 255. **310.** Hieracium aurantiacum L: *Spec. Pl.* I. 801, II. 1126; H. 238. **311.** Lactuca sativa L: *Spec. Pl.* I. 795, II. 1118; H. 242. 1. *α.* **312.** L. sativa *β* capitata L: *Spec. Pl.* I. 795, II. 1118; H. 242. 1. *β.* **313.** L. sativa *γ* crispa L: *Spec. Pl.* I. 795, II. 1118; H. 242. 1. *γ.* **314.** Sonchus palustris L: *Spec. Pl.* I. 793, II. 1116; H. 244. **315.** Scorzonera hispanica L: *Spec. Pl.* I. 791, II. 1112; H. 242. **316.** Tragopogon porrifolium L: *Spec. Pl.* I. 789, II. 1110; H. 243. **317.** Xeranthemum annuum L: *Spec. Pl.* I. 857, II. 1201; H. 255.

318. JACOBÆA maritima *C. B:* 131. *Tourn:* 486. Folia crassa a latere inferiori lanugine alba vestita.

319. JACOBÆA africana frutescens, flore amplo purpureo, elegantissimo, Senecionis folio *Volck:* 225. Arborea est.

320. DORIA *Dill: n. pl. gen.* 143. Solidago saracenica *Dod:* 141. Jacobæa alpina, foliis longioribus, serratis *Tourn:* 485. Virga aurea angustifolia, serrata *C. B:* 268.

321. PTARMICA vulgaris, flore pleno *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis, flore pleno *C. B:* 98.

322. CORONA Solis 11da *Tourn:* 489. Helenium indicum, maximum *C. B:* 276. Chrysanthemum indicum, annuum, maximum, ramosum sive Flos Solis major ramosus *Moris:* III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Sol amplissimus, nutante flore *Rupp:* 154 [1718]. Planta annua, ramosa.

323. CORONA Solis minor, foemina *Tabern:* II. 443. *Tourn:* 489. Helenium indicum minus *C. B:* 277. Planta annua, non ramosa.

324. CORONA Solis parvo flore, tuberosa radice *Tourn:* 489. Sol altissimus, radice tuberosa, esculenta *Rupp:* 155. Helenium [Helianthemum] indicum, tuberosum *C. B:* 277 Chrysanthemum perenne majus, foliis integris, americanum, tuberosum *Moris:* III. p. 23. s. 6. t. 6. f. 57. Ärtskockor under jord. Planta perennis, tuberosa.

325. ASTER omnium maximus Helenium dictus *Tourn:* 483. Helenium officinarum *Rupp:* 163 [ed. I.]. Helenium vulgare *C. B:* 276. Magnitudo hominis, folia subtus pubescentia.

326. ASTER atticus, coeruleus, vulgaris *C. B:* 267. *Tourn:* 481. *Pont* [Diss. IX. p.] 226. Folia serrata, flos coeruleus.

327. ASTER pratensis, autumnalis, Conyzæ folio *Tourn:* 482. Conyza media Asteris flore luteo vel tertia Dioscoridis *C. B:* 265. Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens *J. B:* II. 1050. Discus ratione floris amplissimus.

328. ASTER ramosus annuus canadensis *Tourn:* 482. Bellis ramosa umbellifera *Cornut:* 193 [fig. im pag.] 194. Planta annua. Calix imbricatus. Discus luteus, corona alba.

---

318. Othonna maritima L: *Spec. Pl.* I. 925; H. 273. 2. Cineriaria maritima *Sp.* II. 1244. **319.** Senecio elegans L: *Spec. Pl.* I. 869, II. 1218; H. 260. **320.** S. sarracenicus L: *Spec. Pl.* I. 871, II. 1221; H. 260. 1. **321.** Achillæa Ptarmica L: *Spec. Pl.* I. 898, II. 1266; H. 265. **322.** Helianthus annuus L: *Spec. Pl.* I. 904, II. 1276; H. 268. 1, **323.**? Helianthus multiflorus L: *Spec. Pl.* I. 905, II. 1277; H. 268. 2. **324.** H. tuberosus L: *Spec. Pl.* I. 905, II. 1277; H. 268. 3. **325.** Inula Helenium L: *Spec. Pl.* I. 881, II. 1236. **326.** Aster Amellus L: *Spec. Pl.* I. 873, II. 1226. **327.** Inula dysenterica L: *Spec. Pl.* I 882, II. 1237. **328.** Aster annuus L: *Spec. Pl.* I. 875, II. 1229; H. 262.

329. ASTER virginianus, angustifolius, serotinus, parvo albente flore *Rupp:* 168. Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore *Tourn:* 482. Planta perennis, calyx imbricatus, discus luteo-purpurascens.

330. VIRGA aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita *Tourn:* 484. Virga aurea mexicana *C. B:* 517.

331. OTHONNA disco pyramidali. Corona solis, foliis amplioribus laciniatis *Tourn:* 490. Doronicum americanum, laciniato folio *C. B:* 516. Chrysanthemum americanum perenne, foliis divisis dilutius virentibus, majus *Moris:* III. p. 22. s. 6. t. 6. f. 53.

332. TAGETES maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido *Tourn:* 488. Tanacetum africanum majus *C. B:* 133. Planta erecta, altitudine bicubitali.

333. TAGETES maximus, rectus, flore maximo multiplicato *Tourn:* 488. Caryophyllus indicus major *Matth:* 430. Plenitudo antecedentis.

334. TAGETES indicus minor, simplici flore, s. Caryophyllus indicus s. Flos africanus *Tourn:* 488. Tanacetum africanum, sive Flos africanus minor *C. B:* 133. Flos africanus *Dod:* 254 [in ed. 1583, p. 255 in ed. 1616].

335. TAGETES indicus minor, multiplicato flore *Tourn:* 488. Plenitudo antecedentis. Planta diffusa, vix cubitalis; petala purpurea pube scatent.

336. BELLIS hortensis, rubra, flore multiplici, fistuloso *Tourn:* 491.

337. BELLIS hortensis, pleno flore, eoqve magno incarnato *C. B:* 261. *Tourn:* 491. Bellis hortensis *Dod:* 265. Plenitudo sylvestris.

338. BELLIS hortensis, flore pleno, eoqve magno albo *C. B:* 261. *Tourn:* 491. Varietas antecedentis.

339. CHRYSANTHEMUM folio minus secto, glauco *Tourn:* 492. Bellis lutea, foliis profunde incisis, major *C. B:* 262. Folia dissite serrata.

---

329. A. tradescanti L: *Spec. Pl.* I. 876, II. 1230; H. 262. **330.** Solidago mexicana L: *Spec. Pl.* I. 879, II. 1234. **331.** Rudbeckia laciniata L: *Spec. Pl.* I. 906, II. 1279; H. 269. 1. **332—333.** Tagetes erecta L: *Spec. Pl.* I. 887, II. 1249; H. 267. **334—335.** T. patula L: *Spec. Pl.* I. 887, II. 1249; H. 267. **336—338.** Bellis perennis L: *Spec. Pl.* I. 886, II. 1248; H. 265. **339.** Chrysanthemum segetum L: *Spec. Pl.* I. 889, II. 1254.

340. CHRYSANTHEMUM flore pleno partim candido, partim luteo *Tourn:* 492. Hujus variationes colorum et plenitudines tot fere ac individua folia multifida.

341. MATRICARIA vulgaris s. sativa *Tourn:* 493. *C. B:* 133. Matricaria latifolia *Moris:* III. p. 32. s. 6. t. 10. f. 1. Flos radiatus.

342. MATRICARIA foliis florum fistulosis *Tourn:* 493. Matricaria latifolia, petalis fistulosis, simplex *Moris:* III. p. 32. s. 6. t. 10. f. 1. C. Varietas forte antecedentis.

343. CHAMÆMELUM nobile s. Leucanthemum odoratius *C. B:* 135. *Tourn:* 494. Chamæmelum odoratum *Dod:* 259 [in ed. 1583, p. 260 in ed. 1616].

344. CHAMÆMELUM nobile, flore multiplici *C. B:* 135. *Tourn:* 494. Plenitudo antecedentis.

345. CALTHA vulgaris, flore pallido *C. B:* 275. *Tourn:* 498.

346. CALTHA vulgaris, flore citrino *Tourn:* 498.

347. CALTHA polyanthos major *C. B:* 275. *Tourn:* 498. Fl. pleno.

348. CALTHA polyanthos maxima *Tourn:* 498. *C. B:* 275. Fl. pleno maximo.

349. CALTHA prolifera, minoribus floribus *C. B:* 276. *Tourn:* 499.

[Cl. XV. A.] APETALI. SECT. I. II. ET VI.

350. ASARUM *Tourn:* 501. *C. B:* 197. *Matth:* 32.

351. BETA rubra, radice Rapæ *C. B:* 118. *Tourn:* 502. Beta rubra *Matth:* 347. Beta rubra romana *Dod:* 609 [in ed. 1583, p. 620 in ed. 1616].

352. LAPATHUM folio rotundo, alpinum *J. B:* II. 987. *Tourn:* 504. Lapathum hortense rotundifolium s. montanum *C. B:* 115. Rhabarbarum monachorum vulgo.

353. LAPATHUM folio acuto rubente *C. B:* 115. *Tourn:* 504. *Moris:* II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. Folia oblonga, venis purpureis.

354. ATRIPLEX hortensis, alba s. pallide virens *C. B:* 119. *Tourn:* 505. Folia viridia.

---

340. C. coronarium L: *Spec. Pl.* I. 890, II. 1254; H. 263. **341—342.** Matricaria Parthenium L: *Spec. Pl.* I. 890, II. 1255; H. 263. **343—344.** Anthemis nobilis L: *Spec. Pl.* I. 894, II. 1260. **345—349.** Calendula officinalis L: *Spec. Pl.* I. 921, II. 1304; H. 274. **350.** Asarum europæum L: *Spec. Pl.* I. 442, II. 633. **351.** Beta vulgaris δ L: *Spec. Pl.* I. 222, γ II. 322; H. 56. **352.** Rumex alpinus L: *Spec. Pl.* I. 334, II. 480. **353.** R. sanguineus L: *Spec. Pl.* I. 334, II. 476; H. 89. **354—355.** Atriplex hortensis α et β L: *Spec. Pl.* I. 1053, II. 1439; H. 303.

355. ATRIPLEX hortensis rubra *C. B:* 119. *Tourn:* 505. Folia purpurascentia. Varitas antecedentis. Folia triangula. Planta annua.

356. ATRIPLEX latifolia s. Halimus fruticosus *Tourn:* 505. Halimus latifolius s. fruticosus *C. B:* 120. Caules perennes. Folia subrotunda.

357. CHENOPODIUM ambrosioides, folio sinuato *Tourn:* 506. Botrys ambrosioides vulgaris *C. B:* 138. Atriplex odora s. suaveolens *Moris:* II. p. 605. Botrys *Matth:* 565. Folia multifida. Odor medicatus.

358. CHENOPODIUM ambrosioides [suaveolens], foliis longioribus, mexicanum *Rupp:* 318. Chenopodium ambrosioides mexicanum *Tourn:* 506. Botrys ambrosioides mexicana *C. B:* 138, 516. Folia leviter sinuata. Odor idem.

359. CHENOPODIUM Lini folio villoso *Tourn:* 506. Belle Vedere *Volck:* 59. Linaria scoparia *C. B:* 212. Herba studiosorum *Tabern:* II. 502. Osyris *Dod:* 101. Folia angusta, acuta, integra.

360. MOROCARPUS major *Rupp: Flora Jen.* ed. alt. 1726 p. 271. Chenopodio-Morus major *Boerh: ind. alt.* pars II. 91. Atriplex Mori fructu major, s. fragifera major *Moris:* II. p. 606. s. 5. t. 32. f. 1.

361. PARIETARIA officinarum et Dioscoridis *C. B:* 121. *Tourn:* 509. Parietaria *Dod:* 102. *Tabern:* II. 253.

362. FAGOPYRUM vulgare erectum *Tourn:* 511. Erysimum Theophrasti, folio hederaceo *C. B:* 27. Frumentum saracenicum *Matth:* 305.

363. ALCHIMILLA alpina, Qvinqvefolii folio, subtus argenteo *Tourn:* 508. Alchymilla alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli profunde secto *Rupp: alt.* 51. Tormentilla alpina, folio sericeo *C. B:* 326.

364. BISTORTA major, radice magis intorta *C. B:* 192. *Tourn:* 511. Serpentaria mas. s. Bistorta *Fuchs:* 773.

365. RICINUS vulgaris *C. B:* 432. *Tourn:* 532. Ricinus *Matth:* 771.

366. URTICA pilulifera, folio profundius Urticæ majoris in modum serrato, semine magno Lini *R: Syn.* 140. Urtica urens, pilulas

---

356. A. Halimus L: *Spec. Pl.* I. 1052, II. 1492. **357.** Chenopodium Botrys L: *Spec. Pl.* I. 219, II. 320; H. 55. **358.** C. ambrosioides L: *Spec. Pl.* I. 219, II. 320; H. 56. **359.** C. Scoparia L: *Spec. Pl.* I. 221, II. 321; H. 55. **360.** Blitum capitatum L: *Spec. Pl.* I. 4, II. 6; H. 3. **361.** Parietaria officinalis L: *Spec. Pl.* I. 1052, II. 1492; H. 302. **362.**? Polygonum Fagopyrum L: *Spec. Pl.* I. 364, II. 522; H. 96. **363.** Alchemilla alpina L: *Spec. Pl.* I. 123, II. 179. **364.** Polygonum Bistorta L: *Spec. Pl.* I. 360, II. 516; H. 95. **365.** Ricinus communis L: *Spec. Pl.* I. 1007, II. 1430; H. 289. **366.** Urtica pilulifera L: *Spec. Pl.* I. 983, II. 1395; H. 282.

ferens Dioscoridis, semine Lini *C. B:* 232. *Tourn:* 535. Urtica urens prior *Dod:* 151. Urtica prima *Matth:* 707.

367. SPINACIA vulgaris, sterilis *Tourn:* 533. Lapathum hortense, sive Spinacia sterilis *C. B:* 115. Mas.

368. SPINACIA vulgaris, capsula seminis aculeata *Tourn:* 533. Lapathum hortense s. Spinacia semine spinoso *C. B:* 114. Spinacia *Matth:* 342. Foemina.

369. MERCURIALIS spicata, s. foemina Dioscoridis et Plinii *Tourn:* 534. *C. B:* 121. Mas est.

370. MERCURIALIS testiculata, s. mas Dioscoridis et Plinii *Tourn:* 534. *C. B:* 121. Foemina.

371. CANNABIS erratica *C. B:* 320. *Tourn:* 535. Cannabis foemina *J. B:* III. [B.] 447. Mas est.

372. CANNABIS sativa *C. B:* 320. *Tourn:* 535. Cannabis mas. *J. B:* III. [B.] 447. Foemina est.

373. LUPULUS foemina *C. B:* 298. *Tourn:* 535. Mas.

374. LUPULUS mas *C. B:* 298. *Tourn:* 535. Convolvulus perennis heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliaceis strobili instar *Moris:* II. p. 37. Foemina.

[Cl. XV. B.] STAMINEI. SECTIO III.

375. SECALE hybernum vel majus *Monti:* 3. *C. B:* 23. *Tourn:* 313. Secale *Matth:* 311.

376. SECALE vernum vel minus *Mont:* 4. *C. B:* 23. *Tourn:* 513. Rogga s. Secale *Dod:* 490 [in ed. 1583, p. 499 in ed. 1616].

377. HORDEUM polysticum [polystichum], vernum *Mont:* 4. *C. B:* 22. *Tourn:* 513. Hordeum *Matth:* 306. Gement korn.

378. HORDEUM disticon [distichon *C. B:* 23. *Dod:* 492 [in ed. 1583, p. 501 in ed. 1616]. Himmelskorn.

379. TRITICUM hybernum, aristis carens *Mont:* 2. *C. B:* 21. *Tourn:* 512. Triticum *Dod:* 480 [in ed. 1583, p. 489 in ed. 1616].

367—368. Spinacia oleracea mas et foemina L: *Spec. Pl.* I. 1027, II. 1456; H. 296. **369—370.** Mercurialis annua mas et femina L: *Spec. Pl.* I. 1035, II. 1465; H. 298. **371—372.** Cannabis sativa mas et femina L: *Spec. Pl.* I. 1027, II. 1457; H. 297. **373—374.** Humulus Lupulus L: *Spec. Pl.* I. 1028, II. 1457. **375—376.** Secale cereale L: *Spec. Pl.* I. 84, II. 124; H. 22. **377.** Hordeum vulgare L: *Spec. Pl.* I. 84, II. 125; H. 22. **378.** H. distichon L: *Spec. Pl.* I. 85, II. 125; H. 23. 4. **379.** Triticum hybernum L: *Spec. Pl.* I. 86, II. 126; H. 21.

380. TRITICUM spica Hordei Londinensibus *Mont:* 3. *R:* 387. *Tourn:* 512. Zeopyrum s. Triticospeltum *C. B:* 22. Hordeum nudum s. Gymnocrithon *J. B:* II. 430. Zeopyron *Dod:* 486 [in ed. 1583, p. 495 in ed. 1616]. Spica aristata, compressa, brevis.

381. TRITICUM cinereum, [cinericeum], maximis aristis donatum, triturando glumas deponens *Mont:* 2. *J. B:* II. p. 408. Triticum aristatum, spica maxima cinerea [cinericea], glumis hirsutis *Raj:* s. 387. Grana glumis villosis involuta.

382. AVENA nigra *Mont:* 6. *C. B:* 23. *Tourn:* 514.

383. AVENA vulgaris s. alba *Mont:* 6. *C. B:* 23. *Tourn:* 514.

384. GRAMEN peniculatum, aqvaticum, Phalaridis semine, folio variegato *Sch:* 127. *Tourn:* 523. Gramen paniculatum, folio variegato *C. B:* 3.

385. PANICUM italicum s. panicula majore *C. B:* 27. *Tourn:* 515. Panici indici spica *Dod:* 498 [in ed. 1583, p. 507 in ed. 1616].

386. MAYS granis aureis *Mont:* 23. *Tourn:* 531. Frumentum indicum Mays dictum *C. B:* 15. Frumentum indicum *Matth:* 305.

ARBORES.

[Cl. XVIII.] APETALI.

387. FICUS humilis *C. B:* 457. *Tourn: App.* p. 663. Ficus *Matth:* 211.

388. LENTISCUS vulgaris *C. B:* 399. *Tourn:* 580. Lentiscus *Matth:* 94. *Dod:* 859 [in ed. 1583, p. 871 in ed. 1616].

389. BUXUS arborescens *C. B:* 471. *Tourn:* 578. Buxus *Dod:* 770 [in ed. 1583, p. 782 in ed. 1616]. *Matth:* 151. Folia oblonga, crassa.

390. BUXUS foliis rotundioribus *C. B:* 471. *Tourn:* 579. Chamæpyxos *Tabern:* III. 141.

391. BUXUS minor, foliis per limbum aureis *Tourn:* 579. Varitas antecedentis. Folia subrotunda.

380.? Hordeum distichon β nudum L: *Spec. Pl.* I. 85, II. 125. **381.**? Triticum polonicum L: *Spec. Pl.* II. 127. **382—383.** Avena sativa L: *Spec. Pl.* I. 79, II. 118; H. 20. **384.** Phalaris arundinacea β picta L: *Spec. Pl.* I. 55, II. 80. **385.** Panicum italicum L: *Spec. Pl.* I. 56, II. 83; H. 19. **385.** Zea Mays L: *Spec. Pl.* I. 971, II. 1378; H. 281. **387.** Ficus Carica β L: *Spec. Pl.* I. 1059, II. 1513. **388.** Pistacia Lentiscus L: *Spec. Pl.* I. 1026, II. 1455; H. 296. **389—391.** Buxus sempervirens L: *Spec. Pl.* I. 983, II. 1384; H. 283.

[Cl. 19.] AMENTACEI.

392. NUX juglans s. regia vulgaris *C. B:* 417. *Tourn:* 581. Nux juglans *Matth:* 202.

393. CORYLUS sativa, fructu albo minore s. vulgaris *C. B:* 417. *Tourn:* 581.

394. SABINA folio Tamarisci *C. B:* 487. Sabina sine baccis *Matth:* 107. Mas est.

395. SABINA folio Cupressi *C. B:* 487. Sabina baccifera foemina.

396. PINUS sativa *C. B:* 491. *Tourn:* 585.

397. MORUS fructu nigro *C. B:* 459. *Tourn:* 589.

398. POPULUS nigra *C. B:* 429. *Tourn:* 592. Folia oblongo qvadrangula.

399. POPULUS alba, majoribus foliis *Tourn:* 592. *C. B:* 429. Folia laciniata.

[Cl. XX.] MONOPETALI.

400. ALATERNUS I *Clus: Hisp.* 56. *Tourn:* 595. Alaternus Turneri *Tabern:* III. 132. Philyca elatior *C. B:* 476.

401. ALATERNUS aurea, foliis ex luteo variegatis *Tourn:* 595. Varietas.

402. TINUS prior *Tourn:* 607. Tinus I *Tabern:* III. 46. Laurus sylvestris, Corni foeminæ foliis subhirsutis *C. B:* 461.

---

392. Juglans regia L: *Spec. Pl.* I. 997, II. 1415; H. 286. **393.** Corylus Avellana L: *Spec. Pl.* I. 998, II, 1417; H. 286. **394—395.** Juniperus Sabina mas et femina L: *Spec. Pl.* I. 1039, II. 1472; H. 299. 1. **396.** Pinus Pinea L: *Spec. Pl.* I. 1000, II. 1419; H. 288. **397.** Morus nigra L: *Spec. Pl.* I. 986, II. 1398; H. 283. **398.** Populus nigra L: *Spec. Pl.* I. 1034, II. 1464. **399.** P. alba L: *Spec. Pl.* I. 1034, II. 1463. **400—401.** Rhamnus Alaternus L: *Spec. Pl.* I. 193, II. 281; H. 47. **402.** Viburnum Tinus L: *Spec. Pl.* I. 267, II. 383; H. 69.

403. JASMINUM vulgatius, flore albo *C. B:* 397. *Tourn:* 597. Jasminum *Dod:* 405 [in ed. 1583, p. 409 in ed. 1616]. Gelseminum *Matth:* 75. Laciniæ petali acutae.

404. JASMINUM s. Gelseminum luteum *Tourn:* 597. Jasminum humile luteum *C. B:* 397. Petali laciniæ obtusæ.

405. LIGUSTRUM *Tourn:* 596. *Matth:* 137. Ligustrum germanicum *C. B:* 475.

406. SYRINGA coerulea *C. B:* 398. Syringa lusitanica *Tabern:* III. 133. Lilac *Tourn:* 601. Folia integra.

407. SYRINGA laciniato folio *Rupp:* 24 [ed. III. 1745]. Lilac laciniato folio *Tourn:* 602. Ligustrum foliis laciniatis *C. B:* [Pin.] 476. Prod. 158. Agem lilac persarum *Cornut:* 189. Folia plurima laciniata.

408. OLEA sativa *C. B:* 472. Olea domestica *Cam: Ep:* 110.



409. ELÆAGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo, olivæformi, subdulci *Tourn: Coroll:* 53. Olea sylvestris, folio molli incano *C. B:* 472. Eleagnos *Cam: Epit:* 106.

410. AQUIFOLIUM s. Agrifolium vulgo *Tourn:* 600. Aqvifolium *Matth:* 131. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato *C. B:* 425.

411. AQUIFOLIUM foliis subrotundis, spinis et limbis argenteis *Tourn:* 600. Variatis.

412. NERION floribus rufescentibus *C. B:* 464. *Tourn:* 605. Nerion *Tabern:* III. 141. Rhododendrum *Dod:* 839 [in ed. 1583, p. 851 in ed. 1616].

413. SAMBUCUS fructu in umbella nigro *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Sambucus *Matth:* 782.

414. SAMBUCUS laciniato folio *C. B:* 456. *Tourn:* 606. *Dod:* 832 [in ed. 1583, p. 851 in ed. 1616].

---

403. Jasminum officinale L: *Spec. Pl.* I. 7, II. 9; H. 5. **404.** J. humile L: *Spec. Pl.* I. 7, II. 9; H. 5. **405.** Ligustrum vulgare L: *Spec. Pl.* I. 7, II. 10. **406.** Syringa vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 9, II. 11; H. 6. **407.** S. persica β laciniata L: *Spec. Pl.* I. 9, II. 11; H. 6. **408.** Olea europæa L: *Spec. Pl.* I. 8, II. 11. **409.** Elæagnus angustifolius L: *Spec. Pl.* I. 121, II. 176; H. 31. **410—411.** Ilex Aqvifolium L: *Spec. Pl.* I. 125, II. 181; H. 32. **412.** Nerium Oleander L: *Spec. Pl.* I. 209, II. 305; H. 53. **413.** Sambucus nigra L: *Spec. Pl.* I. 269, II. 385; H. 69. **414.** S. nigra γ laciniata L: *Spec. Pl.* I. 270, II. 386; H. 69.

415. SAMBUCUS humilis s. Ebulus *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Caulis annuus. Folia pinnata.

416. OPULUS flore globoso *Tourn:* 607. Sambucus aqvatica flore globoso pleno *C. B:* 456. Sambucus [V] aqvatica [II] polyanthos *Tabern:* III. 119.

417. CAPRIFOLIUM italicum *Dod:* 406 [in ed. 1583, p. 411 in ed. 1616]. *Tourn:* 608. Periclymenum italicum *Riv: m. irr.* I. tab. 123. Periclymenum perfoliatum *C. B:* 302. Periclymenum *Matth:* 626.

[Cl. XXI.] ROSACEI.

418. PHILADELPHUS. Syringa alba s. Philadelphus Athenæi *C. B:* 398. *Tourn:* 617.

419. STAPHYLODENDRON *Matth:* 201. *Tourn:* 616. Pistacia sylvestris *C. B:* 401. Folia cum impari pinnata.

420. HIPPOCASTANUM vulgare *Tourn:* 612. Hippocastanum *Riv: pent: irr.* III. tab. 350. Castanea eqvina *Matth:* 163. Castanea folio multifido *C. B:* 419. Folia digitata. Flores spicati.

421. TOXICODENDRON triphyllum *Tourn:* 611. Edera trifolia canadensis *Cornut:* 96.

422. RHUS canadense, folio longiori, utrinqve glabro *Tourn:* 611. Folia pinnata cum impari.

423. SPIRÆA Salicis folio *Tourn:* 618. Frutex spicatus foliis salignis serratis *C. B:* 475.

424. SPIRÆA Hyperici folio non crenato *Tourn:* 618. Pruno sylvestri affinis canadensis *C. B:* 517. *Pluck: Phyt.* CCXVIII. 5.

425. TAMARISCUS narbonensis *Tourn: App.* 661. Tamarix altera, folio tenuiore s. gallica *C. B:* 485.

426. ROSA maxima multiplex *C. B:* 481. *Tourn:* 647. Rosa hortensis [hollandica], rubella, [plena], qvibusdam Centifolia, spinoso frutice *J. B:* II. 37. Petala centum comuniter.

---

415. S. Ebulus L: *Spec. Pl.* I. 269, II. 385. **416.** Viburnum Opulus *β* roseum L: *Spec. Pl.* I, 268, II. 384; H. 69. **417.** Lonicera Caprifolium L: *Spec. Pl.* I. 173, II. 246; H. 42. **418.** Philadelphus coronarius L: *Spec. Pl.* I. 470, II. 671; H. 122. **419.** Staphylea pinnata L: *Spec. Pl.* I. 270, II. 386; H. 69. **420.** Aesculus HippoCastanum L: *Spec. Pl.* I. 344, II. 488; H. 92. **421.** Rhus Toxicodendon L: *Spec. Pl.* I. 266, II. 381; H. 68. **422.** R. glabrum L: *Spec. Pl.* I. 265, II. 380; H. 68. **423.** Spiræa salicifolia L: *Spec. Pl.* I. 489, II. 700; H. 131. **424.** S. hypericifolia L: *Spec. Pl.* I. 489, II. 701; H. 131. **425.** Tamarix gallica L: *Spec. Pl.* I. 270, II. 386; H. 69. **426.**? Rosa centifolia L: *Spec. Pl.* I. 491, II. 704; H. 132. 2.

427. ROSA fl. albo pleno *Tourn:* 637. Antecedens fl. albo.

428. ROSA rubra multiplex *C. B:* 481. *Tourn:* 637. Gemena dubbla roser.

429. ROSA versicolor *C. B:* 481. *Tourn:* 637. Rosa semiplena, flore variegato *Volck:* 359. Flos variegatus.

430. ROSA sylvestris, foliis odoratis *C. B:* 483. *Tourn:* 638. Rosa Eglenteria *Tabern:* III. 169. Folia in caule odoratissima. Flores lutei.

431. VITIS vinifera *C. B:* 299.

432. RUBUS idæus fructu albo *C. B:* 479. *Tourn:* 614. Baccæ pallide luteæ.

433. CORNUS hortensis mas *C. B:* 447. *Tourn:* 641. Cornus *Matth:* 192. *Besl: vern. hyem.* ord. I. fol. 7. f. III. c. flore.

434. LAUROCERASUS *Tourn:* 628. Padus exotica, folio amplo, crasso, semper virente *Rupp:* 122 [ed. I]. Cerasus folio laurino *C. B:* 450.

435. CITREUM vulgare *Tourn:* 621. Malus medica *C. B:* 435. *Dod:* 779 [in ed. 1583, p. 791 in ed. 1616].

436. AURANTIUM acri medulla vulgare *Tourn:* 620. Malus Aurantia major *C. B:* 436. Aurantia mala *Matth:* 186. Malus aurantia *Dod:* 780 [in ed. 1583, p. 795 in ed. 1616].

437. PUNICA, quæ Malum Granatum fert *Tourn:* 636. Malus punica sativa *C. B:* 438. Mala punica *Matth:* 173.

438. MALUS pumila, quæ potius frutex qvam arbor, fructu candido *C. B:* 433. *Tourn:* 634. Paradisapel.

439. PYRUS sativa, fructu æstivo, oblongo magno, partim rubro, partim albido [odorato] *Tourn:* 629. Bon chrestier.

440. PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccharato, odorato, e viridi flavescente, in ore liqvescente *Tourn:* 629. Bergamotter.

---

427. R. alba β L: *Spec. Pl.* I. 492, II. 705; H. 132. **428.** R. gallica L: *Spec. Pl.* II. 704; H. 132 β. **429.** R. gallica β versicolor L: *Spec. Pl.* II. 704; H. 132. η. **430.** R. eglanteria L: *Spec. Pl.* I. 491, II. 703; H. 132. $\varkappa$. **431.** Vitis vinifera L: *Spec. Pl.* I. 202, II. 293; H. 50. **432.** Rubus idæus β L: *Spec. Pl.* I. 493, II. 706; H. 133. **433.** Cornus mas β L: *Spec. Pl.* I. 117, II. 171; H. 29. **434.** Prunus LauroCerasus L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 678; H. 126. **435.** Citrus Medica L: *Spec. Pl.* I. 782, II. 1100; H. 236. 1. **436.** Citrus Aurantium L: *Spec. Pl.* I. 782, II. 1100; H. 236. **437.** Punica Granatum L: *Spec. Pl.* I. 472, II. 676; H. 122. **438.** Pyrus Malus β paradisiaca L: *Spec. Pl.* I. 479, II. 686; H. 130. **439.** P. communis γ pompejana L: *Spec. Pl.* I. 479, II. 686; H. 130. **440.** P. communis β falerna L: *Spec. Pl.* I. 479, II. 686; H. 130.

441. CYDONIA fructu breviore et rotundiore *Tourn:* 633. Mala cotonea minora *C. B:* 434.

442. PRUNUS fructu minori, austero *Tourn:* 623. Pruna Augusto maturescentia minora et austeriora *C. B:* 443. Color coeruleus. Fr. exiguus.

443. PRUNUS sylvestris, præcox, altior *Tourn:* 623. Pruna sylvestria præcocia *C. B:* 444. Tyska Slåen.

444. PRUNUS sativa, vulgaris *Rupp:* 119 [ed. I].

445. CERASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido *Tourn:* 625. Cerasa sativa, rotunda, rubra et acida, qvæ nostris Cerasa sativa *C. B:* 449. Moreller.

446. CERASUS fructu acido, serotino, succi sanguinei *Tourn:* 625. Cerasa acidissima, sanguineo succo *C. B:* 450. Sylt kiersbär.

447. PERSICA molli carne et vulgaris, viridis et alba *C. B:* 440. *Tourn:* 624. Persica mala *Matth:* 182.

448. ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro *Tourn:* 623. Armeniaca malus *Matth:* 184. Mala armeniaca majora *C. B:* 442. Folia Betulina.

449. AMYGDALUS sativa, fructu majori *C B:* 441. *Tourn:* 627. Amydalæ *Matth:* 199.

[Cl. XXII.] PAPILIONACEI.

450. GENISTA juncea *Tourn:* 643. Genista *Matth:* 764. Spartium arborescens, seminibus lenti similibus *C. B:* 396.

451. GENISTELLA spinosa *Riv: tetr. irr.* II. tab. 192. Genistella aculeata *Tabern:* III. 184. Genista spartium minus, germanicum *Tourn:* 645. Genista spinosa, minor, germanica *C. B:* 395. Folia qvædam trifolia, qvædam integra.

452. COLUTEA vesicaria *C. B:* 396. *Tourn:* 649. Colutea *Riv: tetr. irr.* II. tab. 145. *Matth:* 520. *Dod:* 772 [in ed. 1583, p. 784 in ed. 1616]. Folia rotunda, pinnata.

---

441. P. Cydonia γ *Spec. Pl.* I. 480, II. 687. **442.** Prunus domestica ι augustana L: *Spec. Pl.* I. 475, II. 680. **443.** Pr. insititia L: *Spec. Pl.* II. 680. **444.** Pr. domestica γ hungarica L: *Spec. Pl.* I. 475, II. 680; H. 124. **445.** Pr. Cerasus α caproniana L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 679; H. 125. **446.** Pr. Cerasus η austera L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 679; H. 125. **447.** Amygdalus Persica L: *Spec. Pl.* I. 472, II. 676; H. 123. **448.** Prunus Armeniaca L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 679; H. 124. **449.** Amygdalus communis L: *Spec. Pl.* I. 473, II. 677; H. 123. **450.** Spartium junceum L: *Spec. Pl.* I. 708, II. 995; H. 208. 1. **451.** Genista germanica L: *Spec. Pl.* I. 710, II. 999. **452.** Colutea arborescens L: *Spec. Pl.* I. 723, II. 1045; H. 228. 1.

453. LABURNUM *Riv: tetr. irr.* II. tab. 187. Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo *Tourn:* 648. Anagyris non foetida major vel alpina *C. B:* 391.

454. FALCATA incana *Riv: tetr. irr.* II. tab. 210. *Dill: nov. pl. gen.* 130. Medicago trifolia, frutescens, incana *Tourn:* 412. Cytisus incanus, siliqvis falcatis *C. B:* 389. Cytisus ut existimatur *Dod:* 559 [in ed. 1583, p. 569 in ed. 1616].

---

453. Cytisus Laburnum L: *Spec. Pl.* I. 739, II. 1041; H. 210. 1.
454. Medicago arborea L: *Spec. Pl.* I. 778, II. 1096; H. 230. 5.

CAROLI LINNÆI

MED: ET BOTAN: STUDIOS:

HORTUS UPLANDICUS

SIVE

ENUMERATIO PLANTARUM,

QUÆ TAM IN HORTIS VARIIS E: GR: BOTANICO, REGIO, CELSIANO, LÖFSTADIENSI ETC: QUAM IN AGRIS UPLANDIÆ SATÆ REPERIUNTUR, SECUNDUM METHODUM TOURNEFORTIANAM IN CLASSES DISTRIBUTÆ, CUM RARIORIBUS NONNULLIS OBSERVATIONIBUS INTERSPARSIS, NEC NON NOVA DIVISIONE UMBELLATARUM.

UPSAL: MDCCXXX.

KONGL. MAYST:S

TROTIÄNARE OCH PROFESSOR

WID

KONGL. ACAD: I UPSALA

SAMT

WIDTBERÖMD LEDAMOT

WID

KONGL. WETTENSKAPERNAS SOCIETET

DER SAMMA STÄDES

DEN

EDLE OCH WÄLBORNE HERREN

H. OLOF RUDBECK

HERRE TILL KYDINGEHOLM OCH

BOLSTAWIK ETC.

Ädle och Wälborne Herre!

Kunde doch min krafter hinna
Såsom willian willig är:
Kunde jag straxt se och finna
Att the blad jag nu frambär
Wägde intet: mot thet gott
Gunst och godhet jag undfått.

Men fast bladen intet wäga
Willian wäger doch des mehr,
Hwilken ursächt jag kan äga
Endast, när jag thessa tehr,
Ty min Herre I själf wet
Af min oförmögenhet.

Sinnet ber mig häldre tiga,
Willian råder annat in,
Sinnet tycker att min giga
Kan eij finna toligt sin,
Willian litar doch uppå
Att ett gunstigt öra få.

Ja min willia jag ty föllier,
Ty den gunst jag niutit här
Tohl eij längre att jag döllier
Then: ja mig försäkrad bär
Om ett mehr än gunstigt sin
Som behagar bloden min.

Jag då genast mig nu hastar
Gunstig Herre för Ehr fram,
Och för Eder fötter kastar
Detta lilla pappers kram
Och fast ringa gåfwa min
Anse doch ett tacksamt sin.

Tacksam bör jag wislig wara
För den gunst jag daglig får
Den jag också fått ärfara
Uti samfält tvenne åhr
Som snart hade ingen mehr
Att tillita än som Ehr.

Gunstig Herre skall jag skrifwa
Edert loford rätt som bör
Lär det mig en last wist blifwa
Tyngre än min skylder rör
Därför jag den häldre will
Steds högt wörda tyst och still.

Och skall steds mitt tacksamt sinne
Fägnas åht Ehr lycka god,
Altid ha Ehr gunst i minne
Önska alltid af friskt mod
Alskiöns wälgång, alsköns gott
Alsköns frögd till tusend mått.

Aldrabäst kan jag förklara
Doch min frögd på thenna dagh,
När jag ser min Herre wara
Frisk och sund och med behagh
Then få fira med all frögd
Hwij är jag då icke nögd.

Ty har jag ock willat gärna.
Thessa blad på thenna dag
Gunstig Herre Eder ährna
Komma de i Ehrt behag
Önskar jag mig icke mehr
Utan ödmjukt tackar Ehr.

Hvarför jag de bladen ägnat
Nu upoffra wet I wähl
Ty dett lof blir Ehr tillägnat
Och med största fog och skiähl
Att I Herre är ju then
Som är lius för andra män.

Lius jag Ehr kan richtigt nämna
Framför andra lärda män
Will man Botaniqven lämna
Hwar uti I kännens än,
För then främste, för thet wet
I oss i the saker tedt.

Finner man Ehr i naturen
Lius åth andra lämna kan
Ja hwad små och stora diuren
Öfver alt kan angå: man
Ehr förtrefflig ther i ser
Wunna palmer gerna ger.

Jag förtiger läror flera
Som Ehr höga post begär,
Hwar uti I excellerar,
Och i undran stannar här
Huru I än mehr har lärdt
Som är wist förundran wärdt.

Tråtsa will jag utriks männer
Som haft annors nog beröm,
Hwem är doch som icke känner
Gunstig Herre; Eder öm
Wara mehr om språkens art
Rätta rot och annat rart.

Trotsa will jag och then tunga
Utaf alla skalder wij
Hafwa haft, som bättre siunga
Kunnat en swänsk wärs än I.
Många warit qwicka på't
Men gått språken illa åht.

Men hwart föres jag? jag giörer
Mig nu alt för dristig här
Som så wichtig sak omrörer
Glädien then wist orsak är
Som mehr säga biuder meij
Men min tunga säger neij.

Nu jag i förundran stannar
Tungan kan eij säja mehr
Men uti tyst hiärta sannar
Att dett lof som angår Ehr
Gunstig Herre är så stort
Som sig någon kunnat giort.

Thenna trägård ja mond drista
Ofra upp på altar Tin,
Anse som en liten gnista
Af ett mehr än tacksamt sin
Lätt then finna hägn och hamn
Af Ert wärda stora namn.

Anse then som tacksamt sinne
För den gunst I mig betedt
Tå I hade mig i minne
Och mig lof på trägård gedt
Att få mig och andra fler
Öfwa, lära mehr och mehr.

Samma önskan jag förbinner
Mig att willia hafwa steds
Att så länge bloden rinner
I min ådror i en kretz
Ja så länge pulsen slår
Och friskt blod af hiärtat går.

Och skull' jag eij mehra önska
Än jag fingo många åhr
Herre se Ehr lycklig grönska
Uti stadig ungdoms wår.
Sker min önskan som jag will
Många Namnsdar ser I till.

Eder Sohl nu länge lyse
Edert lius eij släckes snart
Liuset som Ehr klarhet hyser
Liuse mig uti min fart
Länge thet sig hugna af
Önskar then som till sin graf.

är och förblifwer

Ädle och Wälborne Hr Professorens

Upsal: d: 29 Juli
1730.

ödmiukaste tiänare
CAROLUS LINNÆUS.

Tabula continens hujus libelli ordinem.



Notularum marginalium explicationes:

○ significat plantas, qvæ adhuc in Horto botanico reperiuntur N:o 280.

● autem eas, qvæ antea ibi a me fuere observatæ, jam vero interiere.

△ qvas insuper in Horto S: S: [Th:] D: Celsii observavi.

□ vel in Horto Regio s: Arcis.

× vel in H: Löfstadiensi i Roslagen.

I. CAMPANIFORMES.

1. POLYGONATUM angustifolium, non ramosum *Tourn:* 78. ○ *C. B:* 303.

[Endast i Leufsta Mss.]

2. RUSCUS myrtifolius, aculeatus *Tourn:* 79. Ruscus *C B:* ○ 470. *Matth:* 751.

Folia in acutum mucronem desinunt.

3. RUSCUS angustifolius, fructu folio innascente *Tourn:* 79. ○ Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente *C. B:* 304. Hippoglossum *Matth:* 741.

Foliolum e medio folio enascitur, intra qvod fructificatio collocatur.

4. CONVOLVULUS major albus *Tourn:* 82. *C. B:* 294. Scamonium germanicum, [s. Hydragogum nostrum *M. Hoffmannus:*] *Fl. Altdorf.* Convolvulus vulgaris major, albus, seu flore majore albo *Moris:* II. p. 13. [12.] s: 1. t. 3. f. 6. Smilax lævis major *Dod:* 338. ○

Folia satis distincta.

5. CONVOLVULUS purpureus, folio subrotundo *Tourn:* 82. *C. B:* 295. *Moris:* II. p. 183. [13.] s. 1. t. 3. f. 7.

6. OXYS lutea Tourn: 88. Trifolium acetosum, corniculatum ○ *C. B:* 330. Trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus, repens vel item procumbens *Moris:* II. p. 183. s. 2. t. 17. f. 2.

Planta ramosa.

[I Linn. Soc. ex. bland Infundibuliformes.]

7. TITHYMALUS palustris, fruticosus *Tourn:* 87. *C. B:* 292. ○ Esula palustris *Riv: tetr: irr:* [tab. 240]. Ezula major *Dod:* 370. Magnitudine bicubitali a cæteris abunde differt.

---

1. Convallaria verticillata Linné Species plantarum (ed. 1753) pag. 315, ed. II (1762—63) p. 451; saknas i Linnæi Hortus Upsaliensis (1748). **2.** R. aculeatus L: Sp. I. 1041, II. 1474; H. 300. **3.** R. Hypoglossum L. Sp. I. 1041, II. 1474; H. 300. **4.** C. sepium L: Sp. I. 153, II. 218. **5.** C. purpureus L: Sp. II. 219; H. 38. **6.** Oxalis corniculata L: Sp. I. 435, II. 623; H. 116. **7.** Euphorbia palustris L: Sp. I. 462, II. 662.

○ 8. APOCYNUM erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus parvis, obsolete purpurascentibus *Tourn:* 91. Apocynum majus, syriacum, rectum *Cornut:* [fig. 90.] [descript: p: 91]. Apocynum [latifolium] syriac: incan: erectum, floribus umbellatis, minoribus, obsolete purpurascentibus, siliqvis folliculatis, rugosis *Herm:* 53. [52]. Apocynum medium peregrinum, flore umbellato et obsoleto dilute purpurascente, petalis reflexis *Moris:* III. p. 69. [509] § 2. Apocynum rectum americanum majus s: latifolium *Volck:* 38.

Nöjsamt är att se, huru åtskillige handa Muscæ fastna med fötterna uti blomorna, då de honungs saften tänkte bort stiäla.

○ 9. MALVA foliis crispis *Tourn:* 95. *C. B:* 315. Malva crispa *Dod:* 642. *Besl: æstiv: ord.* 6. f. 9. [fol. 9. fig. I].

Margines foliorum undulati.

10. MALVA rosea, folio subrotundo *C. B:* 315. Malva major *Matth:* 339.

Calyx inferior monophyllus, 5 fidus. Folia mollia, leviter incana. Hujus variationes a colore floris desumptæ sunt.

[Endast i Linnean Society's handskrift.]

○ 11. MALVA rosea, folio subrotundo, flore simplici luteo *Tourn:* 95.

○ 12. MALVA rosea, folio subrotundo, flore candido *Tourn:* 94. *C. B:* 315.

○ 13. MALVA rosea, fol: subrot: flore dilutius rubente *Tourn:* 94. *C. B:* 315.

14. MALVA rosea, fol: subrot: flore saturatius rubente *Tourn:* 95. *C. B:* 315.

15. MALVA rosea, fol: subrot: flore ex rubro nigricante *Tourn:* 95. *C. B:* 315.

○ 16. ALTHÆA frutescens, folio rotundiore incano. *Tourn:* 96. [97]. *C. B:* 316. Malva frutescens, folio rotundiore incano *Rupp:* 16.

Arbor perennis.

○ 17. ALTHÆA Dioscoridis et Plinii *Tourn:* 97. *C. B:* 315. MALVA palustris mollis et incana [P. Herman.] *Rupp:* 16. Althæa Dioscoridis *Breyn: Prodr:* 2. 12. Althæa *Matth:* 600. Althæa Ibiscus *Dod:* 644.

Calyx inferius multifidus et laciniatus.

---

8. Asclepias syriaca L: Sp. I. 214, II: 313; H. 53. **9.** M. crispa L: Sp. I. 689, II. 970; H. 200. **10—15.** Alcea rosea L: Sp. I. 687, II. 966; H. 204. **16.** Lavatera triloba L: Sp. I. 691, II. 972. **17.** A. officinalis L: Sp. I. 686, II. 966; H. 204.

18. ALCEA rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, nigricante ○
et aspero *Tourn:* 98. Malva folio Ficus *C. B: Prodr:* 137. Malva folio Ficus altera *C. B:* [Pinax p:] 315. Malva mauritiana *Rupp:* 13 ubi dilucidatur.

Calyx infer: 3 folius, flores purpurei in alis foliorum. Folia ad medium 3 fida, obtusa, media lacinia longiori.

19. ALCEA vulgaris, major, flore ex rubro roseo *Tourn:* 95 ○
[97]. *C. B:* 316. Malva sylvestris, altissima, folio cannabino, flore amplo *Rupp:* 16.

Folia inferiora integra fere, superiora maxime laciniata.

20. ALCEA vulgaris, major, flore candidiore *Tourn:* 97. *C. B:* ○
316. Varietas prioris.

21. KETMIA Syrorum qvibusdam *Tourn:* 99. Alcea arborescens, syriaca *C. B:* 316. Alcea arborescens *Camer: H: m:* 9. fig. III.
[Endast i handskriften på Leufsta].

22. BAMMIA *Rivin: apud Rupp:* 38. Ketmia vesicaria, vul- ●
garis *Tourn:* 101. Alcea vesicaria *C. B:* 317. *Dod:* 646. Hypecoum *Matth:* 673.

Calyce floris globoso et inflato a Ketmia differt.

23. CUCUMIS sativus, vulgaris, maturo fructu subluteo *Tourn:* ○
104. *C. B:* 310. Cucumis vulgaris *Dod:* 651.

24. MELO vulgaris *Tourn:* 104. *C. B:* 310. Melo s: Melopepo ○
vulgo, Cucumis Galeni *Dod:* 652.

25. PEPO oblongus *Tourn:* 105. *C. B:* 311. Pepo major oblon- □
gus *Dod:* 654.

26. MOMORDICA vulgaris *Tourn:* 103. Balsamina rotundifolia △
repens s: mas *C. B:* 306. Balsamina *Matth:* 793.

27. BRYONIA [aspera s:] alba, baccis rubris *Tourn:* 102. *C. B:* ○
297. [Endast i handskriften på Leufsta].

28. CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore cœruleo *Tourn:* △
108. *C. B:* 94.

Campanula pulchra, a Tossano Carolo missa *J. B:* II. 807. Hujus varietas tantum est.

---

18. Malva mauritiana *β* L: Sp. I. 689, II. 970; H. 200. **19** & **20.** Malva Alcea L: Sp. I. 689, II. 971; H. 201. **21.** Hibiscus syriacus L: Sp. I. 695, II. 978; H. 205. **22.** Hibiscus Trionum L: Sp. I. 697, II. 981; H. 206. Jfr L: Hort. Cliff. p. 349. **23.** C. sativus L: Sp. I. 1012, II. 1437; H. 292. **24.** Cucumis Melo L: Sp. I. 1011, II. 1436; H. 292. **25.** Cucurbita Pepo *β* L: Sp. I. 1010, II. 1435; H. 291. **26.** Momordica Balsamina L: Sp. I. 1009, II. 1433; H. 293. **27.** B. alba L: Sp. I. 1012, II. 1438. **28** & **29.** C. latifolia L: Sp. I. 165, II. 233.

△ 29. CAMPANULA maxima, foliis latissimus, flore albo *Tourn:* 109. *C. B:* 95 [94].

Folia in hac specie glabra, ut et calyces.

○ 30. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici et triplici coeruleo *Tourn:* 109.

Calyces et folia aspera.

○ 31. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici albo *Tourn:* 109. Varietas antecedentis.

32. RUBIA tinctorum sativa *Tourn:* 114. *C. B:* 333. Rubia sativa *Matth:* 598. Rubia *Dod:* 349.

[Endast i Linnean Society's exemplar.]

II. INFUNDIBULIFORMES.

○ 33. NICOTIANA major latifolia *Tourn:* 117. *C. B:* 169. Hyoscyamus peruvianus *Dod:* 449.

○ 34. PETUM *Rivin: apud Rupp:* 24. Nicotiana minor. *Tourn:* 117. *C. B:* 170. Priapeia qvibusdam, Nicotiana [s. Tabacum minus] *J. B:* III. 630.

○ 35. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo *Tourn:* 119. Solanum foetidum, fructu [pomo] spinoso, oblongo *C. B:* 168.

▽ 36. PERVINCA vulgaris, latifolia, flore cæruleo *Tourn:* 119. Clematis daphnoides, major *C. B:* 302. *Dod:* 401. Vinca *Riv: apud Rupp:* 27.

● 37. JALAPA flore exalbido *Tourn:* 129. Solanum mexiocanum, flore magno, exalbido *C. B:* 168.

● 38. JALAPA flore purpureo *Tourn:* 129. Mirabilis *Riv: apud Rupp:* 1. Solanum mex: fl: mag: purp: s: Kermesino *C. B* :168. Mirabile peruvianum *Moris:* III. p. 592 [598.] s. 15. t. 1. f. 1. Viola peruviana *Tabern:* II. 31.

● 39. JALAPA flore ex purpureo et luteo mixto. *Tourn:* 129. Hæ tres tantum varietates.

□ 40. VALERIANA hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis *Tourn:* 132. *C. B:* 164. Valeriana hortensis *Dod:* 346. Phu magnum *Matth:* 34.

---

30 & **31.** C. Trachelium L: Sp. I. 166, II. 235. **32.** R. tinctorum *β* L: Sp. I. 109, II. 158; H. 28. **33.** N. Tabacum L: Sp. I. 180, II. 258, H. 45. **34.** Nicotiana rustica L: Sp. I. 180, II. 258; H. 45. **35.** Datura Stramonium L: Sp. I. 179, II. 255; H. 43. **36.** Vinca major L: Sp. I. 209, II. 304; saknas i Hort. Ups. **37—39.** Mirabilis Jalapa L: Sp. I. 177, II. 252; H. 43. **40.** V. Phu L: Sp. I. 32, II. 45; H. 13.

41. LOCUSTA *Riv: Mon: Irr:* [I. tab: 6]. Valerianella arvensis, × præcox, humilis, semine compresso *Tourn:* 132. Valeriana campestris, inodora, major *C. B:* 165. Olus album *Dod:* 634. [Album Olus *Dod:* 636]. Winter-rapuntsel.

42. PLANTAGO latifolia, rosea, floribus qvasi in spica dispo- ● sitis *Tourn:* 126. *C. B:* 189.

[Endast i handskriften på Leufsta].

INF: ET HYPOCRATERIFORM.

43. AURICULA Ursi, flore purpureo *Tourn:* 120. Sanicula al- ○ pina, purpurea *C. B:* 242.

44. AURICULA Ursi, flore magno, atropurpureo, holoserico, [simplici,] umbone candido, amplissimo *Tourn:* 120.

45. AURICULA Ursi, flore variegato *Tourn:* 121. Sanicula alpina, flore variegato *C. B:* 242.

Flos ex luteo et nigro variegatur; hæ tres plantæ tantum varietates sunt.

46. PRIMULA veris, hortensis, flore ferrugineo, umbellato ○ *Tourn:* 124. Est sylvestris nostra, colore floris diversa. Varietas pratensis.

47. PRIMULA veris caulifera, prolifera, odorata *Tourn:* 125. ○ Verbasculum proliferum *C. B:* 242. Primula veris prolifera *Tabern:* II. 33. Est eadem species ac illa, qvæ in pratis nostris et officinis prostat et ab eadem tantum calyce colorato differens.

48. PRIMULA veris pallido flore elatior *Tourn:* 124. Verba- ○ sculum pratense vel sylvaticum inodorum *C. B:* 241. Primula veris major *Dod:* 147.

Diameter disci floris är æqvalis med longitudo ejusdem, qva nota a sylvestri differt, cui alias satis similis.

49. PRIMULA veris prolifera, flore majore *Tourn:* 125. Varietas △ antecedentis calyce colorato.

50. PRIMULA veris multiflora, sylvestris *Tourn:* 124. *Tabern:* II. 34. Verbasculum sylvestre, magno plenoqve flore *C. B:* 242. Est eadem species fl: pleno.

---

41. Valeriana Locusta α olitoria L: Sp. I. 33, II. 47; H. 14. **42.** Pl. major γ L: Sp. I. 113, δ II. 163; jfr. Fl. Sv. (ed. I) sp. 122 & Hort. Ups. p. 29. **43.** Primula Auricula β L: Sp. I. 143, II. 205; H. 36. **44** & **45.** Primula Auricula var. L:; jfr Hort. Cliff. p. 50. 2. **46** & **47.** Pr. veris var. L: **48—50.** Pr. veris β elatior L: Sp. I. 143, II. 204; H. 37. Jfr Hort. Cliff. p. 50.

INFUND: ASPERIFOL: DICTÆ.

● 51. CERINTHE qvorundam [minor], flavo flore *Tourn:* 80. Cerinthe minor *C. B:* 258.

Denna hafwer *Tournefort* utan all skiähl fört till Campaniformes, som likwähl naturen så noga har hopfäst med Asperifoliis.

○ 52. SYMPHYTUM Consolida major, fl: purpureo, qvæ mas *Tourn:* 138. *C. B:* 259.

○ 53. SYMPHYTUM Consolida major, fl. albo, qvæ foemina *Tourn:* 138. *C. B:* 259.

54. BUGLOSSOIDES *Kram:* 106. Echioides flore pullo, calice amplo *Rivin: apud Rupp: edit: alt:* 177. Buglossum procumbens annuum, pullo minimo flore *Moris:* III. p. 439. s. 11. t. 26. f. 11.

Calyce inflato a Buglosso differt.

55. LITHOSPERMUM majus erectum *Tourn:* 137. *C. B:* 258. Lithospermum minus *Matth:* 596.

56. HELIOTROPIUM majus Dioscoridi *Tourn:* 139. *C. B:* 258 [253].

[Endast i handskriften på Leufsta.]

○ 57. BORRAGO floribus cæruleis *Tourn:* 133. Buglossum latifolium, Borrago flore cæruleo *C. B:* 256. Buglossum s: Borrago *Matth:* 757 [737].

○ 58. BORRAGO floribus albis *Tourn:* 133. Buglossum latifolium. Borrago flore candido *C. B:* 256.

Varietas prioris.

△ 59. ECHIUM vulgare. *Tourn:* 135. *C. B:* 254. Echium *Rivin: Monop: Irr:* [tab: 7. fig: 1].

[Endast i mss. på Leufsta.]

ROTATI.

× 60. SOLANUM fruticosum, bacciferum *Tourn:* 149. *C. B:* 166. Pseudocapsicum *Dod:* 706. Arbor.

---

51. C. minor L: Sp. I. 137, II. 196. **52** & **53.** S. officinale L: Sp. I. 136, II. 195. **54.** Lycopsis vesicaria L: Sp. I. 138, II. 198; H. 35. **55.** L. officinale L: Sp. I. 132, II. 189. **56.** H. europæum L: Sp. I. 130, II. 187; H. 33. **57** & **58.** Borago officinalis L: Sp. I. 137, II. 197; Borrago i Hort. Ups. p. 34 och Phil. Bot. **59.** E. vulgare L: Sp. I. 139, II. 200. **60.** S. Pseudocapsicum L: Sp. I. 184, II. 263; H. 48. 1.

61. PAPAS flore albo. Solanum tuberosum, esculentum, flore albo. *Tourn:* 149. *C. B:* [*Pin:* p:] 167. *Prodr:* 89 c. fig:. *Moris:* III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 19. Potatoes. ○

62. LYCOPERSICON Galeni *Tourn:* 150. Solanum pomiferum [fructu rotundo striato molli] *C. B:* 167. Aurea mala *Dod:* 706 [*Dod:* ed 1583 p. 455, ed. 1616. p. 458]. ○

63. CAPSICUM siliqvis longis, propendentibus *Tourn:* 152. Piper indicum, vulgatissimum *C. B:* 102. Piper indicum *Matth:* 400. Solanum urens [Capsicum dictum], siliqva propendente rubra *Moris:* III. p. 528. [s. 13. t. 2. f. 1]. ●

64. ALKEKENGI officinarum *Tourn:* 151. Solanum vesicarium *C. B:* 166. Solanum vesicarium [perenne] vulgatius repens, fructu et vesica rubra *Moris:* III. p. 526. s. 13. t. 3. f. 16. ○

65. LYSIMACHIA humifusa, folio rotundiore, flore luteo *Tourn:* 141. Nummularia major lutea *C. B:* 109 [309]. Nummularia supina s: Nummularia officinarum *Rupp:* 19. ○

66. ANAGALLIS phoeniceo flore *Tourn:* 142. *C. B:* 252. ○

[Endast i handskriften på Leufsta.]

67. BLATTARIA lutea, folio longo, laciniato (: rectius dentato) *Tourn:* 147. *C. B:* 240. Blattaria *Matth:* 718. Blattaria annua ramosa, floribus luteis, staminibus purpureis *Moris:* II. p. 489. 6. 5. t. 9. △

68. POLEMONIUM vulgare, cæruleum *Tourn:* 146. Valeriana cærulea *C. B:* 164. Vulneraria alata, Blattariæ flore cæruleo *Moris:* III. 608. [605.] ○

69. POLEMONIUM vulgare, album *Tourn:* 146. Valeriana alba *C. B:* 164. Varietas antecedentis a colore floris. ○

70. SANGVISORBA minor, montana, lævis, hirsuta *Rupp:* 58. Pimpinella Sanguisorba, minor, hirsuta *Tourn:* 157. *C. B:* 160. *Moris:* III. p: 263. s. 8. t. 18. f. 1. Stamina plurima. ○

71. SANGVISORBA major, pratensis *Rupp:* 58. Pimpinella Sangvisorba major *Tourn:* 156. *C. B:* 160. *Moris:* III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 7. ○

Spica rubra. Stamina 4.

---

61. Solanum tuberosum L: Sp. I. 185, II. 265; H. 48. 2. **62.** Solanum Lycopersicum L: Sp. I. 185, II. 265. **63.** C. annuum L: Sp. I. 188, II. 270; H. 47. **64.** Physalis Alkekengi L: Sp. I. 183, II. 262; H. 49. **65.** L. Nummularia L: Sp. I. 148, II. 211. **66.** A. arvensis L: Sp. I. 148, II. 211. **67.** Verbascum Blattaria L: Sp. I. 178, II. 254; H. 46. **68** & **69.** P. cæruleum L: Sp. I. 162, II. 230. **70.** Poterium Sanguisorba L: Sp. I. 994, II. 1411; H. 288. **71.** S. officinalis L: Sp. 1. 116, II. 169.

○ 72. SANGVISORBA canadensis, flore albo, spicato *Rupp:* 58. Pimpinella maxima, canadensis *Tourn:* 157. *Cornut:* 175. c. fig: bon: [tab: 174]. Pimpinella sangvisorba canadensis major, spicata, flore longiore albo *Moris:* II. p. 265. [264.] s. 8. t. 18. f. 12.

Spica longa alba. Stamina 4.

III. PERSONATI.

○ 73. ARUM vulgare, non maculatum *Tourn:* 158. *C. B:* 195. Arum *Rivin: mon: irr:* [I tab: 124].

○ 74. ARISTOLOCHIA Clematitis recta *Tourn:* 162. *C. B:* 307. *Moris:* III. p. 509. s. 12. t. 7. [17.] fig. 5. Aristolochia multiflora *Riv: mon: irr:* [I. tab: 116. Aristolochia saracenica *Dod:* 324.

□ 75. DIGITALIS purpurea *Tourn:* 165. Digitalis purpurea, folio aspero *C .B:* 243.

Variat fl: albo.

○ 76. GRATIOLA *Knaut:* 110. *Tabern:* II. 84. *Matth:* 471. Gratiola centauroides *C. B:* 279. Digitalis minima, Gratiola dicta *Tourn:* 165.

○ 77. SCROPHULARIA flore luteo *Tourn:* 166. *Riv: mon: irr:* [tab: 107]. *C. B:* [*Pin:* p:] 236. *Prodr:* 112. c. fig: Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo *Moris:* II. pag. 486. [482.] s. 5. t. 8. f. 2.

Labium superius petali dupplicatum..

○ 78. ADHATODA Zeylanensium *Tourn:* 175. *Herm: H: L: B:* 643. Ecbolium *Rivin: mon: irr:* [I. tab: 88]. Dictamno forte affinis, indica, arborescens, Lauri americani foliis s: Ecbolium Zeylanensium, foliis laurinis *Breyn: Prodr:* 2. 41. c. descr:.

79. ANTIRRHINUM flore albo, oris luteis *Tourn:* 168. Antirrhinum majus, alterum folio longiore *C. B:* 211. Antirrhinum I *Tabern:* II. 524.

IV. LABIATI.

○ 80. HORMINUM coma purpureo-violacea *Tourn:* 178. Horminum sativum *C. B:* 238.

---

72. S. canadensis L: Sp. I. 117, II. 169. **73.** A. maculatum L: Sp. I. 966, II. 1370; H. 279. **74.** A. clematitis L: Sp. I. 962, II. 1364; H. 279. **75.** D. purpurea L: Sp. I. 621, II. 866; H. 178. **76.** G. officinalis L: Sp. I. 17, II. 24. **77.** S. vernalis L: Sp. I. 620, II. 864; H. 177. **78.** Justicia Adhatoda L: Sp. I. 15, II. 20; H. 7. **79.** A. majus L: Sp. I 617, *β* II. 859; H. 175. **80.** Salvia Horminum L: Sp. I. 24, II. 34.

81. SCLAREA pratensis, foliis serratis, flore cæruleo *Tourn:* 197 [179]. Horminum pratense *Riv: mon: irr:* [I. tab: 36]. Horm: prat: foliis serratis *C. B:* 238. *Moris:* III. p: 393. △

82. SALVIA minor aurita et non aurita *Tourn:* 181. *C. B:* 237. ○

83. MOLDAVICA Betonicæ folio, flore cæruleo *Tourn:* 184. ○ Melissa peregrina, folio oblongo *C. B:* 229. Cedronella *Rupp:* 219. Pseudo Melissa *Rivin: mon: irr:* [I. tab: 73]. Melissa Moldavica *Matth:* 550.

84. MOLDAVICA Betonicæ folio, flore albo *Tourn:* 184. Varietas antecedentis.

[Endast i Linnean Society's handskrift.]

85. PULEGIUM *Rivin: mon: irr:* [I. tab: 23]. Pulegium latifolium *C. B:* 222. Mentha aqvatica s: Pulegium vulgare *Tourn:* 189.

86. MENTHA rotundifolia palustris s: aqvatica, major *Tourn:* ○ 189. *C. B:* 227. Mentha palustris spicata *Rivin: mon: irr:* [I. tab: 49]. Planta verticillata, minime spicata.

87. MENTHA rotundifolia, crispa, spicata *Tourn:* 189. *C. B:* 228. Mentha crispa *Riv: mon: irr:* [I. tab. 50]. Planta spicata, folia crispa, undulata.

88. MENTHA sylvestris, rotundiore folio *Tourn:* 189. *C. B:* 227. Menthastrum folio rugoso, rotundiore, s: spontaneum, flore spicato, odore gravi *J. B:* III. 219. [220]. Pl: spicata, folia oblonga, plana.

89. MELISSA hortensis *Tourn:* 193. *C. B:* 229. Melissa *Riv:* △ *mon: irr:* [I. tab: 45.]

90. LAVENDULA [Lavandula] angustifolia *Tourn:* 198. *C. B:* □ 216. Lavendula *Matth:* 29.

91. MAJORANA vulgaris *Tourn:* 199. *C. B:* 224. Majorana ○ *Riv: mon: irr:* [I. tab: 58]. Amaracus *Matth:* 487.

92. HYSSOPUS officinarum, cærulea s: spicata *Tourn:* 200. *C. B:* ○ 217. Hyssopus *Riv: mon: irr:* [I. tab: 68].

93. HYSSOPUS vulgaris alba *Tourn:* 201. *C. B:* 218. ○

---

81. Salvia pratensis L: Sp. I. 25, II. 35; H. 10. **82.** S. officinalis β L: Sp. I. 23, II. 34. **83** & **84.** Dracocephalum Moldavica L: Sp. I. 595, II. 830; 166. **85.** Mentha Pulegium L: Sp. I. 577, II. 807. **86.** M. aquatica L: Sp. I. 576, II. 805. **87.** M. crispa L: Sp. I. 576, II. 805; H. 168. **88.** M. viridis γ rotundifolia L: Sp. I. 576, II. 805. **89.** M. officinalis L. Sp. I. 592, II. 827; H. 163. **90.** Lavandula Spica L: Sp. I. 572, II. 800; H. 162. **91.** Origanum Majorana L: Sp. I. 590, II. 825; H. 161. **92—94.** H. officinalis L: Sp. I. 569, II. 796; H. 162.

○ 94. HYSSOPUS rubro flore *Tourn:* 201. *C. B:* 217.
Hæ tres tantum colore florum differunt.

○ 95. ROSMARINUS hortensis, angustiore folio *Tourn:* 195. *C. B:* 219 [217]. Rosmarinus *Riv: mon: irr:* [I. tab: 39]. Rosmarinum coronarium *Matth:* 524.

○ 96. THYMUS vulgaris, folio latiore, fl: purpureo *C. B:* 219. Thymus vulgaris, folio latiore *Tourn:* 196.

97. THYMUS vulgaris, folio latiore, fl: albicante *C. B:* 219.

○ 98. SATUREIA sativa *Tourn:* 197. Satureja *Riv: mon: irr:* [I. tab: 44]. Satureja hortensis s: Cunila sativa Plinij *C. B:* 218. Satureija annua, Cunila dicta, vulgaris *Moris:* III. p. 411. s. 11. t. 17. f. 1.

99. MASTICHINA *Boerh:* [*Ind: alt: pars prim:* pag:] 156. Marum *Riv: mon: irr:* [I. tab: 40]. Thymbra hispanica, Majoranæ folio *Tourn:* 197. Sampsuchus s: Marum, Mastichen redolens *C. B:* 224. Marum vulgare sive Clinopodium *Dod:* 271.

○ 100. VERBENA communis, cœruleo flore *Tourn:* 200. *C. B:* 269. Verbena [Verbenaca] *Matth:* 667.

○ 101. BETONICA purpurea *Tourn:* 203. *C. B:* 235. Betonica *Riv: mon: irr:* [I. tab: 28].

○ 102. BETONICA alba *Tourn:* 203. *C. B:* 235.
Varietas antecedentis.

○ 103. OCIMUM vulgatius *Tourn:* 204. *C. B:* 226. Ocymum majus [magnum] *Tabern:* II. 55.

104. SCORDIUM *C. B:* 247. Chamædrys palustris canescens, s: Scordium officinarum *Tourn:* 205.

105. CHAMÆPITYS lutea, vulgaris, s: folio trifido *Tourn:* 208. *C. B:* 249. Chamæpitys *Riv: mon: irr:* [tab: 14. f. 1]. *Matth:* 608. Chamæpitys *Dod:* 46.

106. MARUM *Matth:* 489. Pseudomarum *Riv: mon: irr:* [tab: 13]. Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis *Tourn:* 205. Tragoriganum latifolium *C. B:* 145 [223].

[Endast i Linnean Society's handskrift.]

---

95. R. officinalis *β* L: Sp. I. 23, II. 33; H. 11. **96, 97.** T. vulgaris *β* L: Sp. I. 591, II. 825; H. 160. **98.** Satureja hortensis L: Sp. I. 568, II. 795; H. 161. **99.** Satureja mastichina L: Sp. I. 567; Thymus Mastichina II. 827; Hort. Ups. 160. **100.** V. officinalis L: Sp. I. 20, II. 29. **101 & 102.** B. officinalis L: Sp. I. 573, II. 810; H. 164. **103.**? O. minimum var. L: Sp. I. 597, II. 833. **104.** Teucrium Scordium L: Sp. I. 565, II. 790. **105.** Teucrium Chamæpitys L: Sp. I. 562, II. 787; H. 160. **106.** Teucrium Marum L: Sp. I. 564, II. 788; H. 159.

V. CRUCIFORMES.

107. THLASPIDIUM foliis Iberidis *Rupp:* 259. *Dill: N: pl: gen:* 123 [tab: VI]. Thlaspi creticum qvibusdam, flore rubente *Tourn:* 213. Thlaspi umbellatum creticum, Iberidis folio *C. B:* 106. Thlaspi VI. [IIII] *Matth:* 395. Draba s: Arabis aut Thlaspi Candiæ *Dod:* 701.

108. NASTURTIUM hortense, vulgatum *Tourn:* 213. *C. B:* 103. ○ Nasturtium *Matth:* 394.

109. NASTURTIUM hortense, crispum. *Tourn:* 113 [213]. *C. B:* 104. Folia multifida, marginibus repandis. Varietas forte.

110. COCHLEARIA folio subrotundo *Tourn:* 215. *C. B:* 110. △ Cochlearia major batavica, subrotundo folio *Moris:* II. p. 308. s. 3. t. 2 [20]. f. 1. Cochlearia *Dod:* 583.

111. ARMORACIA *Rivin: apud Rupp:* 77. Cochlearia folio cubitali *Tourn:* 215. Raphanus rusticans *C. B:* 96. Raphanus rusticans et vulgaris *Matth:* 333. ○

112. LEPIDIUM latifolium *Tourn:* 216. *C. B:* 97. Lepidium *Fuchs:* 484. ○

113. BRASSICA capitata, alba *Tourn:* 219. *C. B:* 111. Brassica capitata albida *Dod:* 612. Brassica capitata *Matth:* 345. Hwit Hufwud kåhl. ○

114. BRASSICA alba vel viridis *Tourn:* 219. *C. B:* 111. Brassica vulgaris sativa *Dod:* 610. Hwit gemen kåhl. ○

115. BRASSICA cauliflora *Tourn:* 219. *C. B:* 111. *Dod:* 613.

116. KEIRI luteum, vulgare *Rupp:* 70. Leucojum luteum vulgare *Tourn:* 221. *C. B:* 202. Leucojum aureum *Matth:* 575. ○

117. HESPERIS montana, pallida, odoratissima *Tourn:* 222. ● *C. B:* 202. Hesperis montana, pallida, noctu olens *Volck:* 209. Flores ferruginei.

118. HESPERIS hortensis, flore purpureo *Tourn:* 222. *C. B:* 202. ○ *Moris:* II. p. 251. s. 3. t. 10. f. 1.

119. HESPERIS hortensis, flore candido *Tourn:* 222. *C. B:* 202. ○ Viola hyemalis flore albo II *Tabern:* II. 25. Varietas antecedentis.

---

107. Iberis umbellata L: Sp. I. 649, II. 906; H. 184. **108, 109.** Lepidium sativum *α* & *β* L: Sp. I. 644, II. 899; H. 183. **110.** C. officinalis L: Sp. I. 647, II. 903. **111.** Cochlearia Armoracia L: Sp. I. 648, II. 904. **112.** L. latifolium L: Sp. I. 644, II. 899. **113—115.** Br. oleracea var. L: Sp. I. 667, II. 932; H. 189. **116.** Cheiranthus Cheiri L: Sp. I. 661, II. 924; H. 187. 1. **117.** H. tristis L: Sp. I. 663, II. 927; H. 187. 1. **118—120.** H. matronalis L: Sp. I. 663, II. 927; H. 188. 2.

120. HESPERIS hortensis, flore pleno albo *Tourn:* 222. Antecedentis varietatis plenitudo.

121. NAPUS sativa, radice alba *Tourn:* 229. *C. B:* 95. Napus *Matth:* 331. *Dod:* 663.

○ 122. RAPHANUS major, orbicularis vel rotundus *Tourn:* 229. *C. B:* 96. Raphanus I *Matth:* 332 fl: purpurasc: Raphanus [Raphanis] s: Radicula satiua *Dod:* 665. Radix glabra, alba, terra tecta.

○ 123. RAPHANUS major, orbicularis vel rotundus, floribus candidis *Tourn:* 229. *C. B:* 96.

Velut in antecedenti flores purpurascunt, ita in hac candicant. Varietas prioris.

○ 124. RAPHANUS niger *Tourn:* 229. *C. B:* 95 [96]. Winter-Rättika. Radix terra tegitur, nigra, rugosa.

○ 125. RAPHANUS minor, oblongus *Tourn:* 229. *C. B:* 96. Raphanus II *Matth:* 333 [332]. Radicula satiua minor *Dod:* 655 [665]. Dimidia pars radicis supra terram visibilis evadit.

VI. ROSACEI.

○ 126. AMARANTHUS maximus, semine rubello, qvi granis rubris Petri Ciceæ [Ciecæ] *Tourn:* 235. *C. B:* 121.

Blitum paniculis propendentibus, semine rubro *Volck:* 66.

○ 127. PORTULACA latifolia s: sativa *Tourn:* 236. *C. B:* 288. Portulaca sativa *Dod:* 650.

○ 128. PAPAVER hortense, semine albo, sativum Dioscoridis [Dioscoridi], album Plinio *Tourn:* 237. *C. B:* 170.

Fl: albus.

129. PAPAVER pleno flore, album *Tourn:* 238. *C. B:* 171.

○ 130. PAPAVER hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridis [Dioscoridi], nigrum Plinio *Tourn:* 237. *C. B:* 170.

○ 131. PAPAVER pleno flore, nigrum *Tourn:* 238. *C. B:* 171.

○ 132. PAPAVER cristatum, floribus rubris, semine nigro *Tourn:* 237. *C. B:* 171.

Hæ omnes 5 plantæ varietates tantum sunt. Planta glabra.

○ 133. PAPAVER erraticum, majus, ῥοιας Dioscoridi, Theophrasto, Plinio *Tourn:* 218 [238]. *C. B:* 171.

---

121. Brassica Napus *β* L: Sp. I. 666, II. 931; H. 190. **122—125.** R. sativus *α* & *β* L: Sp. I. 669, II. 935; H. 188. **126.** A. caudatus L: Sp. I. 990, II. 1406; H. 285. **127.** P. oleracea *β* L: Sp. I. 445, II. 638; H. 146. **128—132.** P. somniferum L: Sp. I. 508, II. 726; H. 135. **133 & 134.** P. Rhæas L: Sp. I. 507, II. 726; H. 136.

134. PAPAVER erraticum pleno flore *Tourn:* 218 [238]. *C. B:* △
171. Varietas antecedentis. Hæc differt a priori specie caule hirsutie stricta obsito.

135. GLAUCIUM flore luteo *Tourn:* 254. Papaver corniculatum △
luteum *C. B:* 171. Papauer corniculatum majus *Dod:* 445.

136. OPUNTIA vulgo herbariorum *Tourn:* 239. Ficus indica, ●
folio spinoso, fructu majore *C. B:* 458. Ficus indica *Matth:* 211.

137. GRANADILLA Hispanis, Flos passionis Italis *Tourn:* 240. ●
Passiflora foliis crenatis, tripartito divisis *Pluk: Alm:* 295 [281] Clematis [Clematitis] trifolia, flore roseo, clavato *C. B:* 301. Granadilla triphylla, flore roseo, clavato *Volck:* 199.

138. EPIMEDIUM *Tourn:* 232. *C. B:* 323. *Moris:* II. p. 96 ○
[196]. s. 2. t. 20. f. 5.

[Cl. V. Cruciformes enl. Tourn.]

139. HYPECOUM [HYPECOON] latiore folio *Tourn:* 320 [230]. ○
Hypecoum *C. B:* 172. Hypecoon *Dod:* 446. Hypecoon siliqvis erectis, articulatis incurvis *Moris:* II. p. 279. Cuminum sylvestre *Matth:* 506.

Altför orätt blifwer nu denna förd af Tournefortius till Cruciformes, liksom den föregående.

140. RUTA hortensis, latifolia *Tourn:* 257. *C. B:* 336. Ruta ○
Matth: 493.

141. NIGELLA angustifolia, flore majori, simplici, coeruleo ○
Tourn: 258. *C. B:* 143 [145]. Melanthium damascenum *Dod:* 301.

142. NIGELLA flore majori, pleno, coeruleo *Tourn:* 258. *C. B:* ○
145. Plenitudo prioris.

143. ANACAMPSEROS radice Rosam spirante, major *Tourn:* ○
264. Rhodia radix *C. B:* 286. Telephium luteum, minus, radice Rosam redolente *Moris:* III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8.

144. GERANIUM Cicutæ folio, moschatum *Tourn:* 268. *C. B:* ○
319. *Rupp:* 272. Geranium supinum *Dod:* 63. Pediculus flores plurimos sustentat.

---

135. Chelidonium Glaucium L: Sp. I. 506, II. 724; H. 137. **136.** Cactus Opuntia L: Sp. I. 468, II. 669; H. 120. **137.** Passiflora incarnata L: Sp. I. 959, II. 1360; H. 278. **138.** E. alpinum L: Sp. I. 117, II. 171; H. 29. **139.** Hypecoum procumbens L: Sp. I. 124, II. 181; H. 31. **140.** R. graveolens γ L: Sp. I. 383, II. 548; H. 102. **141 & 142.** N. damascena α & β L: Sp. I. 534, II. 753; H. 153. **143.** Rhodiola rosea L: Sp. I. 1035, II. 1461; saknas i Hort. Ups. **144.** G. cicutarium β moschatum L: Sp. I. 680, G. moschatum Sp. II. 951; saknas i Hort. Ups.

145. GERANIUM folio Althææ *Tourn:* 268. *C. B:* 318. Geranium VI *Matth:* 568.

Folia integra fere.

○ 146. GERANIUM batrachiodes [batrachioides], flore variegato *Tourn:* 267. Ger: batrachiodes, fl: varieg: *C. B:* 318. Geranium anglicum [anglicanum] variegatum *Besl:* vern: [ord: I] fig. 9. Folia angulata, ad petiolum varie multifida, flores in uno petiolo solitarii, rarius duo.

△ 147. GERANIUM phæum s: fuscum, petalis reflexis [rectis] seu planis *Tourn:* 267. *Moris:* II. p. 516 [515]. Geranium montanum, fuscum *C. B:* 318. Secundum botanicos omnes. Geranium batrachiodes hirsutum, flore atrorubente *C. B:* ibd. secundum *Burserum* XVIII. 36. Gruinalis montana, petalis nigrofuscis et obscuris planioribus *Rupp:* 117. Floris petala reflexa, in medio floris macula nigra. Radix annua.

○ 148. VERATRUM flore subviridi *Tourn:* 273. Helleborus albus, flore subviridi *C. B:* 186. *Moris:* III. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1. Elleborum album *Matth:* 755.

○ 149. HELLEBORUS niger, hortensis, flore viridi *Tourn:* 272. *C. B:* 185. Helleborus niger sylvestris, ramosus, latiore folio [flore viridi] deciduo *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 5.

Caulis ramosus, multis floribus ornatus.

○ 150. HELLEBORUS niger, tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo *Tourn:* 272. Helleboroides hyemalis *Boerh:* I. 297. Aconitum unifolium, luteum, bulbosum *C. B:* 183. Helleborus Ranunculoides, præcox, tuberosus fl: luteo *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Aconitum *Rupp:* 149. Fl: singulari.

△ 151. HELLEBORUS niger, Ranunculi folio, flore globoso, majore *Tourn:* 272. Trollius *Rupp:* 149. Ranunculus montanus Aconiti folio, flore globoso *C. B:* 192 [182].

[Endast i Mss. på Leufsta.]

△ 152. RANUNCULUS echinatus, arvensis *Tourn:* 289. *C. B:* 179. *Moris:* II. p. 440. s. 4. t. 29. f. 23.

Semina plana, maxime echinata.

---

145. G. malacoides L: Sp. I. 680, II. 952; H. 198. **146.** G. pratense var. L: Sp. I. 681, II. 954. **147.** G. phæum L: Sp. I. 681, II. 953; H. 198. **148.** V. album L: Sp. I. 1044, II. 1479; saknas i Hort. Ups. **149.** H. viridis L: Sp. I. 558, II. 784; H. 158. **150.** H. hyemalis L: Sp. I. 557, II. 783; H. 158. **151.** Trollius europæus L: Sp. I. 556, II. 782. **152.** R. arvensis F: Sp. I. 555, II. 780.

153. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno *Tourn:* 290. △ *C. B:* 179. Ranunculus erectus, hortensis, fl: pleno *Besl: vern:* fol: 14 [13. fig: II.]

Caulis erectus.

154. RANUNCULUS dulcis, flore pleno. *Tourn:* 290. *C. B:* 179. ○

Caulis procumbens.

155. HEPATICA flore pleno, coeruleo *Rupp:* 146. *Dill: Nov: pl: gen:* 108. Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno, coeruleo *Tourn:* 287. Trifolium hepaticum, flore pleno *C. B:* 330.

156. HEPATICA flore pleno purpureo *Rupp:* 146. Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno purpureo *Tourn:* 287. Varietates.

157. ADONIS hortensis, flore atrorubente *C. B:* 178. *Dill: Nov:* ○ *pl: gen:* 109. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente *Tourn:* 291. Petala 5.

158. ADONIS montanus, perennis, flore amplo, luteo *Rupp:* 144. ○ Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice *Tourn:* 291. Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore *C. B:* 186. Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore *Boerh:* I. 35 [*Ind.* alt. pars]. Adonis præcox, perennis, flore luteo, calyce [caule] plano *Moris:* III. p. 26. s. 6. t. 9. f. 1. Helleborus Hippocratis *Tabern:* II. 398.

159. PENTAPHYLLOIDES rectum, fruticosum, eboracense ○ *Tourn:* 298. *Moris:* II. 193. descr.

160. FRAGARIA fructu parvi pruni magnitudine *Tourn:* 296. ○ *C. B:* 327. Fragaria fructu magno *Besl: vern:* 7. fol. 8.

161. CLEMATIS [CLEMATITIS] cœrulea, recta [erecta] *Tourn:* ○ 294. *C. B:* 300. Clematis pannonica, flore cœruleo surrecto *J. B:* II. 129. Flammula pannonica, folio Vincetoxici, flore amplo *Rupp:* 62.

Folia integra, fl: coerulei.

162. CLEMATIS [CLEMATITIS] s. Flammula repens *Tourn:* 294 [293]. *C. B:* 300. Flammula *Rupp:* [Fl. Jenens. (ed. I) 1718 p.] 61. *Dod:* [*Pempt.* ed. 1583 p.] 400. — Folia divisa, flores albi.

163. VITICELLA *Dill: Nov: pl: g.* 165. CLEMATIS [Clema- ○ titis] purpurea, repens *Tourn:* 294. *C. B:* 300. Clematis altera *Matth:* 617.

---

153. R. acris β L: Sp. I. 554, II. 779. **154.**? R. repens var. L; Sp. I. 554, II. 779. **155 & 156.** Anemone Hepatica var. L: Sp. I. 538, II. 758. **157.** A. annua β atrorubens L: Sp. I. 547, A. autumnalis II. 771. Hort. Ups. 156. 1 β. **158.** A. vernalis L: Sp. I. 547, II. 771; saknas i Hort. Ups. **159.** Potentilla fruticosua L: Sp. I. 495, II. 709; saknas i Hort. Ups. **160.** Fr. vesca β sativa L: Sp. I. 495, β pratensis II. 709; H. 133. **161.** Clematis integrifolia L: Sp. I. 544, II. 767; H. 156. **162.** Cl. Flammula L: Sp. I. 544, II. 766. **163.** Clematis Viticella L: Sp. I. 543, II. 765.

○ 164. ONAGRA latifolia *Tourn:* 302. Lysimachia lutea, corniculata *C. B:* 245. Lysimachia lutea, corniculata, non papposa, virginiana, major *Moris:* II. p. 271.

○ 165. CHAMÆNERION villosum, magno flore purpureo *Tourn:* 303. Epilobium hirsutum, magno flore et specioso *Dill:* 131. Lysimachia siliqvosa, hirsuta, major, fl: purpureo *C. B:* 245.

○ 166. CHRISTOPHORIANA americana ramosa [racemosa], baccis niveis *Tourn:* 299. *Moris:* II. p. 8. s. 1. t. 2. f. 7. Aconitum baccis nigris [niveis] *Cornut:* 76. [tab: 77].

○ 167. PHYTOLACCA americana, majori fructu *Tourn:* 299. Solanum virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis canaliculatis *Moris:* III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 22.

○ 168. ASPARAGUS sativa *Tourn:* 300. *C. B:* 489. Asparagus *Matth:* 349. Asparagus hortensis *Dod:* 691.

[Till Infundibuliformes i Linn. Soc:s ex.]

VII. UMBELLATI,

cujus nota characteristica est 1. *Flos* petalis 5 inæqvalibus, nudis. 2. *Stamina* 5. 3. *Pistillum* duplex reflexum. 4. *Fructus* 2:bus seminibus nudis infra florem.

§. 1. *Umbell: communi et partiali nuda.*

○ 169. ANETHUM hortense *Tourn:* 318. *C. B:* 147. Anethum *Dod:* 298 [296].

○ 170. IMPERATORIA major *Tourn:* 317. *C. B:* 156. Imperatoria *Riv: pent: irr:* [III. tab: 241]. *Matth:* 516.

○ 171. PASTINACA sativa, latifolia *Tourn:* 319. *C. B:* 155. Pastinaca domestica *Matth:* 500. Pastinaca latifolia sativa *Dod:* 680.

○ 172. PIMPINELLA Saxifraga major, umbella rubente *C. B:* 159. Tragoselinum majus, umbella rubente *Tourn:* 309.

---

164. Oenothera biennis L: Sp. I. 346, II. 492; H. 94. **165.** Epilobium hirsutum L: Sp. I. 347, II. 494. **166.** Actæa spicata *β* alba L: Sp. I. 504, II. 722; H. 138. **167.** Ph. americana L: Sp. I. 441, Ph. decandra II. 631; H. 117. **168.** A. officinalis *γ* altilis L: Sp. I. 313, II. 448; H. 84. **169.** A. graveolens L: Sp. I. 263, II. 377; H. 66. **170.** I. Ostruthium L: Sp. I. 259, II. 371; H. 65. **171.** P. sativa *β* L: Sp. I. 264, II. 378; saknas i Hort. Ups. **172 & 173.** P. Saxifraga *γ* & *δ* major L: Sp. I. 264, II. 378, jfr Hort Cliff. p. 107.

173. PIMPINELLA Saxifraga major, umbella candida *C. B:* 159. Tragoselinum majus, umbella candida *Tourn:* 309. ○

[Endast i handskriften på Leufsta.]

174. CHÆROPHYLLUM sativum *Tourn:* 314. *C. B:* 152. Cerefolium *Riv: pent: irr:* [III. tab: 276]. Chærophyllum [Chærefolium] *Dod:* 688. ○

175. ANISUM *Riv: pent: irr:* [III. tab. 306]. Anisum herbarijs, semine majore *C. B:* 158 [159]. Apium, Anisum dictum, semine suaveolente majori *Tourn:* 305. ●

[Endast i handskriften på Leufsta.]

176. APIUM dulce, Celeri Italorum *Tourn:* 305. Apium palustre et Apium officinarum *Tourn:* ibd. *C. B:* 154. Apium *Riv: pent: irr:* [III. tab: 314—317]. Eleoselinum *Dod:* 683. Celeri. ○

177. APIUM hortense s: Petroselinum vulgo *Tourn:* 305. *C. B:* 153. Apium hortense *Dod:* 682. *Matth:* 511. Persilia, grönpersilia. ○

178. APIUM vel PETROSELINUM crispum *Tourn:* 305. *C. B:* 153. Apium crispum *Riv: pent: irr:* [III. tab: 317]. *Tabern:* I. 251 [252]. A priori marginibus foliorum crispis differt. ×

§. II. *Umb: commun: nuda, partiali tecta.*

179. MYRRHIS vel Cicutaria odorata *Tourn:* 315. *C. B:* 160. Odorata *Riv: pent: irr:* [III. tab: 290]. Myrrhis perennis, alba, odorata *Moris:* III. p. 296 [301] s. 9. t. 10. f. 1. △

180. ANTHRISCUS geniculis nodosis *Mihi.* Chærophyllum sylvestre *C. B:* 162 [152]. Myrrhis *Riv: pent: irr:* [III. tab: 282]. Myrrhis annua, semine striato, levi *Tourn:* 315. ○

A MYRRHIDE omnino differt, hujusqve species est CHÆROPHYLLUM sylvestre, perenne, Cicutæ folio *Tourn:* qvod item a Chærophyllo maxime recedit.

Plura de hac et aliis in Methodo mea nova plantarum.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

181. CORIANDRUM majus *Tourn:* 316. *C. B:* 158. Coriandrum *Riv: pent: irr:* [III. tab: 303—305]. ○

---

174. Scandix Cerefolium L: Sp. I. 357, II. 368. **175.** Pimpinella Anisum L: Sp. I. 264, II. 379; Anisum Hort. Ups. 67. **176.** A. graveolens L: Sp. I. 264, II. 379; H. 67. **177.** A. Petroselinum L: Sp. I. 264, II. 379; H. 67. **178.** A. Petroselinum β L: Sp. I. 264, II. 379; H. 67. **179.** Scandix odorata L: Sp. I. 256, II. 368; H. 64. **180.** Chærophyllum temulum L: S. I. 258, II. 370; saknas i Hort. Ups. Jfr Hort. Cliff. 102. **181.** C. sativum F: Sp. I. 256, II, 367; H. 63.

§. III. *Umb: commun: et partiali tecta.*

○ 182. LEVISTICUM foliorum laciniis angulatis *Mihi.* Levisticum *Riv: pent: irr:* [III. tab: 293]. Ligusticum vulgare *C. B:* 157. Angelica montana, perennis, Paludapii folio *Tourn:* 313. Levisticum vulgare *Dod:* 309. Ligusticum vulgare an Libanotis fertilis Theophrasti? *C. B:* 157.

○ 183. LEVISTICUM foliorum laciniis serratis *Mihi.* Cicutaria latifolia, foetida *Tourn:* 322. *C. B:* 161. Cicuta [Cicutaria] latifolia, foetida [foetidissima] *Moris:* III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Cicuta [Cicutaria] foetida *Tabern:* II. 465.

○ 184. PEUCEDANUM germanicum *Tourn:* 318. *C. B:* 149. Peucedanum majus, brevioribus foliis germanicum *Moris:* III. p: 312. s: 9. t: 15. f: 2.

185. FOENICULUM vulgare, germanicum *Tourn:* 311. *C. B:* 147. Foeniculum *Dod:* 295. *Matth:* 517.

○ 186. MEUM foliis Anethi *Tourn:* 312. *C. B:* 148. Meum *Dod:* 302. Meum vulgare tenuifolium *Moris:* III 270.

○ 187. ANGELICA sativa *C. B:* 155. *Matth:* 729. Imperatoria sativa *Tourn:* 317.

○ 188. DAUCUS sativus, radice lutea *Tourn:* 307. Pastinaca tenuifolia, sativa *C. B:* 151. *Dodon: Pempt:* 678. Staphylinus sativus *Riv: pent: irr:* [III. tab. 262].

○ 189. SISARUM Germanorum *Tourn:* 309. *C. B:* 155. Sisarum *Riv: pent: irr:* [III. tab: 289]. Siser [I] *Matth:* 334.

190. ASTRANTIA major, corona floris purpurascente *Tourn:* 314. Astrantia nigra major *Moris:* III. p. 279. s. 9. t. 4. f. 1. Helleborus niger Saniculæ folio major *C. B:* 185. Veratrum nigrum Dioscoridis *Dod: Pempt:* 387. Floret Junio.

[Endast i Linn: Society's handskrift.]

§. IV. *Umb: commun: tecta, partiali nuda.*

Planta nulla in hortis nostris colitur umbella communi calyce donata et partiali nuda, nec talis in Svecia invenitur præter LASERPITIUM foliis latioribus, lobatis *Tourn:* (324).

---

182. Ligusticum Levisticum L: Sp. I. 250, II. 359; H. 62. **183.** Ligusticum peloponnesiacum L: Sp. I. 250, II. 360; H. 62. **184.** P. officinale α F: Sp. I. 245, II. 353: H. 60. **185.** Anethum Foeniculum L: Sp. I. 263, II. 377; H. 66. **186.** Athamantha Meum L: Sp. I. 245, II. 353; H. 60. **187.** A. Archangelica L: Sp. I. 250, II. 360; saknas i Hort. Ups. **188.** D. Carota β L: Sp. I. 242, II. 348; H. 50. **189.** Sium Sisarum. L: Sp. I. 251, II. 361; H. 62.

VIII. CARYOPHYLLÆI.

191. CARYOPHYLLUS totus albus *Tourn:* 230 [330]. ●
[Endast i handskriften på Leufsta.]

192. CARYOPHYLLUS rubens et sanguineus *Tourn:* 230 [330]. ○
[Endast i handskriften på Leufsta.]

193. CARYOPHYLLUS simplex, hortensis, versicolor *Tourn:* 331.

Onödigt är att sig mycket bemöda om de många slags näglickor, som finnas i trädgårdarna, emädan de mäst äro varietates; och kunna beqvämligen skillias

1. uti de som hafwa pistillos så långa som petala och de som hafwa kortare. 2. de som hafwa petala bifida äl:r integra äl:r laciniata. 3. hwars calyx går uht in setam och är längre än blomman äl:r kortare. Här behåller jag nomen caryophylli, som likwähl eij i dett minsta är slächt till *Caryophyllus aromaticus* och kan derför häldre kallas *Tunica.* Men här will jag fly och achta mig för noviteter, hwar af jag tänker giöra profession uti min Methodo plantarum naturali et nova.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

194. CARYOPHYLLUS latifolius, floribus umbellatis, rubris ○
Mihi. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius *Tourn:* 332. *C. B:* 208. Caryophyllus carthusianorum *Tabern:* II. 3. Tunica latifolia, floribus umbellatis *Rupp:* 106. Fl: purpureo.

195. CARYOPHYLLUS barbatus, hortensis, latifolius, albus. *Tourn:* 332. *C. B:* 209. Tunica.

196. CARYOPHYLLUS barbatus, hortensis, latifolius, diversi- ○
color *Tourn:* 332. *C. B:* 209. Tunica.

Varietates. Flores in capitulum æqvale congesti, qvorum sqvamæ calycum in setas desinunt longitudine cum petalis æqvales.

197. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo, major *Tourn:* 234 [334.] ○
C. B: 203. Lychnis calcedonica *Tabern:* II. 9. Calyx cylindraceus, hirsutus, ut et tota planta.

198. LYCHNIS coronaria Dioscoridis sativa, flore rubro, veluti ○
flammeo, fulgente *Tourn:* 334. *C. B:* 203. Lychnis coronaria sativa, flore rubro *Moris:* II. p. 540. Lychnis coronaria *Dod:* 170.

191—193. Dianthus Caryophyllus L: Sp. I. 410, II. 587; H. 104. 1. **194—196.** Dianthus barbatus L: Sp. I. 409, II. 586; H. 105. 6. **197.** Lychnis chalcedonica L: Sp. I. 436, II. 625; H. 115. **198 & 199.** Agrostemma Coronaria L: Sp. I. 436, II. 625; H. 115.

△ 199. LYCHNIS coronaria Dioscoridis sativa, flore dilute rubente *Tourn:* 334. *C. B:* 203. Varietas antecedentis. Calycis laciniæ longitudine cum petalis æqvales evadunt.

○ 200. LYCHNIS sylvestris, qvæ Saponaria vulgo *Tourn:* 336. Saponaria major, lævis *C. B:* 206. Saponaria vulgaris simplex *Moris:* II. p. 547. [s. 5. t. 22. f. 52.]

201. LYCHNIS purpurea, multiplex *Tourn:* 335. *C. B:* 204. Calyx globosus et inflatus.

○ 202. LYCHNIS viscosa, purpurea, latifolia, lævis *Tourn:* 335. *C. B:* 205. Armerius flos quartus *Dod:* 179 [176.] Viscaria sativa *Tabern:* II. 14. Fructus 3 locularis, planta annua.

○ 203. LYCHNIS frutescens, myrtifolia, Behen albo similis *Tourn:* 335. *C. B:* 205. Ocimoides fruticosum *Camer: Hort: M:* p. 109. fig: XXXIII.

Trilocularis, perennis.

○ 204. CUCUBALUS *Tourn:* 339. Alsine scandens, baccifera *C. B:* 250. Cucubalus [Cacubalum] qvibusdam, vel Alsine baccifera *J. B:* II. 175.

○ 205. LINUM sativum *Tourn:* 339. *C. B:* 214.

IX. LILIACEI.

○ 206. LILIO-ASPHODELUS luteus *Tourn:* 344. [Liliosphodelus] luteus *Svert:* I. tab: 47. Lilium luteum, Asphodeli radice *C. B:* 80. Asphodelus liliaceus, luteus [I] *Tabern:* II. 346. Fl: lutei sed distincta species, qvamqvam admodum [seqventi] similis.

○ 207. LILIO-ASPHODELUS phoeniceus *Tourn:* 344. Lilium rubrum, Asphodeli radice *C. B.* 80. Asphodelus liliaceus rubens [II] *Tabern:* II. 346. Flores rubicundi, caulis altior.

○ 208. HYACINTHUS orientalis, caule maculato *Tourn:* 345. *C. B.* 44. Hyacinthus orientalis *Matth:* 669.

Variorum colorum.

---

200. Saponaria officinalis L: Sp. I. 408, II, 584; H. 106. **201.** L. dioica var. L: Sp. I. 437, II. 626; Cucubalus Hort. Cliff. 171. 5 var. **202.** Silene Armeria L: Sp. I. 420, II. 601; H. 110. **203.** Silene fruticosa L: Sp. I. 417, II. 597; H. 111. **204.** C. bacciferus L: Sp. I. 414. II. 591; H. 109. **205.** L. usitatissimum β L: Sp. I. 277, II. 397; H. 71. **206.** Hemerocallis Lilio-Asphodelus α flavus L: Sp. I. 324, Hemerocallis flava II. 462; H. 88. 1. β. **207.** Hemerocallis Lilio-Asphodelus β fulvus L: Sp. I. 324. Hemerocallis fulva II. 462; H. 88. 1 α. **208.** H. orientalis L: Sp. I. 317, II. 454; H. 85. 1.

209. MUSCARI obsoletiore flore *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus, moschatus *C. B.* 43. Bulbus vomitorius *Matth:* 415. Flores ovati. △

210. MUSCARI arvense, juncifolium, coeruleum, minus *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus, coeruleus, minor, juncifolius *C. B:* 43. Hyacinthus racemosus *Dod:* 217. Hyacinthus coeruleus VI. *Tabern:* II. 320. Flores globosi. ○

211. MUSCARI arvense, latifolium, purpurascens *Tourn:* 347. Hyacinthus comosus, major, purpureus *C. B:* 42. V. △

[Endast i handskriften på Leufsta.]

212. COLCHICUM commune *Tourn:* 348. *C. B.* 67. ○

213. COLCHICUM pleno flore *Tourn:* 348 [349.] *C. B:* 69.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

214. CROCUS vernus, angustifolius, magno flore violaceo *Tourn:* 352. *C. B:* 67. ○

215. CROCUS vernus, angustifolius, magno flore candido. *Tourn:* 352. *C. B:* 67. ○

216. CROCUS vernus, angustifolius, variegatus *Tourn:* 352 [353.] *C. B:* 67. Color floris albus, lineis purpureis pictus.

Hi tres Croci tantum varietates sunt.

Tempore florendi maxime differunt, qvoad totum habitum alias cum autumnali conveniunt, hinc tantum varietates ejus erint.

217. CROCUS sativus *Tourn:* 350. *C. B:* 65. △

Autumno flores coeruleos profert.

218. NARCISSUS albus, circulo purpureo *Tourn:* 353. *C. B:* 48. Narcissus medio purpureus *Dod:* 223. ○

Corolla petalis brevior, monanthos.

219. NARCISSUS totus niveus, multiplex *Tourn:* 357. *C. B:* 54. Narcissus albus, pleno flore *Svert:* 1. tab: 26. f: 5. ○

Plenitudo antecedentis.

220. NARCISSUS sylvestris, pallidus, calyce luteo *Tourn:* 356. *C. B:* 52. Narcissus luteus, sylvestris. *Dod:* 227. Pseudo-Narcissus luteus, simplici [& gemino] flore *Tabern:* II. 31 [311]. Corolla petalis æqvalis, monanthos. ○

---

209. Hyacinthus Muscari L: Sp. I. 317, II. 454; H. 85. 3. **210.** Hyacinthus racemosus L: Sp. I. 318. II, 455; deest in Hort. Ups. **211.** Hyacinthus comosus L: Sp. I. 318, II. 455; deest in Hort. Ups. **212 & 213.** C. autumnale *α* & *β* L: Sp. I. 341., II. 485; H. 90. **214—216.** Cr. sativus *β* vernus L: Sp. I. 36, II. 50; H. 15. **217.** Cr. sativus *α* officinalis L: Sp. I. 36, II. 50; H. 15. **218.** N. poeticus L: Sp. I. 289, II. 414; H. 74. 1 *α*. **219.**? N. poeticus L: var. **220.** N. Pseudo-Narcissus L: Sp. I. 289, II. 414; H. 74. 2.

○ 221. NARCISSUS multiplex, totus flavus *Tourn:* 357. *C. B:* 54. Plenitudo antecedentis.

222. NARCISSUS medio luteus, copioso flore, odori gravi *Tourn:* 354. *C. B:* 50. Narcissus medio luteus alter *Dod:* 224. Polyanthos.

○ 223. IRIS vulgaris, germanica s: sylvestris *Tourn:* 358. *C. B:* 30. Iris vulgaris, violacea s: purpurea [hortensis et] sylvestris *J. B:* II. 709. Folia erecta, ensiformia.

○ 224. IRIS hortensis, latifolia *Tourn:* 358 *C. B:* 31.
[Endast i handskriften på Leufsta.]

○ 225. IRIS lutea, variegata *Tourn:* 360.
Iris lutea, sativa *C. B:* 72 [32.] Flores ex luteo et coeruleo eleganter picti. Caulis humilis.

226. IRIS bulbosa, tota violacea vel coerulea *Chabr:* 239.
Flores maximi, pallidi, cærulei, caulis cubitalis.
[Endast i Linnean Soc:s handskrift.]

○ 227. IRIS pratensis, angustifolia, non foetida, altior *Tourn:* 361. *C. B:* 32.
[Endast i handskriften på Leufsta.]

228. IRIS pratensis, angustifolia, humilior *C. B:* 37 [32.]
Folia graminea, procumbentia.
[Endast i Linn: Soc:s handskrift.]

229. IRIS graminea, cui pereunt qvotannis folia, flore variegato *Chabr:* 243. Folia graminea, erecta.
[Endast i Linnean Soc:s handskrift.]

○ 230. GLADIOLUS floribus uno versu dispositis, major et procerior *Tourn:* 365. *C. B:* 41. Gladiolus *Riv: mon: irr:* [I. tab: 110.]

○ 231. TRADESCANTIA folio gramineo, flore coeruleo minori *Mihi.* Ephemerum virginianum, flore coeruleo minori *Tourn:* 368. Allium s: Moly virginianum *C. B: app:* 516.

● 232. ALOË vulgaris *Tourn:* 366. *C. B:* 286. Aloë *Matth:* 463. *Dod:* 355. Folia ad margines ubiqve aculeis minus acutis instruuntur.

221.? N. Pseudo-Narcissus L: var. **222.** N. Tazetta L: Sp. I. 290, II. 416; H. 74. 3. **223.** I. germanica L: Sp. I. 38, II. 55; H. 16. 1. **224.**? I. germanica L: var.; cfr. Hort. Cliff. 18 & Hort. Ups. 16. 1. **225.** I. variegata L: Sp. I. 38, II. 56; H. 16. 2. **226.**? I. Xiphium β L: Sp. I. 40, II. 58; H. 17. 7. **227.** I. sibirica L: Sp. I. 39, II. 57; H. 17. 4. **228.**? I. sibirica L: var. vel? I. spuria L: Sp. I. 39, II. 58; H. 17. 5. **229.** I graminea L: Sp. I. 39, II. 58; H. 17. 6. **230.** Gl. communis L: Sp. I. 36, II. 52; H. 16. **231.** Tr. virginiana L: Sp. I. 288, II: 411; H. 73. **232.** A. vera L: Sp. I. 320, A. perfoliata π vera S. II. 458; H. 86. 3.

233. ALOË folio in oblongum aculeum (abeunte) *Tourn:* 366. × *C. B:* 286. *Moris:* II. p: 415. s. 4. t. 22. f. 2 & 3. Aloë ex America *Dod:* 355. Aloë spuria s: Metl Americanorum *Rupp:* 364. Folia in aculeos rigidos et acutissimos desinunt.

Vid: *El: Brenner Poet: Dichter* p: 222 et 229 [224.]

234. ALOË africana, margaritifera, minor *Rupp:* 261.

Folia Sedi s: Sempervivi simillima, hinc illinc verrucis glabris margaritis similibus ornata.

235. YUCCA [YUCA] foliis Aloës *Dill: N: pl: gen:* [p:] 111. ○ [tab. V.] et *C. B:* 91. *Moris:* II. p. 419. s. 6 [4.] t. 23. f. 1.

236. CANNACORUS latifolius vulgaris *Tourn:* 367. Arundo ○ indica latifolia *C. B:* 19.

237. PHALANGIUM flore majore s: minus ramosum *Rupp:* 142. ○ Phalangium aliud pulchrius, emaculato Lilii candore [conspicuum] *Chabr:* 222.

238. ORNITHOGALUM majus spicatum, flore albo *Tourn:* 379. ○ *C. B:* 70.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

239. ORNITHOGALUM spicatum, flore viridi lactescente *C. B:* 70. *Tourn:* 318 [379.] Flores in caule sparsi.

[Eadem ac præcedente?]

[Endast i Linn. Soc:s handskrift.]

240. ORNITHOGALUM umbellatum, medium, angustifolium ○ *Tourn:* 378. *C. B:* 70.

Flores in umbellam congesti.

241. STELLARIS floribus per caulem sparsis, coeruleis *Mihi.* Ornithogalum coeruleum, byzantinum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, cæruleus, amoenus *C. B:* 46.

Flores sparsi in caulem homomalli.

242. STELLARIS floribus in spicam congestis, coeruleis *Mihi.* ○ Ornithogalum bifolium, germanic: coeruleum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, bifolius, germanicus *C. B:* 45.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

---

233. Agave americana L: Sp. I. 323, II. 461; H. 87. **234.** Aloë pumila *β* L: Sp. I. 322, II. 460; deest in Hort. Ups. **235.** Yucca gloriosa L: Sp. I. 319, II. 456; H. 88. 1. **236.** Canna indica L: Sp. I. 1, II. 1; H. 1. 1. **237.**? Anthericum Liliago L: Sp. I. 310, II. 445; H. 83. 4. Cfr. *Ruppii* Flora Jenensis ed. III (1745) p. 150. **238.** O. narbonense L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 312; Sp. II. 440. **239.**? O. comosum L: Am. Ac. loc. cit,. Sp. II. 440. Cfr. O. pyrenaicum L: Sp. I. 306, II. 440; It. Scan. p. 220; desunt in Hort. Ups. **240.** O. umbellatum L: Sp. I. 307, II. 441; H. 84. 2. **241.** Scilla amoena L: Sp. I. 309, II. 443. **242.** Scilla bifolia L: Sp. I. 309, II. 443.

243. STELLARIS *Dill:* (*N. pl. g. p.* 110). Ornithogalum spicatum, cinereum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, spicatus, coeruleus [cinereus] *C. B:* 46. Flores in spicam congesti.

[Endast i Linn. Soc:s handskrift.]

○ 244. LILIUM album vulgare *Tourn:* 369. Lilium album, flore erecto et vulgare. *C. B:* 76. Lilium *Matth:* 547.

○ 245. LILIUM purpureo-croceum, majus *Tourn:* 369. *C. B:* 76. Lilium purpureum tertium *Dod:* 199. Lilium cruentum bulbiferum *Besl: vern.* 5. f: 7.

Bulbi in alis foliorum.

○ 246. LILIUM floribus reflexis montanum, flore rubente *Tourn:* 370. *C. B:* 77. Martagon sylvaticum *Rupp:* 118. Lilium flore nutante ferrugineo, majus vel minus *J. B:* II. 692.

△ 247. LILIUM floribus reflexis montanum, flore albicante *Tourn:* 370. *C. B:* 77. Varietas antecedentis.

○ 248. TUSAI corolla simplici sublutea. Corona Imperialis *Tourn:* 372. *Dod:* 202. Lilium s: Corona Imperialis *C. B:* 79.

○ 249. FRITILLARIA præcox, purpurea, variegata *Tourn:* 377. *C. B:* 64. Meleagris *Dod:* 233.

× 250. FRITILLARIA alba, præcox *Tourn:* 377. *C. B:* 64.

○ 251. FRITILLARIA alba, variegata *Tourn:* 377. *C. B:* 64.

Flores in caule solitarii.

△ 252. FRITILLARIA polyanthos, flavo-viridis *Tourn:* 377. *C. B:* 64. Flores 4, 5 à 7 in eodem caule.

253. TULIPA lutea, lituris qvibusdam viridibus et sanguineis distincta, flore maximo, laciniato *Tourn:* 376.

Petala laciniata.

[Endast i Linn: Soc:s handskrift.]

○ 254. LEUCOIUM bulbosum, vulgare *C. B:* 55. Narcisso-Leucoium vulgare *Tourn:* 387. Leucojum [Leucoion] bulbosum, hexaphyllum [hexaphyllon] *Dod:* 230. Narcissus VIII *Matth:* 770.

Petala æqvalia.

255. GALANTHOS minor fl: albo. Leucoium bulbosum, trifolium, minus *C. B:* 56. Narcisso-Leucoium trifolium, minus *Tourn:* 387. Leucojum [Leucoion] bulbosum, triphyllum [triphyllon] *Dod:* 230.

243.? Scilla italica L: Sp. I. 308, II. 442; desunt in Hort. Ups. **244.** L. candidum L: Sp. I. 302, II, 433; H. 80. 1. **245.** L. bulbiferum L: Sp. I. 302, II. 433; H. 80. 2. **246 & 247.** L. Martagon L: Sp. I. 303, II. 435; H. 81. 4. **248.** Fritillaria imperialis L: Sp. I. 303, II. 435; H. 82, 4. **249—252.** F. Melagris F: Sp. I. 304, II. 436; H. 81. 1. **253.** T. gesneriana L: Sp. I. 306, II. 438; H. 82. **254.** Leucojum vernum L: Sp. I. 289, II. 414; H. 74. **255.** Galanthus nivalis L: Sp. I. 288, II. 413; H. 73.

Petala alterna dissimilia.

Ab antecedenti abunde organis generationis differt. Hanc vocavi Galanthos l. a Svec: galant ob floris pulchritudinem l. a γαλα ab ejusdem candore lacteo.

256. ALLIUM latifolium, luteum *Tourn:* 384. Moly latifolium, luteum, odore Allii I. *C. B:* 75. *Moris* II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 3 [4.] Moly flavo flore *Svert:* I. t. 60. f. 2. Flores in umbellam congesti. ○

257. ALLIUM montanum, latifolium, maculatum [*Tourn:* 383.] *C. B:* 74. Moly alpinum, caule maculato *Rupp:* 138. Victorialis longa *Besl: vern:* 4. f. 13. Allium alpinum. Victorialis mas *Tabern:* II. 195. Flores homomalli. ×

258. ALLIUM sativum *Tourn:* 387 [383.] *C. B:* 73. Radix multifida. ○

259. ALLIUM sativum, alterum s: Allioprasum caulis summo circumvoluto. *Tourn:* 383. *C. B:* 73. *Moris:* II. p. 383 [387.] s. 4. t. 15. f. 10. Råckenbåll. Radix integra. ○

260. PORRUM commune, capitatum *Tourn:* 382. *C. B:* 72. Porrum commune *Matth:* 386. Porrum *Tabern:* II: 192. ○

261. CEPA vulgaris, floribus et tunicis purpurascentibus *Tourn:* 382. *C. B:* 71. ○

262. CEPA vulgaris, floribus et tunicis candidis *Tourn:* 382. *C. B:* 71. Varietas. Ambo nomine Rödlök venduntur.

263. CEPA ascalonica *Tourn:* 382. *Matth:* 389. Cepa sterilis *C. B:* 72. Eschalottes. Flores nostris in oris nunqvam profert. ×

264. CEPA sectilis, juncifolia, perennis *Tourn:* 383. Porrum sectivum, juncifolium *C. B:* 12 [72.] Gräslök. ○

265. CEPA oblonga *Tourn:* 382. *C. B:* 71. *Dod:* 675. Piplök. Johannislök. Folia concava, rotunda, crassitie digiti minimi. ○

---

256. A. Moly L: Sp. I. 301, II. 432; H. 76. 1. **257.** A. Victorialis L: Sp. I. 295, II. 424; deest in Hort. Ups. **258.** A. sativum L: Sp. I. 296, II. 425; H. 76. 2 (»Hvitlök»). **259.** A. Scorodoprasum β L: Sp. I. 297, II. 425; H. 77* (»Råcken-båll»). **260.** Allium Porrum L: Sp. I. 295, II. 423; H. 774. (»Purio»). **261 & 262.** Allium Cepa L: Sp. I. 300, II. 431; H. 77. 3 (»Röd-lök»). **263.** Allium L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 454, Sp. II. 429. H. 79. 9. (»Charlotter».) **264.** Allium Schoenoprasum L: Sp. I. 301, II. 432; H. 79. 8 β (»Gräslök».) **265.** Allium fistulosum L: Sp. I. 301, II. 432; H. 78. 7 (»Piplök»).

X. PAPILIONACEI.

○ 266. FABA rotunda, oblonga, s: cylindracea, minor, s: eqvina alba. *Tourn:* 392. Faba minor s: eqvina *C. B:* 338. Gemena Bönor.

○ 267. FABA rotunda, oblonga, s: cylindracea, minor, s: eqvina nigra *Tourn:* 393 [392.] Faba minor fructu nigro *C. B:* 338.

Varietas prioris seminibus nigris.

○ 268. FABA flore candido, lituris nigris conspicuo *Tourn:* 391 *C. B:* 338. Faba major *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 148] A prima magnitudine duppla differt. Wälska bönor.

○ 269. FABA fructu ex purpura nigrescente *Tourn:* 392. *C. B:* 338. Seminibus nigris a priori differt.

● 270. LUPINUS sativus, flore albo. *Tourn:* 392. *C. B:* 347. Lupinus flore albo *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 150.] Lupinus *Matth:* 328.

271. LUPINUS angustifolius, coeruleus, elatior *Tourn:* 392.

272. LUPINUS sylvestris, flore luteo *Tourn:* 392. *C. B:* 348. Lupinus flore luteo *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 151].

Varietates tres fl: colore variantes.

○ 273. PHASEOLUS vulgaris *Tourn:* 412. Smilax hortensis s: Phaseolus major *C. B:* 339. Phaseolus *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 155]. Semina alba.

274. PHASEOLUS vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituris distincto *Tourn:* 412. Semina alba nigris lituris picta.

275. PHASEOLUS vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato *Tourn:* 412. Semina purpurea venis nigris ornata. Hæ tres caule scandente a reliqvis differunt.

276. PHASEOLUS puniceo flore *Tourn:* 414. Phaseolus indicus, fl. coccineo sive puniceo *Moris:* II. p. 69. s. 2. t. 5. f. 4. Caulis vix cubitalis, erectus.

277. PISUM cortice eduli *Tourn:* 394. Pisa sine cortice duriore *C. B:* 343. Pisa leptoloba, qvæ simul cum folliculis comeduntur. *Volck:* 333. Siliqvæ destiuuntur membrana interiori cartilaginea.

278. PISUM hortense, siliqva maxima *Tourn:* 394. Siliqvæ maximæ, planæ.

266—269. Vicia Faba L: Sp. I. 737, II. 1039; H. 218. Enl. Hort. Cliff. **270.** L. albus. L: Sp. I. 721, II. 1015; H. 209. **271.** L. angustifolius L: Sp. I. 721, II. 1015; saknas i Hort. Ups. **272.** L. luteus L: Sp. I. 722, II. 1015; H. 209. **273—275.** Ph. vulgaris L: Sp. I. 723 II. 1016; H. 213. **276.** Ph. coccineus L: Sp. I. 724, Ph. vulgaris β coccineus Sp. II. 1016. **277—282.** P. sativum L: Sp. I. 727, II. 1026; H. 215. Enl. Hort. Cliff.

279. PISUM hortense, majus, flore fructuqve variegato *Tourn:* 394. *C. B:* 343 [342.]

280. PISUM hortense, fructu nigra linea maculato *Tourn:* 394. Sub fructu intelliguntur semina.

281. PISUM arvense, fructu viridi *Tourn:* 394. *C. B:* 342 [343.] Gröna ärter.

282. PISUM arvense, fructu albo *Tourn:* 394. *C. B:* 342 [343.] Siliqvæ in his duobus posterioribus cylindraceæ, in antecedentibus autem planæ.

283. LATHYRUS sativus, fl: purpureo *Tourn:* 395. *C. B:* 343 [344.] Lathyrus siculus *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 170.] Radix annua, folia rotunda. Odor floris moschatus.

284. LATHYRUS arvensis, repens, tuberosus *Tourn:* 395. *C. B:* 334 [344.] Lathyrus arvensis *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 167]. Lathyrus arvensis, radice tuberosa, repente *Moris:* II. p. 51. s. 2. t. 2. f. 1. Pseudoapios *Matth:* 785. Radix perennis, folia rotunda.

285. LATHYRUS angustissimo folio, americanus, variegatus *Tourn:* 395. *C. B:* 344. Folia angustissima, acuta. Flos eleganter variegatus ex albo, nigro et purpureo.

286. CLYMENUM hispanicum, flore vario, siliqva plana *Tourn:* 396.

287. HEDYSARUM clypeatum, flore suaviter rubente *Tourn:* 401. Onobrychis semine clypeato, aspero, major *C. B:* 350.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

288. LOTUS ruber, siliqua angulosa *Tourn:* 403. *C. B:* 332. Lotus tetragonolobos, flore ruberrimo [rubro] *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 205]. Lotus siliquosa, flore fusco tetragonolobus *J. B:* II. 358.

289. MELILOTUS officinarum Germaniæ, flore luteo *Tourn:* 407. *C. B:* 331.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

290. MELILOTUS officinarum Germaniæ, flore albo *Tourn:* 407. *C. B:* 331. Melilotus siliculis pendentibus curtis, candida, major *Moris:* II. p. 161. s. 2. t. 16. f. 2 [1.] Flores in spicam laxam, oblongam congesti.

---

283. L. odoratus *α* siculus L: Sp. I. 732, II. 1032; H. 216. Det första synonymet hänvisar dock på L. Cicera L: Sp. I. 730, II. 1032. **284.** L. tuberosus L: Sp. I. 732, II. 1033; H. 216. **285.** L. articulatus L: Sp. I. 731, II. 1031; H. 217. **286.** Lathyrus Clymenum L: Sp. I. 732, II. 1032; H. 217. **287.** H. coronarium L: Sp. I. 750, II. 1058; H. 231. **288.** L. tetragonolobus L: Sp. I. 773, II. 1089; H. 220. **289 & 290.** Trifolium Melilotus officinalis L: Sp. I. 765, II. 1078; H. 223.

△ 291. MELILOTUS major, odorata, violacea *Tourn:* 409 [407]. *Moris:* II. p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. Melilotus coerulea *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 134]. Lotus hortensis, odorata [odora] *C. B:* 331. Lotus sylvestris *Matth:* 724. Flores in capitulum arcte congesti.

292. FOENUMGRÆCUM sativum *Tourn:* 409. *C. B:* 34[illegible] Foeno-græcum *Matth:* 317.

○ 293. ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris [illegible] sylvestris *Tourn:* 416. *Moris:* II. p. 107. Glyzyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus *C. B:* 352.

XI. ANOMALI.

△ 294. VIOLA martia, purpurea, flore simplici, odoro *Tourn:* 419. *C. B:* 199. Planta humifusa, rotundifolia.

295. VIOLA martia, multiplici flore coeruleo *Tourn:* 419. *C. B:* 199. Plenitudo antecedentis.

○ 296. VIOLA tricolor, hortensis, repens, an φλόξ καὶ φλόγιον Theophrasti *Tourn:* 420. *C. B:* 199. Planta ramis erectis et procumbentibus, foliis oblongis.

○ 297. FUMARIA bulbosa, radice non cava, major *Tourn:* 412 [422]. *C. B:* 144. Fumaria bulbosa, radice solida, calcari ex folio cristato *J. B:* II [III. B] 205. Ligulæ foliaceæ, floribus intermixtæ, laciniatæ sunt.

○ 298. FUMARIA bulbosa, radice cava, major, flore rubro dilutiore *Tourn:* 422. *C. B:* 143.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

○ 299. FUMARIA bulbosa, radice cava, major, flore albo *Tourn:* 422. *C. B:* 143.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

△ 300. BALSAMINA foemina, flore luteo *Tourn:* 418. *C. B:* 306. *Tabern:* II. 541.

---

291. Trifolium Melilotus coerulea L: Sp. I. 764. II. 1077; H. 223. **292.** Trigonella Foenum græcum L: Sp. I. 777, II. 1095; H. 229. **293.** A. glycyphyllos L: Sp. I. 758, II. 1067; saknas i Hort. Ups. **294** & **295.** H. odorata L: Sp. I. 934, II. 1324; H. 276. **296.** V. tricolor β L: Sp. I. 936, II. 1326; H. 276. **297.** F. bulbosa γ solida L: Sp. I. 699, II. 983; saknas i Hort. Ups. **298** & **299.** F. bulbosa α cava L: Sp. I. 699, II. 983; saknas i Hort. Ups. **300** & **301.** Impatiens Balsamina L: Sp. I. 938, II. 1328; H. 276.

301. BALSAMINA foemina, flore candido *Tourn:* 448. *C. B:* 306. △
[Endast i handskriften på Leufsta.]

302. RESEDA foliis Calcitrapæ, flore albo *Tourn:* 423. ●

303. LUTEOLA *Dill:* 92. Luteola herba Salicis folio *Tourn:* 423. *C. B:* 100. △

304. CARDAMINDUM ampliori folio et majori flore *Tourn:* 410 [430]. Cardamindum majus *Riv: tetr:* [*pent:*] *irr:* [tab. 324]. ○

305. NAPELLUS flore coeruleo *Riv: apud Rupp:* 276. Aconitum coeruleum s: Napellus I. *Tourn:* 425. *C. B:* 183. *Moris:* III. p. 463. s. 12. t. 3. f. 9. ○

306. NAPELLUS galea angusta. Aconitum lycoctonum, albis pallidisve floribus *C. B:* 183. Aconitum VI Matthioli *Tabern:* II. 292. Galea cylindracea. ○

307. NAPELLUS flore e coeruleo et albo variegato. Aconitum s: Napellus I, fl. ex coeruleo et albo variegato *Tourn:* 425. *C. B:* 183. ○

308. NAPELLUS flore luteo *Riv: pent: irr:* [III. tab: 356]. Aconitum salutiferum s: Anthora *Tourn:* 425. *C. B:* 184. Aconitum flore luteo *Heuch:* 48 [42].

Flore luteo a reliqvis abunde dignoscitur.

309. DELPHINIUM hortense, flore majore et simplici coeruleo *Tourn:* 426. Consolida regalis, hortensis, flore majore et simplici coeruleo. *C. B:* 142. ○

310. DELPHINIUM hort. fl. maj. et simpl. coeruleo-purpureo. *Tourn:* 427. Consolida reg. hort. fl. maj. et simpl. coer.-purpur. *C. B:* 142.

311. DELPHINIUM h. fl. maj. et simplici albo *Tourn:* 427. Consolida reg. h. fl. maj. et simpl. niveo *C. B:* 142.

312. DELPHINIUM h. fl. majore et simpl. [ex coeruleo] purpureo *Tourn:* 427.

313. DELPHINIUM h. fl. major. multiplici purpureo *Tourn:* 427.

314. DELPHINIUM h. fl. maj. multiplici albo *Tourn:* 427.

315. DELPHINIUM elatius, flore incarnato *Tourn:* 427.

302.? R. alba L: Sp. I. 449, II. 645; H. 149. Jfr *Ruppii* Fl. Jen. ed. II. p. 234. **303.** Reseda Luteola L: Sp. I. 448, II. 643; saknas i Hort. Ups. **304.** Tropæolum majus L: Sp. I. 345, II. 490; H. 93. Jfr Hort. Cliff. 143. »Habitat in Peru, unde in Europam venit 1684 cura *Bewerningii*». L: Spec. plant. **305.** Aconitum Napellus L: Sp. I. 532, II. 751; saknas i Hort. Ups. **306.** Aconitum Lycoctonum L: Sp. I. 532, II. 750; saknas i Hort. Ups. **307.**? Aconitum variegatum L: Sp. I. 532, II. 750; H. 151. **308.** Aconitum Anthora L: Sp. I. 532, II. 751; H. 152. **309—315.** D. Ajacis L: Sp. I. 531, II. 748; H. 150. Jfr. Hort. Cliff. 113.

○ 316. AQVILEGIA flore albo simplici *Tourn:* 428.

○ 317. AQVILEGIA hortensis simplex, fl. incarnato *Tourn:* 428. *C. B:* 144.

○ 318. AQVILEGIA hortensis multiplex fl. magno coeruleo *Tourn:* 428 [429]. *C. B:* 144.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

○ 319. AQVILEGIA stellata, flore violaceo *Tourn:* 429. *C. B:* 145. Tubis melliferis caret.

320. AQVILEGIA flore roseo, multiplici *Tourn:* 429. *C. B:* 145. Plenitudo antecedentis.

XII. FLOSCULOSI.

321. CARDUUS albis maculis notatus, vulgaris *Tourn:* 440. *C. B:* 381. Carduus Levcographus *Dod:* 710.

× 322. SERRATULA seminibus lubricis *Mihi.* Crupina belgarum *Knaut:* 142. *Rupp:* 173. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore *Tourn:* 444. Chondrilla foliis laciniatis, serratis, purpurasc: flore *C. B:* 130. Folia inferiora integra, superiora laciniata.

○ 323. CNICUS pratensis, Acanthi folio, flore flavescente *Tourn:* 450. Carduus pratensis, latifolius *C. B:* 376. Cirsium fibrosum, foliis latioribus, divisis, viridibus, floribus albicantibus *Moris:* III. p. 150. s. 7. t. 29. f. 20. Cirsium Acanthoides pratense, flore ochroleuco *Vaill:* [Botan. Paris. p.] 38. Folia divisa.

324. CNICUS sylvestris, hirsutior s: Carduus benedictus *Tourn:* 456 [450]. *C. B:* 378. Carduus benedictus *Matth:* 541. Carduus luteus, procumbens, sudoriferus et amarus *Moris:* III. p. 160. s. 7. t. 34. f. 1. Folia integra.

325. CINARA hortensis, foliis non aculeatis *Tourn:* 442. *C. B:* 383. Carduus non aculeatus *Matth:* 454.

○ 326. ECHINOPUS *Tourn:* 463. Carduus sphærocephalus, latifolius, vulgaris, flore candido, staminibus in medio coeruleis *C. B:*

316—320. A. vulgaris L: Sp. I. 533, II. 752; H. 152. **321.** C. marianus L: Sp. I. 823, II. 1153; H. 250. **322.** Centaurea Crupina L: Sp. I. 909. II. 1285; saknas i Hort. Ups. **323.** C. oleraceus L: Sp. I. 826, II. 1156; saknas i Hort. Ups. **324.** Cnicus benedictus L: Sp. I. 826, Centaurea benedicta Sp. II. 1296; H. 250. **325.** Cynara Scolymus γ L: Sp. I. 827, II. 1159; H. 251. **326.** Echinops sphærocephalus L: Sp. I. 814, II. 1314; H. 248.

381. Echinopus major, flore candido, staminibus in medio coeruleis *Pont: Diss:* [VIII. p:] 191. Carduus sphærocephalus *Dod:* 710.

327. CARTHAMUS officinarum, flore croceo *Tourn:* 457. Cnicus sativus s: Carthamus officinarum *C. B:* 378. Cnicus *Matth:* 797. Cnicus s: Carthamus *Dod:* 359 [358 in ed. 1583, p. 362 in ed. 1616]. ○

328. DIPSACUS sylvestris aut Virga pastoris major *Tourn:* 466. *C. B:* 385. Labrum Veneris alterum *Matth:* 450. Discus pyramidalis. ○

329. DIPSACUS sylvestris, capitulo minore l. Virga pastoris minor *C. B:* 385. *Moris:* III. p. 158 [168.] s. 7. t. 36. f. 5. Virga pastoris *Matth:* 451. ○

330. ERYNGIUM latifolium, planum, flore coeruleo *Tourn:* 327. *C. B:* 386. Eryngium spurium *Dod:* 720. fl. coeruleo. ○

331. ERYNGIUM latifolium, planum, caule [ex] viridi albscente, flore albo *Tourn:* 327. *C. B:* 386. △

Hwad præjudicer intagit Tournefort och de andre Botanicos, då de fört denna till *Umbellatos*, kan jag eij begripa.

332. CYANUS montanus latifolius. Verbasculum Cyanoides *Tourn:* 445. *C. B:* 273. Cyanus major *Dod:* 250. Cyanus montanus, perennis, latifolius, flore grandi *Moris:* III. [p: 134.] s. 7. t. 25. f. 1. Radix perennis. ○

333. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s: orientalis major, flore luteo *Tourn:* 446. ○

334. CYANUS floridus, odoratus, turcicus s: orientalis major, flore albo *Tourn:* 446. ○

335. CYANUS segetum, atropurpurascente flore *Vaill:* [*Act: Reg: Scient: Paris:* 1728 pag: 184. spec:] 4.

336. CYANUS flore rubro *Tourn:* 446.

337. CYANUS segetum, flore albo *Tourn:* 446.

338. CYANUS segetum, disco coeruleo, cum corona candida *Tourn:* 446.

339. CYANUS segetum, disco carneo, cum corona candida [*Tourn:* 446] Tertia hæc species [C. segetum] annua est et varietas vulgaris in agris provenientis.

---

327. C. tinctorius L: Sp. I. 830, II. 1162; H. 251. **328.** D. fullonum L: Sp. I. 97, II. 140; H. 25. 1. **329.** D. pilosus L: Sp. I. 97, II. 141; H. 25. 2. **330** & **331.** E. planum L: Sp. I. 233, II. 336; H. 57. **332.** Centaurea montana L: Sp. I. 911, II. 1289; H. 270. **333** & **334.** Centaurea moschata L: Sp. I. 909, II. 1286; H. 271. Enl. Hort. Cliff & Ups. **335—339.** Centaurea Cyanus L: Sp. I. 911. 1289; saknas i Hort. Ups.

○ 340. SCABIOSA alpina, foliis Centaurii majoris *Tourn:* 465 [464]. *C. B:* 270. *Moris:* III. p. 46. s. 6. t. 13. f. 10. Scabiosa alpina centauroides *Besl: vern:* [ord: 9.] f. 8. Altitudo hominis. In Wennegarn.

○ 341. SCABIOSA peregrina, rubra, capitulo oblongo *Tourn:* 464. *C. B:* 270. *Moris:* III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26.

○ 342. CONYZA Linariæ folio *Tourn:* 445. Coma aurea germanica *Boerh:* [*Ind: alt:* tom:] I. 121. Linaria folioso capitulo luteo major *C. B:* 213. Virga aurea Linariæ folio, floribus congestis et umbellatim dispositis *Moris:* III. 125.

○ 343. PETASITES major et vulgaris *Tourn:* 451. *C. B:* 197. [Endast i Linnean Soc:s handskrift.]

344. ELICHRYSUM orientale *Tourn:* 453. *C. B:* [*Pinax Theat: Bot:* p:] 264. [Helichryson *C. Bauh.*] *Prod:* 123. Gnaphalium luteum, peregrinum, specioso flore luteo *Volck:* 193. Flores lutei; annua.

○ 345. ELICHRYSUM americanum, latifolium *Tourn:* 453. Gnaphalium latifolium, americanum *C: B:* 263. Helichrysum s: Chrysocome repens, foliis deciduis, flore externe albo, intus flavescente *Moris:* II. [t. III] p. 88.

Calyces nivei, radix perennis.

○ 346. ABSINTHIUM ponticum, tenuifolium, incanum *Tourn:* 457. *C. B:* 138. Absinthium tenuifolium *Dod:* 24. Absinthium ponticum *Matth:* 465.

○ 347. ABROTANUM mas, angustifolium, majus *Tourn:* 459. *C. B:* 136. Abrotanum mas *Dod:* 21. Folia capillacea, multifida.

○ 348. ABROTANUM Lini folio, acriori et odorato *Tourn:* 459. Draco [Dracunculus] hortensis *C. B:* 98. Draco herba *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. [f. 5.] Dragoncellus *Matth:* 410. Folia integra.

349. SANTOLINA foliis teretibus *Tourn:* 460. Abrotanum foemina, foliis teretibus *C. B:* 136. Abrotanum foemina *Matth:* 468.

○ 350. TANACETUM foliis crispis *Tourn:* 461. *C. B:* 132. Folia multifida, crispa.

---

340. S. alpina L: Sp. I. 98, II. 141; H. 26. **341.** S. atropurpurea L: Sp. I. 100, II. 144; H. 16. **342.** Chrysocoma Linosyris L: Sp. 841, II. 1178; saknas i Hort. Ups. **343.** Tussilago Petasites L: Sp. I. 866, II. 1215; saknas i Hort. Ups. **344.** Gnaphalium orientale L: Sp. I. 853, II. 1195; H. 256. **345.** Gnaphalium margaritaceum L: Sp. I. 850, II. 1198; H. 255. **346.** Artemisia pontica L: Sp. I. 847, II. 1187; H. 257. **347.** Artemisia Abrotanum L: Sp. I. 845, II. 1185; H. 257. **348.** Artemisia Dracunculus L: Sp. I. 849, II. 1189; H. 256. **349.** S. Chamæ Cyparissus L: Sp. I. 842, II. 1179; H. 252. **350.** T. vulgare *β* crispum L: Sp. I. 845, II. 1184; H. 254.

351. TANACETUM hortense, foliis et odore Menthæ *Tourn:* 461. Mentha hortensis, corymbifera *C. B:* 226. Balsamita major *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. f. 1. *Boerhav:* [*Ind: alt: tom:*] I. 125. Folia plana, integra, serrata. ○

XIII. SEMIFLOSCULOSI.

352. PILOSELLA polyclonos, repens, major, [syriaca,] flore amplo, aurantiaco *Moris:* III. p. 78. s. 7. t. 8. f. 5. Pilosella peregrina, flore saturate croceo *Rupp:* 196. Hieracium hortense, floribus atro-purpurascentibus *Tourn:* 471. *C. B:* 128. Pilosella indica *Cornuti* 209. ○

353. LACTUCA sativa *Tourn:* 473. *C. B:* 122. Lactuca florescens *Matth:* 371. ○

354. LACTUCA capitata *Tourn:* 473. *C. B:* 122 [123.] ○

355. LACTUCA crispa *Tourn:* 473. *C. B:* 123.

356. SONCHUS asper, arborescens *Tourn:* 474. *C. B:* 124. Sonchus paludosus, altissimus, hastato folio *Moris:* III p. 61. Sonchus tricubitalis, folio cuspidato *Raj: S:* [ed. III. p.] 163. ○

357. SCORZONERA latifolia, sinuata *Tourn:* 476. *C. B:* 275. *Moris:* II. 81. [III. p. 81. s. 7. t. 9. f. 7]. △

358. TRAGOPOGON purpureo-coeruleum, Porri folio, qvod Artifi vulgo *Tourn:* 477. *C. B:* 274. Tragopogon alterum *Matth:* 380. ○

359. CICHORIUM sylvestre s: officinarum *Tourn:* 479. *C. B:* 125. ○
[Endast i handskriften på Leufsta.]

XIV. RADIATI.

360. CORONA SOLIS II *Tourn:* 489. Sol amplissimus, nutante flore *Rupp:* 154. Helenium indicum maximum *C. B:* 276. Chry- ○

---

351. T. Balsamita L: Sp. I. 845, II. 1184; H. 255. **352.** Hieracium aurantiacum L: Sp. I. 801, II. 1226; H. 238. **353.** L. sativa L: Sp. I. 795, II- 1118; H. 242. 1. *α.* **354.** L. sativa *β* capitata L: Sp. I. 795, II. 1118; H. 242. 1. *β.* **355.** L. sativa *γ* crispa L: Sp. I. 795, II. 1118; H. 242. 1. *γ.* **356.** S. palustris L: Sp. I. 793, II. 1116; H 244. **357.** S. hispanica L: Sp. 791, II. 1112; H. 242. **358.** T. porrifolium L: Sp. I. 789, II. 1110; H. 243. **359.** C. Intybus L: Sp. I. 813, II. 1142; saknas i Hort. Ups. **360.** Helianthus annuus L: Sp. I. 904, II. 1276; H. 268. 1.

santhemum indicum, annuum, maximum, ramosum sive Flos Solis major. ramosus *Moris:* III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Planta annua, ramosa.

361. CORONA SOLIS minor, foemina *Tourn:* 489. *Tabern* [II. p.] 443. Helenium indicum minus *C. B:* 277.

Planta annua non ramosa.

362. CORONA SOLIS parvo flore, tuberosa radice *Tourn:* 498. Helenium [Helianthemum] indicum, tuberosum *C. B:* 277. Sol altissimus, radice tuberosa, esculenta *Rupp:* 155. Chrysanthemum perenne majus, foliis integris, americanum, tuberosum *Moris:* III. p. 23. s. 6. t. 7. [6.] f. 57. Ärtskockor under jord.

Planta perennis, tuberosa.

363. OTHONNA disco pyramidali. Corona Solis, foliis ampliоribus, laciniatis *Tourn:* 390. Doronicum americanum, laciniato folio *C. B:* 516. Chrysanthemum americanum perenne, foliis divisis, dilute [dilutius] virentibus, majus *Moris:* III. p: 22. s. 6. f. 52 [t. 6. f. 53.]

364. ASTER omnium maximus, Helenium dictus *Tourn:* 483. Helenium vulgare *C. B:* 276. Helenium officinarum *Rupp:* 163. Magnitudo hominis, folia subtus pubescentia.

365. ASTER pratensis, autumnalis, Conyzæ folio *Tourn:* 482. Conyza media, Asteris flore luteo vel tertia Dioscoridis *C. B:* 265. Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens *J. B:* II. 1050. Discus ratione floris amplissimus.

366. ASTER atticus, coeruleus, vulgaris *Tourn:* 481. *C. B:* 267. *Pont:* [*Diss.* IX. pag.] 226. Folia serrata, flos coeruleus.

[Endast i Linnean Soc:s handskrift.]

367. TAGETES indicus, minor, simplici flore s: Caryophyllus indicus s: Flos africanus *Tourn:* 488. Tanacetum africanum s: Flos africanus minor *C. B:* 133. Flos africanus *Dod:* 254.

368. TAGETES indicus, minor, multiplicato flore *Tourn:* 488. Tanacetum afr: s: Flos afr: min: fl: pleno *C. B:* 133. Plenitudo antecedentis. Planta diffusa, vix cubitalis; petala purpurea pube scatent.

---

360. Helianthus annuus L: Sp. I. 904, II. 1276; H. 268. 1. **361.**? Helianthus multiflorus L: Sp. I. 905, II. 1277; II. 268. 2. **362.** Helianthus tuberosus L: Sp. I. 905, II. 1277; H. 268. 3. **363.** Rudbeckia laciniata L: Sp. I. 906, II. 1279; H. 269. 1. **364.** Inula Helenium L: Sp. I. 881, II. 1236; saknas i Hort. Ups. **365.** Inula dysenterica L: Sp. I. 882, II. 1237: saknas i Hort. Ups. **366.** Aster Amellus L: Sp. I. 873, II. 1226; saknas i Hort. Ups. **367** & **368.** T. patula L: Sp. I. 887, II. 1249; II. 267.

369. TAGETES indicus, flore fistuloso, dupplicato *Tourn:* 489. ○ Tanacet: s: Flos mexicanus fl: fistuloso pleno. *C. B:* 133.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

370. TAGETES maximus, rectus, flore simplici ex luteo pallido *Tourn:* 488. Tanacet: s: Flos african: major [majus], simplici flore *C. B:* 133. Planta erecta altitudine bicubitali. ○

371. TAGETES maximus, rectus, flore maximo, multiplicato *Tourn:* 488. Tanac: s: Fl: afr: maj: fl: pleno *C. B:* 132. Caryophyllus indicus maior *Matth:* 430. Plenitudo antecedentis.

372. BELLIS hortensis, rubra, flore multiplici, fistuloso *Tourn:* 491. ○

373. BELLIS hortensis, flore pleno, eoqve magno, incarnato. *Tourn:* 491. *C. B:* 261. Bellis hortensis *Dod:* 265.

Plenitudo sylvestris.

374. BELLIS hortensis, flore pleno, eoqve magno, albo *Tourn:* 491. *C. B:* 61 [261]. Varietas antecedentis.

375. AMELLUS foliis in medio serratis *Mihi.* Aster virginianus, angustifolius, serotinus, parvo, albente flore *Rupp:* 168. Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore *Tourn:* 482. ○

Planta perennis, calyx imbricatus, discus luteo-purpurescens.

376. AMELLUS foliis in medio crenula una vel altera notatis *Mihi.* Aster ramosus, annuus, canadensis *Tourn:* 482. Bellis ramosa, umbellifera *Cornut:* 193 [tab. 194]. Planta annua. Calyx imbricatus. Discus luteus, corona alba. ○

Jag kallar denna *Amellum*, hwilket är ett gamalt Synonymon *Asteris*, emädan hon af ingen rättsint kan föras till Asterem, som bloman nogsamt wisar.

377. PTARMICA vulgaris, folio, [longo,] serrato, flore albo *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis, serrato folio *C. B:* 98. ○

[Endast i handskriften på Leufsta.]

378. PTARMICA vulg. pleno flore *Tourn:* 496. Drac: prat: flore pleno *C. B:* 98. ○

379. CHAMÆMELUM nobile s. Leucanthemum odoratius *Tourn:* 494. *C. B:* 135. Chamæmelum odoratum *Dod:* 259. ○

380. CHAMÆMELUM nobile flore multiplici *Tourn:* 494. *C. B:* 135. Plenitudo antecedentis.

369—371. T. erecta L: Sp. I. 887, II. 1249; H. 267. **372—374.** B. perennis L: Sp. I. 886, II. 1248; H. 265. **375.** Aster tradescanti L: Sp. I. 876, II. 1230; H. 262. Enl. Hort. Cliff. **376.** Aster annuus L: Sp. I. 875, II. 1229; H. 262. **377** & **378.** Achillæa Ptarmica L: Sp. I. 898, II. 1266; H. 265. **379** & **380.** Anthemis nobilis L: Sp. I. 894, II. 1260; saknas i Hort. Ups.

381. MATRICARIA vulgaris s: sativa *Tourn:* 493. *C. B:* 133. Matricaria latifolia *Moris:* III. p. 32. [s. 6. t. 10 f. 1.] Flos radiatus.

382. MATRICARIA foliis florum fistulosis *Tourn:* 493. Matricaria latifolia, petalis fistulosis, simplex *Moris:* III. p. 32. s. 6. t. 10. [f. 1. c.

Varietas forte antecedentis.

383. LEUCANTHEMUM foliis mollibus, floribus luteis *Mill.* Chrysanthemum folio minus secto, glauco *Tourn:* 492. Bellis lutea foliis profunde incisis, major *C. B:* 262. Folia dissite serrata.

384. JACOBÆA africana frutescens, flore amplo, purpureo, elegantissimo, Senecionis folio *Wolck: [Volck:]* 225 cum fig: et descript: opt: Arborea est.

385. JACOBÆA maritima *Tourn:* 486. *C. B:* 131. Folia crassa, a latere inferiori lanugine alba vestita.

386. DORIA foliis serratis, acutis. Jacobæa alpina, foliis longioribus, serratis *Tourn:* 485. Virga aurea angustifolia, serrata *C. B:* 268. Solidago Saracenica *Dod:* 141. Doria *Dill: N: pl: gen:* 143.

387. VIRGA AUREA Limonii folio, panicula uno versu disposita *Tourn:* 484. Virga aurea Mexicana *C. B:* 154 [517] ubi descript.

388. CHRYSANTHEMUM foliis Matricariæ *Tourn:* 491. *C. B:* 134.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

389. CHRYSANTHEMUM majus, folio profundius laciniato, magno flore *Tourn:* 491. *C. B:* 134.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

390. CHRYSANTHEMUM flore partim candido, partim luteo *Tourn:* 492. *C. B:* 134.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

391. CHRYSANTHEMUM flore pleno partim candido, partim luteo *Tourn:* 493 [492]. Hujus variationes colorum et plenitudines tot fere ac individua, folia multifida.

392. CALTHA vulgaris flore pallido *Tourn:* 498. *C. B:* 275.

393. CALTHA vulgaris flore citrino *Tourn:* 498. *C. B:* 275.

---

381 & **382.** Matricaria Parthenium L: Sp. I. 890, II. 1255; H, 263. **383.** Chrysanthemum segetum L: Sp. I. 889, II. 1254; saknas i Hort. Ups. **384.** Senecio elegans L: Sp. I. 869, II. 1218; H. 260. **385.** Othonna maritima L: Sp. I. 925, H. 273. 2; Cineraria maritima Sp. II. 1244. **386.** Senecio saracenicus L: Sp. I. 871, II. 1221; H. 260. 1. **387.** Solidago mexicana L: Sp. I. 879, II. 1234; saknas i Hort. Ups. **388—391.** Chrysanthemum coronarium L: Sp. I. 890, II. 1254; H. 263. **392—396.** Calendula officinalis L: Sp. I. 921, II. 1304; H. 274.

394. CALTHA polyanthos major *Tourn:* 498. *C. B:* 275. Fl: pleno.

395. CALTHA polyanthos maxima *Tourn:* 498. *C. B:* 275. Fl: pleno maximo.

396. CALTHA prolifera minoribus floribus *Tourn:* 499. *C. B:* 276.

397. [XERANTHIUM] XERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore *Tourn:* 499. Stoebe *Riv: apud Rupp:* 206. Jacea Oleæ folio, capitulis simplicibus *C. B:* 272. Ptarmica altera *Dod:* [*Pempt:* ed. 1583 p:] 698. Ptarmice Austriaca [*Dod:*] *Pempt:* [ed. 1616 p.] 710. ○

Denna är sannerligen flosculosa, emädan radius är allenast sqvamulæ calycis interioris prolongatæ.

XV. APETALI.

398. ASARUM foliis rotundis *Mihi.* Asarum *Tourn:* 501. *C. B:* 197. *Matth:* 32. ○

399. BETA rubra, radice Rapæ *Tourn:* 502. *C. B:* 118. Beta rubra *Matth:* 347. Beta rubra romana *Dod:* 609. ○

400. ACETOSA rotundifolia, hortensis *Tourn:* 503. *C. B:* 115[114]. ○

[Endast i handskriften på Leufsta.]

401. LAPATHUM folio rotundo, alpinum *Tourn:* 503 [504]. *Moris:* II. p. 583. s. 5. t. 28. f. 9. *J. B:* II. 987. Lapathum hortense rotundifolium, s: montanum *C. B:* 115. Rhabarbarum monachorum Hortulanis. ○

402. LAPATHUM folio acuto, rubente *Tourn:* 504. *C. B:* 115. *Moris:* II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. Folia oblonga, venis purpureis. ○

403. ATRIPLEX hortensis, alba s: pallide virens *Tourn:* 505. *C. B:* 119. Folia viridia. ○

404. ATRIPLEX hortensis, rubra *Tourn:* 505. *C. B:* 119. Folia purpurascentia. Varietas antecedentis. Folia triangula. Planta annua. ○

405. ATRIPLEX latifolia s: Halimus fruticosus *Tourn:* 505. Halimus latifolius s: fruticosus *C. B:* 120. Caules perennes. Folia subrotunda.

---

397. Xeranthemum annuum L: Sp. I. 357, II. 1201; H. 255. **398.** A. europæum L: Sp. I. 442, II. 633; saknas i Hort. Ups. **399.** B. vulgaris δ L: Sp. I. 222, γ Sp. II. 322; H. 56. **400.** Rumex scutatus L: Sp. I. 337, II. 480; H. 89. **401.** Rumex alpinus L: Sp. I. 334, II. 480; saknas i Hort. Ups. **402.** Rumex sanguineus L: Sp. I. 334, II. 476; H. 89. **403 & 404.** Atr. hortensis α & β L: Sp. I. 1053, II. 1493; H. 303. **405.** Atr. Halimus L: Sp. I. 1052, II. 1492; saknas i Hort. Ups.

○ 406. ATRIPLEX maritima, angustissimo folio *Tourn:* 505. Halimus s: Portulaca marina.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

○ 407. CHENOPODIUM ambrosioides, folio sinuato *Tourn:* 506. Botrys ambrosioides vulgaris *C. B:* 138. Atriplex odora s: suaveolens *Moris:* II. p. 605. Botrys *Matth:* 565. Folia multifida. Odor medicatus.

408. CHENOPODIUM ambrosioides, folio integro, dentato *Mihi.* Chenopodium ambrosioides, mexicanum *Tourn:* 506. Botrys ambrosioides mexicana [mexiocana] *C. B:* [*Pin:* p. 138 *et app:* p:] 516. Chenopodium ambrosioides [suaveolens], foliis longioribus mexicanum *Rupp:* 318. Folia leviter sinuata. Odor idem.

● 409. CHENOPODIUM Lini folio villoso. *Tourn:* 506. Belle Vedere Wolck [Volck:] 59. Linaria scoparia *C. B:* 212. Herba studiosorum *Tabern:* II. 102 [502]. Osyris *Dod:* 101. Folia angusta, acuta, integra.

○ 410. MOROCARPUS major *Rupp:* [*Flora Jenensis*] *edit: alt:* [Francof. 1726 p.] 271. Chenopodio-Morus major *Boerh:* [Ind. alt. pars] II. 91. Atriplex mori fructu major s: fragifera major *Moris:* II. p: 606. s: 5. t: 32. f: 1.

△ 411. PARIETARIA officinarum et Dioscoridis *Tourn:* 509. *C. B:* 121. [Parietaria] *Dod:* 102. *Tabern:* II. 253.

412. FAGOPYRUM vulgare erectum *Tourn:* 511. Erysimum Theophrasti, folio hederaceo *C. B:* 27. Frumentum saracenicum *Matth:* 305.

413. ALCHIMILLA alpina, Quinquefolii folio, subtus argenteo *Tourn:* 508. Alchymilla alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli profunde secto *Rupp: alt:* 51. Tormentilla alpina, folio sericeo *C. B:* 326.

○ 414. BISTORTA major, radice magis intorta *Tourn:* 511. *C. B:* 192. Serpentaria mas s: Bistorta *Fuchs:* 773.

● 415. RICINUS vulgaris *Tourn:* 532. *C. B:* 432. Ricinus *Matth:* 771.

○ 416. URTICA urens, pilulas ferens: I Dioscoridis, semine Lini *Tourn:* 535. *C. B:* 232. Urtica pilulifera, folio profundius Urticæ

---

406. Atr. Portulacoides L: Sp. I. 1053, II. 1493; saknas i Hort. Ups. **407.** Ch. Botrys L: Sp. I. 219, II. 320; H. 55. **408.** Ch. ambrosioides L: Sp. I. 219, II. 320; H. 56. **409.** Ch. Scoparia L: Sp. I. 221, II. 321: H. 55. **410.** Blitum capitatum L: Sp. I. 4, II. 6; H. 3. **411.** P. officinalis L: Sp. I. 1052, II. 1492; H. 302. **412.**? Polygonum Fagopyrum L: Sp. I. 364, II. 522; H. 96. Enl. Fl. Svec. **413.** Alchemilla alpina L: Sp. I. 123, II. 179; saknas i Hort. Ups. Enl. Hort. Cliff. **414.** Polygonum Bistorta L: Sp. I. 360, II. 516; H. 95. **415.** R. communis L: Sp. I. 1007. II. 1430; H. 279. **416.** U. pilulifera L: Sp. I. 983, II. 1395; H. 282.

majoris in modum serrato, semine magno Lini. *R: S:* 140. Urtica urens prior *Dod:* 151. Urtica prima *Matth:* 707.

417. SPINACIA vulgaris, sterilis *Tourn:* 533. Lapathum hortense s: Spinacia sterilis *C. B:* 118 [115]. Mas. ○

418. SPINACIA vulgaris, capsula seminis aculeata *Tourn:* 533. ○ Lapathum hortense s: Spinacia semine spinoso *C. B:* 114. Spinacia *Matth:* 342. Foemina.

419. CANNABIS erratica *Tourn:* 535. *C. B:* 320. Cannabis foemina J. B: III. [B.] 447. Mas est.

420. CANNABIS sativa *Tourn:* 535. *C. B:* 320. Cannabis mas J. B: III. [B.] 447. Foemina est.

421. LUPULUS mas. Lupulus foemina *Tourn:* 535. *C. B:* 298.

422. LUPULUS foemina, strobilis albicantibus. Lupulus mas *Tourn:* 535. *C. B:* 298. Convolvulus perennis heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliaceis strobili instar *Moris:* II. p. 37. [s. 1. tab. 7. fig: penult.].

422½. LUPULUS foemina, strobilis rufescentibus *Mihi.*

423. MERCURIALIS ramosa, mas *Mihi.* Mercurialis spicata s: foemina Dioscoridis et Plinii *Tourn:* 534. *C. B:* 121.

424. MERCURIALIS ramosa, foemina *Mihi.* Mercurialis testiculata s: mas Dioscoridis et Plinii *Tourn:* 534. *C. B:* 121.

425. MERCURIALIS non ramosa, mas *Mihi.* Mercurialis montana, spicata *Tourn:* 534. *C. B:* 122.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

426. MERCURIALIS non ramosa, foemina *Mihi.* Mercurialis montana, testiculata *Tourn:* 534. *C. B:* 122.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

XVI. STAMINEI.

427. SECALE hybernum l. majus *Monti* 3. *C. B:* 23. *Tourn:* 512 [513]. Secale *Matth:* 311.

428. SECALE vernum l. minus *Mont:* 4. *C. B:* 23. *Tourn:* 513. Rogga s: Secale *Dod:* 470 [ed. 1583 p. 490, ed. 1616 p. 499].

---

417 & 418. S. oleracea mas & femina L: Sp. I. 1027, II. 1456; H. 296. **419 & 420.** C. sativa mas & foemina L: Sp. I. 1027, II. 2457; H. 297. **421—422½.** Humulus Lupulus L: Sp. I. 1028, II. 1457; saknas i Hort. Ups. Jfr. Hort, Cliff. **423 & 424.** M. annua mas & femina F: Sp. I. 1035, II. 1465; H. 298. **425 & 426.** M. perennis mas & femina L: Sp. I. 1035, II. 1465; saknas i Hort. Ups. **427 & 428.** S. cereale L: Sp. I. 84, II. 124; H. 22.

429. HORDEUM polysticum, [polystichum] vernum *Mont:* 4. *C. B:* 22. *Tourn:* 513. Hordeum *Matth:* 306. Gement korn.

430. HORDEUM disticon [distichon] *C. B:* 23. *Dod:* 492. Himmels korn.

431. TRITICUM hybernum, aristis carens *Monti* 2. *C. B:* 21. *Tourn:* 512. Triticum *Dod:* 480.

432. TRITICUM spica Hordei Londinensibus *Mont:* 3. *Raj: S:* 387. *Tourn:* 512. Zeopyrum s: Triticospeltum *C. B:* 22. Hordeum nudum s: Gymnocrithon *J. B:* II. 430. Zeopyron *Dod:* 486.

433. TRITICUM cinereum, [cinericeum], maximis aristis donatum, triturando glumas deponens *Mont:* 3. Triticum aristatum, spica maxima, cinerea, [cinericea] glumis hirsutis *Raj: S:* 387. Grana glumis villosis involuta.

434. AVENA nigra *Mont:* 6. *C. B:* 23. *Tourn:* 514.

435. AVENA vulgaris s: alba *Mont:* 6. *C. B:* 23. *Tourn:* 514.

436. PANICUM italicum s: panicula majore *Tourn:* 515. *C. B:* 27. Panici indici spica *Dod:* 498.

437. MILIUM semine [luteo vel] albo *Tourn:* 514. *C. B:* 26.
[Endast i handskriften på Leufsta.]

438. PHALARIS major semine albo *C. B:* 28.
[Endast i handskriften på Leufsta.]

439. GRAMEN PANICULATUM, aqvaticum, Phalaridis semine, folio variegato *Tourn:* 523. *Sch:* 127. Gramen paniculatum, folio variegato *C. B:* 3.

440. MAYS granis aureis *Mont:* 23. *Tourn:* 531. Frumentum indicum Mays dictum *C. B:* 25. Frumentum indicum *Matth:* 305.

XVII. AMENTACEI.

441. FICUS humilis *Tourn:* [*App.* p.] 663. *C. B:* 457. Ficus *Matth:* 221. [211].

---

429. H. vulgare L: Sp. I. 84, II. 125; H. 22. **430.** H. distichon L: Sp. I. 85, II. 125; H. 23. 4, **431.** T. hybernum L: Sp. I. 86, II. 126; H. 21. **432.**? H. distichon *β* nudum L: Sp. I. 85, II. 125. **433.**? T. polonicum L: Sp. II. 127. **434** & **435.** A. sativa L: Sp. I. 79, II. 118; H. 20. **436.** P. italicum L: Sp. I. 56, II. 83; H. 19. **437.** Panicum miliaceum L: Sp. I. 58, II. 86; H. 20. **438.** Ph. canariensis L: Sp. I. 54, II. 79; H. 19. **439.** Phalaris arundinacea *β* picta L: Sp. I. 55, II. 80; saknas i Hort. Ups. **440.** Zea Mays L: Sp. I. 971, II. 1378; H. 281. **441.** F. Carica *β* L: Sp. I. 1059, II. 1513; saknas i Hort. Ups.

442. LENTISCUS vulgaris *Tourn:* 580. *C. B:* 392 [399]. Lentiscus *Matth:* 94. *Dod:* 859.

443. BUXUS arborescens *Tourn:* 578. *C. B:* 471. Buxus *Dod:* 782. *Matth:* 151. Folia oblonga, crassa.

444. BUXUS foliis rotundioribus *Tourn:* 579. *C. B:* 471. Chamæpyxos *Tabern:* III. 79 [141].

445. BUXUS minor, foliis per limbum aureis *Tourn:* 579. Varietas antecedentis, folia subrotunda.

446. JUGLANS *Kram:* 56. Nux juglans s: regia vulgaris *Tourn:* 581. *C. B:* 417. Nux juglans *Matth:* 202.

447. CORYLUS sativa, fructu albo, minore s: vulgaris *Tourn:* 581. *C. B:* 417.

448. CARPINUS *Tourn:* 582. Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis *C. B:* 427.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

449. FAGUS *Tourn:* 584. *C. B:* 419.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

450. CASTANEA sativa *Tourn:* 584. *C. B:* 418. Est item species FAGI, qvod in *Methodo mea plantarum* sufficienter ostendam.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

451. PINUS sativa *Tourn:* 585. *C. B:* 491.

452. SABINA folio Tamarisci *C. B:* 487. Sabina sine baccis *Matth:* 107. Mas est.

453. SABINA folio Cupressi *C. B:* 487. Sabina baccifera foemina.

454. MORUS fructu nigro *Tourn:* 589. *C. B:* 459.

455. POPULUS foliis laciniatis, mas *Mihi.*

[Endast i handskriften på Leufsta.]

456. POPULUS foliis laciniatis, foemina *Mihi.* Populus alba, majoribus foliis *Tourn:* 592. *C. B:* 429.

457. POPULUS foliis qvadrangularibus, mas *Mihi.*

[Endast i handskriften på Leufsta.]

458. POPULUS nigra *Tourn:* 592. *C. B:* 429. Folia oblongo-qvadrangula.

---

442. Pistacia Lentiscus L: Sp. I. 1026, II. 1455; H. 296. **443—445.** B. sempervirens L: Sp. I. 983, II. 1394; H. 283. **446.** J. regia L: Sp. I. 997, II. 1415; H. 286. **447.** C. Avellana L: Sp. I. 999, II. 1417; H. 286. **448.** C. Betulus L: Sp. I. 998, II. 1416; saknas i Hort. Ups. **449.** F. sylvatica L: Sp. I. 998, II. 1416: saknas i Hort. Ups. **450.** Fagus Castanea L. Sp. I. 997, II. 1416; H. 287. **451.** P. Pinea L: Sp. I. 1000, II. 1419; H. 288. **452 & 453.** Juniperus Sabina mas & femina L: Sp. I. 1039, II. 1472; H. 299. 1. **454.** M. nigra L: Sp. I. 986, II. 1398; H. 283. **455 & 456.** P. alba mas & femina L: Sp. I. 1034, II. 1463; saknas i Hort. Ups. **457 & 458.** P. nigra mas & femina L: Sp. I. 1034, II. 1464; saknas i Hort. Ups.

XVIII. ARB. MONOPETALI.

× 459. ALATERNUS *Tourn:* 595. Philyca elatior *C. B:* 476 Alaternus Turneri *Tabern:* III. 132.

× 460. ALATERNUS aurea s: foliis ex luteo variegatis *Tourn:* 595. Varietas.

○ 461. LIGUSTRUM *Tourn:* 596. *Matth:* 137. Ligustrum germanicum.

○ 462. SYRINGA coerulea *C. B:* 398. Lilac *Tourn:* 601. Syringa lusitanica *Tabern:* III. 133.

○ 463. SYRINGA folio vario *Mihi.* Ligustrum foliis laciniatis *C. B:* [*Pin.*] 476. *Prod.* 158. Lilac laciniato folio *Tourn:* 602. Syringa laciniato folio *Rupp:* 24. Agem lilac [lilag] Persarum *Cornut:* 189. Folia plurima, laciniata.

○ 464. JASMINUM s: Gelseminum luteum *Tourn:* 599 [597]. Jasminum humile luteum *C. B:* 397. Petali laciniæ obtusæ.

○ 465. JASMINUM vulgatius, flore albo *Tourn:* 597. *C. B:* 397. Jasminum *Dod:* 405. Gelsiminum *Matth:* 75.

466. OLEA sativa *C. B:* 472. Olea domestica *Cam: Ep:* 110.

467. ELEAGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo olivæformi, subdulci *Tourn: Coroll:* 53. Olea sylvestris, folio molli, incano *C. B:* 472. Eleagnos *Camer: Epit:* 106.

× 468. AQVIFOLIUM s: AGRIFOLIUM vulgo *Tourn:* 600. Ilex aculeata baccifera, folio sinuato *C. B:* 425.

× 469. AQVIFOLIUM foliis subrotundis, spinis et limbis argenteis *Tourn:* 600. Variatio.

× 470. TINUS prior *Tourn:* 607. Laurus sylvestris Corni foeminæ foliis subhirsutis *C. B:* 461.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

× 471. NERION floribus rufescentibus *Tourn:* 605. *C. B:* 464. Nerion *Tabern:* III. 141. Rododendron [Rhododendrun] *Dod:* 839.

---

459 & 460. Rhamnus Alaternus L: Sp. I. 193, II. 281; H. 47. **461.** L. vulgare L: Sp. I. 7, II. 10; saknas i Hort. Ups. **462.** S. vulgaris L: Sp. I. 9, II. 11; H. 6. **463.** S. persica β laciniata L: Sp. I. 9, II. 11; H. 6. **464.** J. humile L: Sp. I. 7, II. 9; H. 5. **465.** J. officinale L: Sp. I. 7, II. 9; H. 5. **466.** O. europæa L: Sp. I. 8, II. 11; saknas i Hort. Ups. **467.** E. angustifolius L: Sp. I. 121, II. 176; H. 31. **468 & 469.** Ilex Aqvifolium L: Sp. I. 125, II. 181; H. 32. **470.** Viburnum Tinus L: Sp. I. 267, II. 383; H. 69. **471.** Nerium Oleander L: Sp. I. 209, II. 305; H. 53.

472. SAMBUCUS fructu in umbella nigro *Tourn:* 606. *C. B:* 456. Sambucus *Matth:* 782. ○

473. SAMBUCUS laciniato folio *Tourn:* 606. *C. B:* 456. [S. lacinioso folio] *Dod:* 832. ○

474. SAMBUCUS humilis s: Ebulus *Tourn:* 606. *C. B:* 456. Caulis annuus. Folia pinnata. ○

475. OPULUS flore globoso *Tourn:* 607. Sambucus aqvatica flore globoso, pleno *C. B:* 456. Sambucus [V] aqvatica [II] polyanthos *Tabern:* III. 119. ○

476. CAPRIFOLIUM italicum *Tourn:* 608. *Dod:* 406. Periclymenum perfoliatum *C. B:* 302. Periclymenum italicum *Riv: mon: irr:* [I. tab: 123]. Periclymenum *Matth:* 626. ○

XIX. ARB: POLYPETALI.

477. TOXICODENDRON foliis integris *Mihi.* Toxicodendron triphyllum [triphyllon] *Tourn:* 611. Edera trifolia canadensis *Cornut:* 96. ○

478. PHILADELPHUS. Syringa alba s: Philadelphus Athenæi *C. B:* 398. *Tourn:* 617. ○

479. HIPPOCASTANUM vulgare *Tourn:* 612. Castanea folio multifido *C. B:* 419. Hippocastanum *Riv: pent: irr:* [III. tab: 350]. Castanea eqvina *Matth:* 624 [153]. Folia digitata. Flores spicati. ○

480. RHUS canadense, folio longiori, utrinqve glabro. *Tourn:* 611. Rhus angustifolium *C. B:* 414. Folia pinnata cum impari. ○

481. SPIRÆA foliorum margine integro *Mihi.* Spiræa Hyperici folio [non crenato] *Tourn:* 618. Pruno sylvestri affinis canadensis *C. B:* [*Pin: App:* p: 517. *Pluck: Phyt:* CCXVIII. 5. ○

482. SPIRÆA foliis serratis *Mihi.* Spiræa Salicis folio *Tourn:* 618. Frutex spicatus, foliis salignis, serratis *C. B:* 475. ○

483. TAMARISCUS narbonensis *Tourn:* [*App.* p.] 661. Tamarix altera, folio tenuiore s: gallica *C. B:* 485. ○

---

472. S. nigra L: Sp. I. 269, II. 385; H. 69. **473.** S. nigra γ laciniata L: Sp. I. 270, II. 386; H. 69. **474.** S. Ebulus L: Sp. I. 269, II. 385; saknas i Hort. Ups. **475.** Viburnum Opulus β roseum L: Sp. I. 268, II. 384; H. 69. **476.** Lonicera Caprifolium L: Sp. I. 173, II. 246; H. 42. **477.** Rhus Toxicodendron L: Sp. I. 266, II. 381; H. 68. **478.** Ph. coronarius L: Sp. I. 470, II. 671; H. 122. **479.** Æsculus HippoCastanum L: Sp. I. 344, II. 488; H. 92. **480.** R. glabrum L: Sp. I. 265, II. 380; H. 68. **481.** S. hypericifolia L: Sp. I. 489, II. 701; H. 131. **482.** S. salicifolia L: Sp. I. 489, II. 700; H. 131. **483.** Tamarix gallica L: Sp. I. 270, II. 386; H. 69.

484. ROSA maxima, multiplex *Tourn:* 637. *C. B:* 481. Rosa hortensis [hollandica], rubella, [plena], qvibusdam Centifolia, spinoso frutice *J. B:* II. 37. Petala centum comuniter.

485. ROSA flore albo pleno *Tourn:* 637. Antecedens fl: albo.

△ 486. ROSA versicolor *Tourn:* 637. *C. B:* 481. Rosa semiplena flore variegato *Wolck* [*Volck:* p: 359]. Flos variegatus.

487. ROSA sylvestris, foliis odoratis *Tourn:* 638. *C. B:* 483. Rosa Aglanteria [Eglenteria] *Tabern:* III. 170 [169]. Folia in caule odoratissima. Flores lutei.

○ 488. ROSA rubra multiplex *Tourn:* 638. *C. B:* 481. Gemena dubbla roser.

○ 489. VITIS vinifera *C. B:* 299.

490. RUBUS idæus fructu albo *Tourn:* 614. *C. B:* 479. Baccæ pallide luteæ.

○ 491. RUBUS humilis, Fragariæ folio, fructo rubro *Rudb: f: Act: Lit: Svec:* 1720 trimestr. 4 [p. 99.] et Diss: de eodem Rubo [*Dan:*] *Kiellandri* [anno 1716] sub Præsid: Ejusd. Nobil. Profess. RUDBECK, ubi Fig: Descr: et Historia.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

492. CORNUS hortensis mas *Tourn:* 641. *C. B:* 447. Cornus *Matth:* 192. *Besl: vern:* [hyem: ord: I. fol. 7 f. III c. flore].

○ 493. OSSEA [Loniceri & Rivini] *Rupp:* 82. Cornus foemina *Tourn:* 641. *C. B:* 447.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

● 494. PADUS exotica, folio amplo, crasso, sempervirente *Rupp:* 122. Laurocerasus *Tourn:* 628. Cerasus folio laurino *C. B:* 450.

○ 495. PUNICA, qvæ Malum Granatum fert *Tourn:* 636. Malus punica, sativa *C. B:* 138 [438]. Mala punica *Matth:* 173.

496. BERBERIS dumetorum *Tourn:* 014. *C. B:* 479 [454].

[Endast i handskriften på Leufsta.]

484.? R. centifolia L: Sp. I. 491, II. 704; H. 132. *ι*. **485.** R. alba *β* L: Sp. I. 492, II. 705; H. 132. *ϑ*. **486.** R. gallica *β* versicolor L: Sp. II. 704; H. 132. *η*. **487.** R. eglanteria L. Sp. I. 491, II. 703; H. 132. *ϰ*. **488.** R. gallica L: Sp. II. 704; H. 132. *β*. **489.** V. vinifera L: Sp. I. 202, II. 293; H. 50. **490.** R. idæus *β* L: Sp. 493, II. 706; H. 133. **491.** R. arcticus L: Sp. I. 494, II. 708; saknas i Hort. Ups. **492.** C. mas *β* L: Sp. I. 117, II. 171; H. 29. **493.** Cornus sanguinea L: Sp. I. 117, II. 171; saknas i Hort. Ups. **494.** Prunus LauroCerasus L: Sp. I. 474, II. 678; H. 126. **495.** P. Granatum L: Sp. I. 472, II. 676: H. 122. **496.** B. vulgaris F: Sp. I. 330, II. 471; saknas i Hort. Ups.

[XX.] ROSACEI ARB.

497. STAPHYLODENDRON *Tourn:* 616. *Matth:* 201. Pistacia sylvestris *C. B:* 401. Folia cum impari pinnata.

498. CYDONIA fructu breviore et rotundiore *Tourn:* 633. Mala cotonea minora *C. B:* 434.

499. MALUS pumila, qvæ potius frutex quam arbor, fructu candido *Tourn:* 632 [634]. *C. B:* 433. □

Paradisapel. Ceteras hortulanis numerandas relinqvo.

500. PYRUS sativa, fructu æstivo, longo, [oblongo], magno, partim rubro, partim albido [odorato] *Tourn:* 629. Bon chrestier.

501. PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccharato, odorato, e viridi flavescente, in ore liquescente *Tourn:* 629. Bergamotter.

502. PRUNUS sativa, vulgaris *Rupp:* 119. ○

503. PRUNUS fructu minori, austero *Tourn:* 623. Pruna Augusto maturescentia minora et austeriora *C. B:* 443. Color coeruleus. Fr: exiguus. Krikon.

504. PRUNUS sylvestris, præcox, altior *Tourn:* 623. Pruna sylvestria, præcocia *C. B:* 444. Tyska Slåen.

505. CERASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido *Tourn:* 625. Cerasa sativa, rotunda, rubra et acida, quæ nostris Cerasa sativa *C. B:* 449. Moreller. ○

506. CERASUS fructu acido, serotino, succi sanguinei *Tourn:* 625. Cerasa acidissima, sanguineo succo *C. B:* 450. Sylt kiersbär.

507. ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro *Tourn:* 623. Mala Armeniaca majora *C. B:* 442. Armeniaca malus *Matth:* 199 [184]. Folia betulina.

508. PERSICA molli carne et vulgaris, viridis et alba *Tourn:* 624. *C. B:* 440. Persica mala *Matth:* 182.

509. AMYGDALUS sativa, fructu majori *Tourn:* 627. *C. B:* 441. Amygdalæ *Matth:* 199.

---

497. Staphylea pinnata L: Sp. I. 270, II. 386; H. 69. **498.** Pyrus Cydonia *γ* L: Sp. I. 480, II. 687; saknas i Hort. Ups. **499.** Pyrus Malus *β* paradisiaca L: Sp. I. 479, II. 686; H. 130. **500.** P. communis *γ* pompejana L: Sp. I. 479, II. 686: H. 130. **501.** P. communis *β* falerna L: Sp. I. 479, II. 686; H. 130. **502.** Pr. domestica *γ* hungarica L: Sp. I. 475, II. 680; H. 124? **503.** Pr. domestica *ι* augustana L: Sp. I. 475, II. 680; saknas i Hort. Ups. **504.** Pr. insititia L: Sp. II. 680; saknas i Hort. Ups. **505.** Prunus Cerasus *α* capronaria L; Sp. I. 474, II. 679; H. 125. **506.** Prunus Cerasus *η* austera L: Sp. I. 474. II. 679; H. 125. **507.** Prunus Armeniaca L: Sp. I. 474, II. 679; H. 124. **508.** Amygdalus Persica L: Sp. I. 472, II. 676; H. 123. **509.** A. communis L: Sp. I. 473, II. 677; H. 123.

× 510. AURANTIUM acri medulla vulgare *Tourn:* 620. Malus Aurantia major *C. B:* 436. Aurantia mala *Matth:* 186. Malus auratia *Dod:* 780.

× 511. CITREUM vulgare *Tourn:* 620 [621]. Malus medica *C. B:* 435. *Dod:* 779.

512. EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus *Tourn:* 617. *C. B:* 428.

Årligen ätes des löf up uti Majo af *Erucis*, som uti Julio förbytas till små Papilioner, helt hwite med swarta spiuttor och wingar, som ståå nedföre. H:ka man hela sommaren med nöje får åskåda uti Academiæ Trägården.

[Endast i handskriften på Leufsta.]

XX. PAPILIONACEI ARB.

× 513. GENISTA juncea *Tourn:* 645 [643]. Genista *Matth:* 764. Spartium arborescens, seminibus Lentibus [Lenti] similibus C. *B:* 396.

514. NEPA *Raj:* Genistella spinosa *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 192]. Genistella [aculeata] *Tabern:* III. 184. Genista ibd: Genista Spartium minus, germanicum *Tourn:* 644 [645]. Genista spinosa, minor, germanica *C. B:* 395. Folia qvædam trifolia, qvædam integra.

× 515. COLUTEA vesicaria *Tourn:* 649. *C. B:* 396. Colutea *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 145]. *Matth:* 520. *Dod:* 772. Folia rotunda, pinnata.

○ 516. LABURNUM *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 187]. Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo *Tourn:* 648. Anagyris non foetida major l: alpina *C. B:* 391.

× 517. FALCATA incana *Riv: tetr: irr:* [II. tab: 85]. *Dill: Nov. plant. gen.* 130. Medicago trifolia, frutescens, incana *Tourn:* 412. Cytisus incanus, siliquis falcatis *C. B:* 389. Cytisus ut existimatur *Dod:* 559.

Tournefort förer denna till Herbas fl: papilionaceo, med naturen rätt, men mot sin egen Method.

---

510. Citrus Aurantium L: Sp. I. 782, II. 1100; H. 236. **511.** Citrus Medica L: Sp. I. 782, II. 1100; H. 236. 1. **512.** E. europæus α tenuifolius L: Sp. I. 197, II. 286; saknas i Hort. Ups. **513.** Spartium junceum L: Sp. I. 708, II. 995; H. 208. 1. **514.** Genista germanica L: Sp. I. 710, II. 999; saknas i Hort. Ups. **515.** C. arborescens L: Sp. I. 723. II. 1045; H. 228. 1. **516.** Cytisus Laburnum L: Sp. I. 739, II. 1041; H. 210. 1. **517.** Medicago arborea L: Sp. I. 778, II. 1096; H. 230. 5.

S. D. G.

Redit interdum animus ad sylvas et lustra sua.

CAROLI LINNÆI

HORTUS UPLANDICUS

SIVE

ENUMERATIO STIRPIUM,

QUÆ IN VARIIS HORTIS UPLANDIÆ, IMPRIMIS AUTEM IN HORTO BOTANICO UPSALIENSI REPERIUNTUR, NEC NON EARUM, QUÆ IN AGRIS SERUNTUR; SECUNDUM METHODUM PROPRIAM ET NOVAM A SEXU DESUMTAM FACTA, QVA PLANTÆ IN CERTAS CLASSES & SECTIONES DISTRIBUTÆ, NOMINIBUS SPECIFICIS NOVIS ET REALIBUS INSIGNIUNTUR.

STOCKHOLMIÆ 1731.

Origin. eges 1877/8 af kyrkoh. J. Johanson i Ifvetofta. Afskriften tagen 1877 $^{27}/_{7}$—$^{2}/_{8}$ af Ew. Åhrling.

L. B.

Cum Botanicas prælectiones publicas, proxime præterita æstate, cum consensu Nobilissimi et Generosissimi D:ni Ol. Rudbeck Fil: Anat. et Bot: prof: p. in Horto Academico Upsaliensi proponerem, a multis monitus sum, ut catalogum plantarum ibidem reperiundarum, conscriberem, sic enim Discentes *βοτανόφιλοι* labore illo levarentur, qvo hactenus unamquamque herbam sub dio, celeri manu in charta notare necesse habuerunt, qvod tamen sine defectu nominis fieri non potuit.

Hoc qvo minus hactenus perficere potuerim variis occupationibus impeditus fui, verum, qvoniam hac etiam æstate Lectiones Botanicæ mihi demandatæ sunt, iterum admonitus, præsentem catalogum conscripsi.

In hoc catalogo non tantum enumeravi omnes herbas in Horto Academico Upsaliensi plantatas, verum etiam eas, qvas in diversis hortis circa Upsaliam vel Holmiam observavi, nec non paucas in Hortis Lundensibus Scanorum mihi visas et heic non reperiundas, qvo hic catalogus tam studiosis Botanicis Lundinensibus qvam Upsaliensibus inserviret, imo etiam unicuique hortum aliqvem Magnatum ingredienti.

Et qvoniam nulla *Methodus* hactenus usu recepta mihi arrisit, *propriam* secutus sum, qvam propediem v. D. sub nomine *Nuptiæ Plantarum* publicæ luci dare animus est.

NOMINA aliqvot SPECIFICA NOVA herbis indidi, qvæ discernuntur ab omnibus aliis, heic repertis, sive sint hortenses, sive sylvestres.

VARIATIONES pro diversis speciebus, cum vulgo Botanicorum, non habui, sed eas, minusculis literis sub sua planta, addidi.

Si NOMINA qvædam GENERICA cuiqvam *nova* videntur, rationem hujus rei petat ex *Fundamentis* meis *Botanicis*, qvæ rite elaborata in publicum qvoque edere constitui.

Circa SYNONYMA *Casp: Bauhinum in Pinace* semper citavi, apud qvem Tyrones, omnes Auctores, qvi ante ipsum scripserunt,

qværant. *Tournefortium* propter characteres genericos, *Dodonæum* vero, *Tabernæmontanum* et *Matthiolum* propter figuras adduxi.

HERBAS SYLVESTRES in horto sæpe translatas frustra in hoc catalogo qværit Lector, eas enim consulto omisi, qvandoqvidem max: Rever: D:ns *Ol: Celsius* S. S. Theol. D: et P: P: in FLORA VPLANDICA brevi publicanda, illas omnes enumerat.

ARBORES ab HERBIS separare nolui, sed in gratiam Tyronum Asterisco * notavi, qvo facilius eas dignoscant.

Ubique BREVITATI litare studui, qvo libellus gratior acceptiorque fieret.

vale B. L. et fave ausis

dabam Upsaliæ
d. 13 maj styl: vet.
1731.

CAROLUS LINNÆUS.

Catalogus Hortorum præcipuorum, in qvibus plantas enumerandas collegi.

I. UPLANDIA

A. *Upsaliæ*

1. Hortus Botanicus Academicus.
2. Hortus Arcis Regius.
3. Hortus Celsianus.
4. Hortus Pharmaceuticus.

B. *Holmiæ*

5. Hortus Jacobinus Regius wid S: Jacob.[1])
6. Hortus Carlbergensis Regius.
7. Hortus Ulricensis Regius. Ulriksdahl.
8. Hortus Drottningholmensis.
9. Hortus Piperianus på Kungsholmen.[2])
10. Hortus Warmholtzianus på Söder-Malm.[3])
11. Hortus Golnitzianus på Norr-Malm.[4])
12. Hortus Alichianus ibid.[5])
13. Hortus Ingemarianus. Ingemarshof.[6])
14. Hortus Hornbergensis.[7])

C. *Roslagia*

15. Hortus Löfstadensis.

---

[1]) Kungsträdgården mellan vestra och östra Trädgårdsgatorna samt emellan Hamn- och Näckströmsgatorna.

[2]) På Kungsholmen utefter Bergsgatan emellan Trädgårdsgatan och Gröna Tvärgatan.

[3]) Warmholtz hade apoteket Markattan vid Stora Nygatan till sin död 1745.

[4]) Henrik Gollnitz' trädgård var belägen i hörnet af Stora Surbrunns- och Luntmakaregatorna, öster om den sednare. Gollnitz — en inflyttad tysk — var bekant som en utmärkt trädgårdsmästare.

[5]) Johan Alich, som för öfrigt är känd för en år 1722 utgifven trädgårdsbok, hade sin trädgård i hörnet af Stora Surbrunns- och Norrtullsgatorna.

[6]) Belägen nära Roslagstull.

[7]) Vid Ulfsundafjärden.

II. SMOLANDIA

16. Hortus Stenbrohultensis charis. patris.

III. SCANIA

17. Hortus Botanic: Acad: Lundensis.
18. Hortus Aschenbergianus. Hwitsiöfle.
19. Horti varii Malmogiæ.
20. Horti varii Christianstadii.

Divisio Methodi Nostræ.



Explicatio Methodi

in pagina antecedenti demonstratæ.



NB. Monogynia, Digynia, Tetragynia etc. idem est ac pistillum unicum, geminum qvaternum etc.

Class. I. MONANDRIA.

§. MONOGYNIA.

Exemp: Chara, Pinastella, Corispermum forte.

§. PENTAGYNIA.

Exemp: Aponogeton.

Class. II. DIANDRIA.

§. MONOGYNIA.

1. SYRINGA foliis cordiformibus acutis* *Mihi.* Syringa coerulea *C. B:* 398.

2. SYRINGA lusitanica. *Tabern:* 111. 133. fig. Lilac. *Tourn:* 601. Calobotrychis: *Renealm:* 30.

3. SYRINGA foliis lanceolatis. Syringa Ligustri folio *Rup:* 18. Lilac Ligustri folio *Tourn:* 602. *In Horto Piperiano.*

4. SYRINGA foliis inferioribus integris, superioribus laciniatis.* Syringa laciniato folio. *Rupp:* 24. meth: Lilac laciniato folio. *Tourn:* 602. Agem lilac persarum, laciniato folio. *Cornut:* 189. [188] desc: fig: Ligustrum foliis laciniatis. *C. B:* 476. *Prod:* 158.

5. LIGUSTRUM* *Matth:* 137. *Tourn:* 596. Ligustrum germanicum. *C. B:* 475.

6. JASMINUM foliis oppositis, petalis acutis. Jasminum vulgatius, flore albo. *C. B:* 397. *Tourn:* 597. Jasminum. *Dod:* 409. Gelseminum. *Matth:* 75.

1—2. Syringa vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 9, II. 11; Hortus Ups. 6. n. 1. **3.** S. persica L: *Spec. Pl.* I. 9, II. 11; H. 6. 2. **4.** S. persica β laciniata L: *Spec. Pl.* II. 11; H. 6. 3. **5.** Ligustrum vulgare L: *Spec. Pl.* I. 7, II. 10. **6.** Jasminum officinale L: *Spec. Pl.* I. 7, II. 9; H. 5. 1.

7. JASMINUM trifolium, foliis sparsis, petalis obtusis. Jasminum, sive Gelseminum luteum. *Tourn:* 597. Jasminum humile, luteum. *C. B:* 397.

Exemp: Veronica; Circæa. Saururus.

Class. III. TRIANDRIA.

§. MONOGYNIA.

8. A. VALERIANA foliis infimis integris, summis pennatim divisis. Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis. *C. B:* 164. *Tourn:* 132. Phu magnum. *Matth:* 34.

9. DICHOTOMA. Locusta. *Rivin: irr: mon:* I. tab. VI. *charact. fig.* Valerianella arvensis, præcox, humilis, semine compresso. *Tourn:* 132. Valeriana campestris, inodora, major. *C. B:* 165. Winter-Rapuntzel. *In Scania sponte provenit.*

10. B. CROCUS autumnalis. Crocus sativus. *C. B:* 65. *Tourn:* 350. Safran, qvod in officinis Croci nomine prostat, hujus pistillum est.

11. CROCUS vernalis, foliis styliformibus; cujus variationes

α. petalo violaceo

Crocus vernus, angustifolius, magno flore. *C. B:* 67. *Tourn:* 352.

β. candido

Crocus vern: angust: magno flore candido. *C. B:* 67. *Tourn:* 352.

γ. luteo striis coeruleis.

Crocus vern: angust: variegatus. *C. B:* 67. *Tourn:* 353.

12. GLADIOLUS. *Rivin: irr: mon:* I. tab. 110. *char: fig:* Gladiolus floribus uno versu dispositis, major et procerior. *C. B:* 41. *Tourn:* 365.

13. IRIS vulgaris, germanica sive sylvestris. *C. B:* 30. *Tourn:* 358. Iris vulgaris, violacea, s. purpurea, sylvestris. *J. B:* 11. 709. Swerdslilior.

14. IRIS lutea variegata Camerarii. *C. B:* 32. *Tourn:* 360. Iris variegata ex luteo et purpureo. *Camer:*

---

7. J. humile L: *Spec. Pl.* I. 7, II. 9; H. 5. 3. **8.** Valeriana Phu L: *Spec. Pl.* I. 32, II. 45; H. 13. 1. **9.** V. Locusta *α* olitoria L: *Spec. Pl.* I. 33, II. 47; H. 14. **10.** Crocus sativus *α* officinalis L: *Spec. Pl.* I. 36, II. 50; H. 15. **11.** C. sativus *β* vernus L: *Spec. Pl.* I. 36, II. 50; H. 15. **12.** Gladiolus communis L: *Spec. Pl.* I. 36, II. 52; H. 16. **13.** Iris germanica L: *Spec. Pl.* I. 38, II. 55; H. 16. 1. **14.** I. variegata L; *Spec. Pl.* I. 38, II. 56; H. 16. 2.

15. IRIS dalmatica major. *C. B:* 31. *Tourn:* 359. Iris dalmatica major, flore vulgari, minus violaceo. *J. B:* 2: 715.

16. IRIS petalis imberbibus, fructu hexagono, apicibus petalorum ovatis, extrorsum acutioribus. Iris pratensis, angustifolia, folio foetido. *C. B:* 32. *Tourn:* 360. Iris angustifolia 1. *Clus: Besl: hort Eist. ord.* 3. fol. 3. fig. 3.

17. IRIS petalis imberbibus, fructu trigono, apicibus petalorum ovatis, extrorsum latioribus.

18. IRIS pratensis, angustifolia, non foetida, altior. *C. B:* 32. *Tourn:* 361. *Rudb: Camp: El:* II [I]. p. 198. f. II.

19. IRIS petalis imberbibus, fructu hexagono, caule ancipiti. Iris graminea, cui pereunt qvotannis folia. *J. B:* II. 727. Iris angustifolia, prunum redolens, minor *C. B:* 33. *Tourn:* 361. *Rudb: Camp: El:* II [I] p. 200. f. 9.

§. DIGYNIA.

20. GRAMEN paniculatum, aqvaticum, Phalaridis semine, folio variegato. *Tourn:* 523. *Scheuchz:* 127. Descr. Gramen paniculatum, folio variegato. *C. B:* 3. Spanskt gräs.

21. SECALE

α. Vere satum.

Secale vernum vel minus. *C. B:* 23. *Mont:* 4. *syn: char:* Rogga s. secale *Dod:* 499.

In Uplandia raro, in Smolandia autem comuniter seritur.

β. Autumno satum

Secale hybernum vel majus. *C. B:* 23. *Mont:* 3. Secale *Matth:* 311. *In agris ubiqve.* Winter-rog.

22. HORDEUM spica hexagono-angulata. Hordeum polystichum vernum. *C. B:* 22. *Mont:* 4. Hordeum. *Matth:* 306. *In agris semper.* Korn.

23. HORDEUM spica compressa. Hordeum distichon. *C. B:* 23. *Dod:* 501. Oelands korn. *Heic rarius.*

24. TRITICUM spica angulata, aristata. Triticum spica Hordei londinensibus *Ray. syn:* 387. *Mont:* 3. Hordeum nudum sive gymno-

---

15.? I. Sambucina L: *Spec. Pl.* II. 55. **16.** I. spuria L: *Spec. Pl.* I. 39, II. 58; H. 17. 5. **17—18.** I. sibirica L: *Spec. Pl.* I. 39, II. 57; H. 17. 4. **19.** I. graminea L: *Spec. Pl.* I. 39, II. 58; H. 17. 6. **20.** Phalaris arundinacea *β* picta L: *Spec. Pl.* I. 55, II. 80. **21.** Secale cereale L: *Spec. Pl.* I. 84, II. 124; H. 22. **22.** Hordeum hexastichon & vulgare L: *Spec. Pl.* I. 85, II. 125; H. 22. **23.** H. distichum L: *Spec. Pl.* I. 85, II. 125; H. 23. 24. **24.**?

crithon. *J. B:* II. 430 descr. Zeopyrum sive Tritico-speltum *C. B:* 22. Zeopyron. *Dod:* 495. In agris inter ultimam speciem qvandoqve reperitur.

25. TRITICUM aristatum, glumis hirsutis. Triticum cinereum, maximis aristis donatum, triturando glumas deponens. *Mont.* 2. *J. B:* 408. Triticum aristatum, spica maxima, cinerea, glumis hirsutis. *Raj. s:* 387. Cum priori.

26. TRITICUM muticum. Triticum hybernum, aristis carens. *C. B:* 21. *Mont:* 2. Triticum. *Dod:* 480 [in ed. 1583, p. 489 in ed. 1616].

27. AVENA. *Dod:* 511. *Semine nigro:* Avena nigra. *C. B:* 23. *Mont:* 6. *Semine albo:* Avena vulgaris s. alba. *C. B:* 23. *Mont:* 6. Hafre.

28. PANICUM spica digitiformi. Panicum italicum s. panicula majore. *C. B:* 27. *Tourn:* 515. Panici indici spica. *Dod:* 498.

29. PHALARIS major semine albo. *C. B:* 28. Gramen spicatum, semine miliaceo albo. *Tourn:* 518.

Class. IV. TETRANDRIA.

§. MONOGYNIA.

30. ALCHYMILLA foliis digitatis. Alchimilla Qvinqvefolii folio, subtus argenteo. *Tourn:* 508. Alchimilla alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli profunde secto. *Rupp: alt:* 51.

31. ALCHIMILLA perennis, incana, argentea s. sericea, satinum provocans. *Volck:* 16. Tormentilla alpina, folio sericeo. *C. B:* 326.

32. PLANTAGO spica foliosa, cujus foliola petalis multo longiora. Plantago latifolia, rosea, floribus qvasi in spica dispositis. *C. B:* 189. *Tourn:* 126. Plantago multiplex. *Tabern:* II. 408.

33. PLANTAGO ramosa, procumbens, foliis lanceolatis. Psyllium minus. *C. B:* 191. *Prod:* 99. *Tourn:* 129.

34. AQVIFOLIUM foliis subrotundis, margine spinosis. Aqvifolium s. Agrifolium vulgo. *J. B:* I. 114. *Tourn:* 600. Aqvifolium. *Matth:* 131. Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato. *C. B:* 425.

25.? Triticum polonicum L: *Spec. Pl.* II. 127. **26.** T. hybernum L; *Spec. Pl.* I. 86. II. 126; H. 21. 2. **27.** Avena sativa L: *Spec. Pl.* I. 79, II. 118; H. 20. **28.** Panicum italicum L: *Spec. Pl.* I. 56, II. 83; H. 19. **29.** Phalaris canariensis L: *Spec. Pl.* I. 54, II. 79; H. 19. **30—31.** Alchemilla alpina L: *Spec. Pl.* I. 123, II. 179. **32.** Plantago major γ L: *Spec. Pl.* I. 113, II. 163; H. 29. 3 β. **33.** P. Psyllium L: *Spec. Pl.* I. 115; II. 162; H. 29. 2. **34.** Ilex Aqvifolium L: *Spec. Pl.* I. 125, II. 181; H. 32.

α margine albicante: Aqvifolium foliis subrotundis, spinis et limbis argenteis. *Tourn:* 600.

35. CORNUS arborea. Cornus hortensis mas. *C. B:* 447. *Tourn:* 641. Cornus *Matth:* 192. *S. Paul.* 2 c. fructu. *Besl. hyem:* fol. 9. c. flore.

36. CORNUS herba [Cornus herbacea uniflora]. Mesomora alba, baccis in corymbo rubris. *Rudb: fil: Act: lit: Svec:* 1720 p. 97. Herba Paris flore magno polyclonos [polycoccas] edulis. *Rudb: f: it. Lap:* 11. Chamæpericlymenum. *Raj. s.* 261. Periclymenum humile norvegicum. *C. B:* 302. Alsine baccifera svecorum. *Rudb: H: Ups: Franck:* Spec. p. 3. *In horto Celsiano. In Smolandia sponte provenit.*

37. OSSEA. *Rupp:* 82. Virga sangvinea. *Dill: n. pl. gen:* 145. *Matth:* 192. Cornus foemina *C. B:* 447. *Tourn:* 641. *In Scania sponte.*

38. EVONYMUS. *Matth:* 152. Evonymus vulgaris, granis rubentibus *C. B:* 248. *Tourn:* 617. Cum priori.

39. EPIMEDIUM *C. B:* 323. *Tourn:* 232. *Moris:* II p. 196. 2. t. 20. f. 5. figur.

40. B. RUBIA sativa. *Matth:* p. 598. Rubia tinctorum sativa. *C. B:* 333. *Tourn:* 114.

41. C. DIPSACUS capitulis pyramidalibus. Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. *C. B:* 385. *Tourn:* 466. Labrum veneris alterum. *Matth:* p. 450.

42. DIPSACUS capitulis convexis. Dipsacus sylvestris, capitulo minore, vel Virga pastoris minor. *C. B:* 385. *Moris:* III. p. 158. s. 7. t. 36. f. 5. Virga pastoris. *Matth:* 451.

43. SCABIOSA capitulis fastigiatis, flosculorum lacinia exteri acuta. Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo. *C. B:* 270. *Tourn:* 465. *Moris:* III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26.

44. SCABIOSA capitulis hæmisphæricis, flosculis exterioribus reflexis, interioribus erectis. Scabiosa alpina, foliis Centaurii majoris. *C. B:* 270. *Tourn:* 465. *Moris:* III. p. 46. s. 6. t. 13. f. 10. Scabiosa alpina, centauroides. *Besl. æst:* 6. fol. 8.

Exemp: Unifolium, Aparine, Asperula, Gallium, Sherardia, Camphorata.

---

35. Cornus mas *β* L: *Spec. Pl.* I. 117, II. 171; H. 29. **36.** C. Suecica L: *Spec. Pl.* I. 118, II. 171. **37.**? **38.** Evonymus europæus L: *Spec. Pl.* I. 197, II. 286. **39.** Epimedium alpinum L: *Spec. Pl.* I. 117, II. 171; H. 29. **40.** Rubia tinctorum L: *Spec. Pl.* I. 109, II. 158; H. 28. **41.** Dipsacus fullonum L; *Spec. Pl.* I. 97, II.1 40; H. 25. 1. **42.** D. pilosus L: *Spec. Pl.* I. 97, II. 141; H. 25. 2. **43.** Scabiosa atropurpurea L: *Spec. Pl.* I. 100, II. 144; H. 26. 3. **44.** S. alpina L: *Spec. Pl.* I. 98, II. 141; H. 26. 1.

§. DIGYNIA.

45. HYPECOUM. *C. B:* 172. Hypecoon. *Dod:* 446. Hypecoon latiore folio. *Tourn:* 230. Hypecoon siliqvis erectis, articulatis, incurvis. *Moris:* II. p. 279. Cuminum sylvestre (II) *Matth:* 506.

46. SANGVISORBA capitulis subrotundis. Sangvisorba major, pratensis. *Rupp:* 58. Pimpinella saxifraga, major. *C. B:* 160. *Tourn:* 156. *Moris:* III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 7.

47. SANGVISORBA capitulis spicæformibus. Sangvisorba canadensis, flore albo, spicato. *Rupp:* 58. Pimpinella maxima, canadensis. *Cornut:* 175. fig. 174. *Tourn:* 157.

§. TETRAGYNIA.

48. RHODIA. Rhodia radix. *C. B:* 286. Anacampseros, radice Rosam spirante major. *Tourn:* 264. Telephium luteum, minus, radice Rosam redolente. *Moris:* III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8.

Sponte provenientem in Wallawari monte altissimo Laponiæ Lulensis, prope Qvickjock reperit Nob. et Gener. D:ns O. Rudbeck fil.

Class. V. PENTANDRIA.

§. MONOGYNIA.

49. A. CHENOPODIUM foliis oblongis, ad latera sinuatis. Chenopodium ambrosioides, folio sinuato. *Tourn:* 506. Botrys ambrosioides vulgaris. *C. B:* 138. Botrys *Matth:* 565. *S. Paull:* 182. fig. Atriplex odora s: svaveolens. *Moris:* II. 605.

50. CHENOPODIUM foliis oblongis, dentatis. Chenopodium svaveolens, foliis longioribus, mexicanum *Rupp:* 318. Chenopodium ambrosioides, mexicanum. *C. B:* 516. descr.

51. CHENOPODIUM foliis lanceolatis, ad alas villosum. Chenopodium Lini folio villoso. *Tourn:* 506. Belle vedere. *Volck:* 59. Osyris *Dod:* 101. Linaria scoparia. *Tabern:* II. 102. Herba studiosorum: *Tabern:* II. 102.

---

45. Hypecoum procumbens L: *Spec. Pl.* I. 124, II. 181; H. 31. 1. **46.** Sanguisorba officinalis L: *Spec. Pl.* I. 116, II. 169. **47.** S. canadensis L: *Spec. Pl.* I. 117, II. 169. **48.** Rhodiola rosea L: *Spec. Pl.* I. 1035, II. 1465. **49.** Chenopodium Botrys L: *Spec. Pl.* I. 219, II. 320; H. 55. 5. **50.** C. ambrosioides L: *Spec. Pl.* I. 219, II. 320; H. 56. 6. **51.** C. Scoparia L: *Spec. Pl.* I. 221, II. 321; H. 55. 2.

52. HALIMUS latifolius s. fruticosus. *C. B:* 120. Atriplex latifolia s: Halimus fruticosus. *Tourn:* 505.

53. HALIMUS s: Portulaca marina. *C. B:* 120. Atriplex marina, angustissimo folio. *Tourn:* 505.

54. MOROCARPUS major. *Rupp. alt:* 271. Chenopodio-morus major. *Boerh:* II. 91. Atriplex Mori fructu major, s. Fragifera major. *Moris:* II. p. 606. s. 5. t. 32. f. 1. Spinachia fragifera *Zorn:* 648 tab. 1.

55. B. ECHIOIDES flore pullo, calyce amplo. *Rupp: alt:* 177. Buglossoides. *Kram:* 106. Buglossum procumbens, annuum, pullo minimo flore. *Moris:* III. p. 439. s. 11. t. 26. f. 11.

56. HELIOTROPIUM. *Dod:* 10. Heliotropium majus Dioscoridi. *C. B:* 253. *Tourn:* 139.

57. LITHOSPERMUM ramulis reflexis. Lithospermum majus erectum. *C. B:* 258 *Tourn:* 137. Lithospermum minus. *Matth:* 596.

58. BORRAGO. *Dod:* 616 [in ed. 1583, p. 627 in ed. 1616]. Buglossum latifolium, Borrago. *C. B:* 256. *α. Floribus coeruleis:* Borrago floribus coeruleis. *Tourn:* 133. *β. Floribus albis:* Borrago floribus albis. *Tourn.*

59. CONSOLIDA. *Rivin. apud Rupp:* 8. Symphytum Consolida major. *C. B:* 259. Symphytum majus s. Consolida major. *Matth:* 620.

α. Floribus violaceis: Symphytum, Consolida major, flore purpureo, qvæ mas. *Tourn:* 138.

β. Floribus albis: Symphytum, Consolida major, flore albo, qvæ foemina. *Tourn:* 138.

60. CERINTHE qvorundam flore flavo. *Tourn:* 80. Cerinthe minor. *C. B:* 258.

61. C. MIRABILIS. *Rupp:* 1. Solanum mexicanum, flore magno. *C. B:* 168. Mirabile peruvianum. *Moris:* III. p. 592. s. 15. t. 1. f. 1. Viola peruviana. *Tabern:* II. 31.

α. Floribus albis: Jalappa, flore exalbido. *Tourn:* 129.

β. Floribus purpureis: Jalappa, flore purpureo. *Tourn:* 129.

γ. Floribus e luteo et purpureo diversimodo coloratis: Jalappa, flore ex purpureo et luteo mixto. *Tourn:* 129.

---

52. Atriplex Halimus L: *Spec. Pl.* I. 1052, II. 1492. **53.** A. Portulacoides L: *Spec. Pl.* I. 1053, II. 1493. **54.** Blitum capitatum L: *Spec. Pl.* I. 4, II. 6; H. 3. **55.** Lycopsis vesicaria L: *Spec. Pl.* I. 138, II. 198; H. 35. **56.** Heliotropium europæum L: *Spec. Pl.* I. 130, II. 187; H. 83. **57.** Lithospermum officinale L: *Spec. Pl.* I. 132, II. 189. **58.** Borago officinalis L: *Spec. Pl.* I. 137, II. 197; Borrago H. 34. **59.** Symphytum officinale L: *Spec. Pl.* I. 136, II. 195. **60.** Cerinthe minor L: *Spec. Pl.* I. 137, II. 196. **61.** Mirabilis Jalapa L: *Spec. Pl.* I. 177, II. 252; H. 43.

62. PRIMULA disco petali concavo.

α. Perianthio immutato, petalo ferrugineo: Primula veris hortensis, flore ferrugineo, umbellato. *Tourn:* 124.

β. Periant: petaliformi: Primula veris caulifera, prolifera, odorata. *Tourn:* 125. Primula veris florifera. *Tabern:* II. 33. Verbasculum proliferum. *C. B:* 242. *Moris:* II. p. 554. s. 5. t. 24 f. 2.

63. PRIMULA disco petali plano. Primula veris, pallido flore, elatior. *Tourn:* 124. Primula veris major. *Dod:* 147. Verbasculum pratense vel sylvaticum, inodorum. *C. B:* 241.

α. Perianthio petaliformi, petalo luteo: Primula veris prolifera, flore majore. *Tourn:* 125.

β. Perianthio petaliformi, petalo variegato: Primula veris, flore gemino, inodoro. *Tourn:* 124.

γ. Perianthio immutato, flore pleno: Primula veris multiflora, sylvestris. *Tourn:* 124. *Tabern:* II. 34. Verbasculum sylvestre, magno plenoqve flore. *C. B:* 242.

64. PRIMULA disco petali infundibuliformi.

α. Petalo purpureo: Auricula ursi, flore purpureo. *Tourn:* 120. Sanicula alpina, purpurea. *C. B:* 242

β. Petalo nigricante sericeo. Auricula ursi, flore magno, atropurpureo, holoserico, umbone candido, amplissimo. *Tourn:* 120.

γ. Petalo variegato: Auricula ursi, flore variegato. *Tourn:* 121. Sanicula alpina, flore variegato. *C. B:* 242.

65. VIOLA flagellis procumbentibus, flore odorato. Viola martia, purpurea, flore simplici, odoro. *C. B:* 199. *Tourn:* 419. Marsfioler.

Flore pleno: Viola martia, multiplici flore coeruleo. *C. B:* 199. *Tourn:* 419.

66. VIOLA erecta, petalis sericeis. Viola tricolor, hortensis, repens, an *φλόξ καὶ φλόγιον* Theophrasti. *C. B:* 199. *Tourn:* 140. Viola tricolor. *Dod:* 159.

67. IMPATIENS floribus petiolis propriis innixis. Balsamina foemina. *C. B:* 306. *Tourn:* 418. *Tabern:* II. 541.

Floribus albis: Balsamina foemina, flore candido. *Tourn:* 418.

68. TAMARISCUS germanica. Tamarix fruticosa, folio crassiore s. germanica. *C. B:* 485.

---

62. Primula veris officinalis L: *Spec. Pl.* I. 142, II. 204; H, 37. 3. α & β. **63.** P. veris β elatior L: *Spec. Pl.* I. 143, II. 204; H. 37. **64.** P. Auricula L: *Spec. Pl.* I. 143, II. 205; H. 36. **65.** Viola odorata L: *Spec. Pl.* I. 934, II. 1324; H. 276. **66.** V. tricolor β L: *Spec. Pl.* I. 936, II. 1326; H. 276. **67.** Impatiens Balsamina L: *Spec. Pl.* I. 938, II. 1328; H. 276. **68.** Tamarix germanica L: *Spec. Pl.* I. 271, II. 387.

69. NICOTIANA foliis amplexicaulibus. Nicotiana major, latifolia. *C. B:* 169. *Tourn:* 117. Hyoscyamus peruvianus. *Dod:* 449. Petum mas. *Neand: Tabac. fig.* Tabacum. *S. Paul.* 367. *fig.* Blennochois. *Reneal:* 38. *fig. descr.*

70. PETUM. *Rivin. apud Rupp:* 24. Priapeja *Knaut:* 56. Priapeja, quibusdam Nicotiana minor. *J. B:* III. 270. Hyoscyamus tertius. *Matth:* 506. Nicotiana foemina. *S. Paul:* 253. fig. Pachyphylle. *Reneal:* 40. descr.

Ad genus Nicotianæ ob faciem externam satis accedit, repugnant tamen partes fructificationis omnes in Figura.

71. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo. *Tourn:* 119. Solanum foetidum, fructu spinoso, oblongo. *C. B:* 168.

72. VERBASCUM capsulis globosis, foliis dentatis, glabris. Blattaria lutea, folio longo, laciniato. *C. B:* 240. *Tourn:* 147. Blattaria annua, ramosa, floribus luteis, staminibus purpureis. *Moris:* II. p. 489. s. 5. t. 9. ad. decim: ref: Blattaria. *Matth:* 718.

73. LYSIMACHIA humifusa, foliis rotundis. Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo. *Tourn:* 147. Nummularia supina, seu Nummularia officinarum. *Rupp:* 19. Nummularia major, lutea. *C. B:* 309.

74. CONVOLVULUS foliis cordiformibus. Convolvulus purpureus, folio subrotundo. *C. B:* 245. *Tourn:* 82. *Moris:* II. p. 183. s. 1. t. 3. f. 7.

75. CONVOLVULUS foliis tricuspidatis, angulis posticis abscissis. Convolvulus major, albus, *C. B:* 294. *Tourn:* 82. Convolvulus major, albus, flore majore, albo. *Moris:* II. p. 13. s. 1. t. 3. f. 7. Convolvulus lævis, major. *Dod:* 388.

76. CONVOLVULUS caule erecto, foliis oblongis. Convolvulus peregrinus, coeruleus, folio oblongo. *C. B:* 295. Convolvulus non Convolvulus vulgo. *In horto Golnitziano.*

77. POLEMONIUM.

α. Floribus coeruleis. Polemonium vulgare, coeruleum. *Tourn:* 146. Valeriana alata, Blattariæ flore coeruleo. *Moris:* II. 605. Valeriana coerulea. *C. B:* 164.

---

69. Nicotiana Tabacum L: *Spec. Pl.* I. 180, II. 258; H, 45. **70.** N. rustica L: *Spec. Pl.* I. 170, II. 258; H. 45. **71.** Datura Stramonium L: *Spec. Pl.* I. 179, II. 255; H. 43. **72.** Verbascum Blattaria L: *Spec. Pl.* I. 178, II. 254; H. 46, **73.** L. Nummularia L: *Spec. Pl.* I. 148, II. 211. **74.** Convolvulus hederaceus L: *Spec. Pl.* I. 154; Convolvulus purpureus II. 219; H. 38. 1. **75.** C. Sepium L: *Spec. Pl.* I. 153, II. 218. **76.** C. tricolor L: *Spec. Pl.* I. 158, II. 225; H. 38. 2. **77.** Polemonium coeruleum L: *Spec. Pl.* I. 162, II. 230.

β. Fl: albis. Polemonium vulgare, album. *Tourn:* 146. Valeriana alba. *C. B:* 464.

78. CAMPANULA pyramidalis, altissima. *Tourn:* 109. Rapunculus hortensis, latiori folio s. Pyramidalis. *C. B:* 93. Pyramidalis lævis. *J. B:* II. 808. *In horto Warmholtziano et Golnitziano.*

79. CAMPANULA maxima, foliis latissimis.

α. Fl. coeruleis: C. B: 94. *Tourn:* 108. Campanula pulchra, a Tossano Carolo missa. *J. B:* II. 807.

β. Fl. albis: Campanula maxima, foliis latissimis, flore albo. *C. B:* 94. *Tourn:* 109.

80. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici et triplici coeruleo. *Tourn:* 109.

Fl. albis: Campanula vulg: fol: Urt: fl: dupl: albo. *Tourn:* 109.

81. TINUS foliis ovatis, subtus ad exortum venarum levi hirsutie aspersis.* Tinus prior. *Tourn:* 607. *Tabern:* III. 46. Laurus sylvestris, Corni foeminæ foliis subhirsutis. *C. B:* 461.

82. TOXICODENDRON foliis integris.* Toxicodendron triphyllum. *Tourn:* 611. Edera trifolia, canadensis. *Cornut:* 96.

83. ALATERNUS. *Tourn:* 595. Alaternus Turneri. *Tabern:* III. 132. Alat. Clusii ibidem. Phylica elatior. *C. B:* 476.

α. Foliorum margine lutescente. Alaternus aurea, foliis ex luteo variegatis *Tourn:* 595.

84. ALATERNUS seu Phylica, foliis angustioribus, profunde serratis. *Boerh:* II. 214.

85. PASSIFLORA foliis crenatis, tripartito divisis. *Pluk: Alm:* 281. Granadilla hispanis, Flos passionis italis. *Tourn:* 240. Granadilla trifolia, flore roseo, clavato. *Volck:* 199. Clematis trifolia, flore roseo, clavato. *C. B:* 301.

86. CAPRIFOLIUM ramulis floriferis, perfoliatis.* Caprifolium italicum. *Dod:* 406. *Tourn:* 608. Periclymenum italicum. *Rivin: irr: mon:* Periclymenum perfoliatum. *C. B:* 302.

---

78. Campanula pyramidalis L: *Spec. Pl.* I. 164, II. 233. **79.** C. latifolia L: *Spec. Pl.* I. 165, II. 233. **80.** C. Trachelium L: *Spec. Pl.* I. 166, II. 245. **81.** Viburnum Tinus L: *Spec. Pl.* I. 267, II. 383; H. 69. **82.** Rhus Toxicodendron L: *Spec. Pl.* I. 266, II. 381; H. 68. **83—84.** Rhamnus Alaternus L: *Spec. Pl.* I. 193, II. 281; H. 67. **85.** Passiflora incarnata L: *Spec. Pl.* I. 959, II. 1360; H. 278. 2. **86.** Lonicera Caprifolium L: *Spec. Pl.* I. 273, II. 246; H. 42. 1.

87. VIBURNUM. *Matth:* 217. *C. B:* 429. *Tourn:* 607. Lantana. *Dod:* 81.

[Pentandria Trigyn. i Leufsta ex.]

In Horto Ulriksdahl.

88. SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, serratis. * Sambucus fructu in umbella nigro. *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Sambucus. *Matth:* 782. Fläder. Hylträd.

89. SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, multifidis. * Sambucus laciniato folio. *C. B:* 456. *Tourn:* 606. *Dod:* 832.

90. SAMBUCUS herbacea. Sambucus humilis, s: Ebulus. *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Ebulus. *Pont: Anth:* 270. *Charact. Tilland:* 102 fig.

91. SAMBUCUS foliis simplicibus, laciniatis, floribus omnibus castratis. * Opulus flore globoso. *Tourn:* 607. Sambucus aquatica, flore globoso, pleno. *C. B:* 456. Sambucus aquatica, polyanthos. *Tabern:* III. 119. Snöbollar.

92. VITIS vinifera. * *C. B:* 299. Winranka.

93. SOLANUM fruticosum. * Solanum fruticosum, bacciferum. *C. B:* 166. *Tourn:* 149. Pseudo-capsicum. *Dod:* 706.

94. SOLANUM tuberosum. Solanum tuberosum, esculentum, flore albo. *C. B:* 167. *Prod.* 87. *fig. Tourn:* 149. *Moris:* III. p. 528. s. 13. t. 1. f. 19. Papas et potatoes *vulgo.*

95. SOLANUM pomiferum, foliis pinnatis, serratis. Solanum pomiferum. *C. B:* 167. Lycopersicon Galeni. *Tourn:* 150. Aurantia mala. *Dod:* 706. Solanum amorellum, malis aureis. *Francken.:* Spec. ed. II. p. 28. Poma amoris Hortulanis.

96. CAPSICUM fructu oblongo, leviter incurvato. Capsicum siliquis longis, propendentibus. *Tourn:* 152. Solanum urens, siliqua propendente, rubra. *Moris:* III. p. 528. s. 13. t. 2. f. 1. Piper indicum, vulgatissimum. *C. B:* 102.

97. ALKEKENGI officinarum. *Tourn:* 151. Solanum vesicarium, vulgare, repens, fructu et vesica rubra. *Moris:* III. p. 526. s. 13. t. 3. f. 16. Solanum vesicarium. *C. B:* 166.

Exemp: Buglossum, Cynoglossum, Pulmonaria, Scorpiuros, Echium, Androsace, Hottonia, Parnassia, Menyanthes, Centaurium,

---

87. Viburnum Lantana L: *Spec. Pl.* I. 268, II. 384. **88.** Sambucus nigra L: *Spec. Pl.* I. 269, II. 385; H. 69. **89.** S. nigra γ laciniata L: *Spec. Pl.* I. 270. II. 386; H. 69. **90.** S. Ebulus L: *Spec. Pl.* I. 269, II. 385. **91.** Viburnum Opulus β roseum L: *Spec. Pl.* I. 268, II. 384. **92.** Vitis vinifera L: *Spec. Pl.* I. 202, II. 293; H. 50. **93.** Solanum Pseudocapsicum L: *Spec. Pl.* I. 184, II. 263; H. 48. 1. **94.** Solanum tuberosum L: *Spec. Pl.* I. 185, II. 265; H. 48. 3. **95.** S. Lycopersicum L: *Spec. Pl.* I. 185, II. 265; H. 49. 4. **96.** Capsicum annuum L: *Spec. Pl.* I. 188, II. 270; H. 47. **97.** Physalis Alkekengi L: *Spec, Pl.* I. 183, II. 262; H. 49.

Persicaria, Hydrophyllum, Herniaria, Leontopetalon, Glaux. Cyclamen, Hyoscyamus, Diervilla, Viburnum, Tilia, Frangula.

§. DIGYNIA.

98. IMPERATORIA. *Rivin. irr. pent.* tab. 241. Imperatoria major. *C. B:* 156. *Tourn:* 317. Mästerört.

99. PASTINACA sativa, latifolia. *C. B:* 115. *Tourn:* 319. Pastinaca domestica. *Matth:* 500. Pastinaca. *S. Pauli:* 311. Palsternack (L.)

100. ANETHUM seminibus rotundis, planis. Anethum hortense. *C. B:* 147. *Tourn:* 318. Anethum. *Dod:* 296. Dill.

101. ANETHUM seminibus oblongis, convexis. Foeniculum vulgare, germanicum. *C. B:* 147. *Tourn:* 311. Foeniculum. *Dod:* 295. *Matth:* 517. *Tilland:* 86. Fenkåhl (L.).

102. PIMPINELLA foliis oblongis, acuminatis.

α. Fl: albis: Pimpinella saxifraga, major, umbella candida. *C. B:* 159. Tragoselinum majus, umbella candida. *Tourn:* 309.

103. CHÆROPHYLLUM. *Dod:* 688. Chærophyllum sativum. *C. B:* 152. *Tourn:* 314. Cerefolium. *Rivin: irr: pent.* Kyrfwel. (L.). Cerefolium semestre. *Jungerman. apud Burser.* VII. 46.

104. APIUM. *Rivin: irr. pent.* Apium dulce, Celeri italorum. *Tourn:* 302. Apium palustre et Apium officinarum. *C. B:* 154. *Tourn:* 305. Eleoselinum. *Dod:* 683. Celeri vulgo. (L.).

105. ANISUM foliis infimis simplicibus. Anisum herbariis, semine majori. *C. B:* 158. Anisum. *Rivin. pent. irr.* III. t. 306, 307. Apium, Anisum dictum, semine svaveolenti, majori. *Tourn:* 105. Anis.

106. ANISUM foliis infimis compositis.

α. Margine plano: Apium hortense s. Petroselinum vulgo. *C. B:* 153. *Tourn:* 305. Apium hortense. *Dod:* 682. *Matth:* 511. Persilia.

β. Margine undulato: Apium vel Petroselinum, crispum. *C. B:* 153. *Tourn:* 305. Apium crispum. *Rivin. pent. irr.* III. t. 90. *Tabern:* I. 257.

Petroselinum cum Aniso sine ratione sufficiente non conjunxi. Vid: Fundamenta mea botan:

---

98. Imperatoria Ostruthium L: *Spec. Pl.* I. 259. II 371; H. 65. **99.** Pastinaca sativa *β* L: *Spec. Pl.* I. 262, II. 376; H. 66. **100.** Anethum graveolens L: *Spec. Pl.* I. 263, II. 377; H. 66. 1. **101.** A. Foeniculum L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 377; H. 66. 2. **102.** Pimpinella saxifraga major *γ* & *δ* L: *Spec. Pl.* I 264, II. 378. Jfr Hort. Cliff. p. 107. **103.** Scandix Cerefolium L: *Spec. Pl.* I. 257, II. 268. **104.** Apium graveolens L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 379; H. 67. **105.** Pimpinella Anisum L: *Spec. Pl.* I. 264. II. 379; H. 67. **106.** Apium Petroselinum L: *Spec. Pl.* I. 264, II. 379; H. 67.

107. MYRRHIS perennis, alba, odorata. *Moris:* III. s. 9. t. 10. f. 1. Myrrhis major vel Cicutaria odorata. *C. B:* 160. *Tourn:* 315. Myrrhis. *S. Pauli:* 87. fig. Odorata *Rivin. irr. pent.* III. t. 290. Spansk kyrfwel.

108. CORIANDRUM majus. *C. B:* 158. *Tourn:* 316. Coriandrum. *Rivin. irr. pent.* III. t. 303—305.

109. PEUCEDANUM. Peucedanum germanicum. *C. B:* 149. *Tourn:* 318. Peucedanum majus, brevioribus foliis, germanicum. *Moris:* III. p. 112. s. 9. t. 15. f. 2.

110. MEUM. *Dod:* 302. Meum foliis Anethi. *C. B:* 148. *Tourn.* 112. Meum vulgare, tenuifolium. *Moris:* III. p. 270.

111. DAUCUS sativus, radice lutea. *Tourn:* 307. Staphylinus sativus. *Rivin. irr. pent.* III. t. 262. Pastinaca tenuifolia, sativa. *C. B:* 157. Morot.

112. SIUM tuberosum. Sisarum germanorum. *C. B:* 155. *Tourn:* 309. Sisarum. *Rivin. irr. pent.* III. t. 289. Siser. *Matth:* 334. Socker-roth.

113. ANGELICA sativa. *Matth:* 279. *C. B:* 155. Imperatoria sativa. *Tourn:* 317.

114. LEVISTICUM foliorum pinnis media parte extrema incisis. Levisticum vulgare. *Dod:* 309. Levisticum. *Rivin: pent. irr.* III. t. 293. Libbesticka.

Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti. *C. B:* 157. Angelica montana perennis, Paludapii folio. *Tourn:* 313.

115. LEVISTICUM foliorum pinnis per totam longitudinem serratis. Cicutaria latifolia, foetida. *C. B:* 161. *Tourn:* 322. *Moris:* III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Cicuta foetida. *Tabern:* II. 465.

116. ERYNGIUM latifolium, planum. *Tourn:* 327. *C. B:* 386.

α. Flore et petiolo coeruleo: Eryngium spurium. *Dod:* 720.

β. Flore et petiolo albicante: Eryngium latifolium, planum, caule viridi-albescente, flore albo. *Tourn:* 327.

---

107. Scandix odorata L: *Spec. Pl.* I. 256, II. 368; H. 64. **108.** Coriandrum sativum L: *Spec. Pl.* I. 256, II. 367; H. 63. **109.** Peucedanum officinale L: *Spec. Pl.* I. 245, II. 353; H. 60. **110.** Athamanta Meum L: *Spec. Pl.* I. 245, II. 353; H. 60. Jfr. Hort. Cliff. 93. **111.** Daucus Carota *β* L: *Spec. Pl.* I. 242, II. 348; H. 59. **112.** Sium Sisarum L: *Spec. Pl.* I. 251, II. 361; H. 62. **113.**? Angelica Archangelica L: *Spec. Pl.* I. 250, II. 360. **114.** Ligusticum Levisticum L: *Spec. Pl.* I. 250, II. 359; H. 62. 1. **115.** Ligusticum peloponnesiacum L: *Spec. Pl.* I. 250, II. 360; H. 62. 2. **116.** Eryngium planum L: *Spec. Pl.* I. 233, II. 336; H. 57.

117. BETA radice caulibus crassiore. Beta rubra, radice Rapæ. *C. B:* 118. *Tourn:* 502. Beta rubra. *Matth:* 341. Beta rubra, romana. *Dod:* 609. Rödbet.

118. BETA radice caulibus angustiore. Beta alba vel pallescens, qvæ Sicula vel Cicla officinarum. *C. B:* 118.

119. BETA candida. *J. B:* II. 961. *Dod:* 620. Mangolt.

120. RIBES baccis acidis.* Röda winbär.

α. Rubris: Ribes vulgaris, acidus, ruber. *J. B:* I. 97. Grossularia, multiplici acino, s. non spinosa, hortensis, rubra. s. Ribes officinarum. *C. B:* 455. *Tourn:* 639.

β. Albis: Hwita winbär. Ribes vulgaris, acidus, albas baccas ferens. *J. B:* I. 97. Grossularia pratensis, fructu margaritis simili. *C. B:* 455.

121. RIBES foliis graveolentibus. Grossularia non spinosa, fructu nigro, majore. *C. B:* 455. *Tourn:* 640. Swarta winbär.

122. GROSSULARIA recta, fructu glabro.* Hwita krusbär. Grossularia spinosa, sativa. *C. B:* 445. *Tourn:* 639. Grossularia majori fructu. *Clus: hist:* 120.

123. GROSSULARIA recta, fructu hirsuto.* Ludna krusbär.

124. GROSSULARIA ramis reclinatis.* Röda krusbär.

Grossularia spinosa, fructu obscure purpurascente. *J. B:* I. 48. Grossularia spinosa, sativa, altera, foliis latioribus. *C. B:* 445. *Tourn:* 639.

125. STAPHYLODENDRON foliis pennatis. Staphylodendron. *Matth:* 201. fig. *Tourn:* 616. Pistacia sylvestris. *C. B:* 401.

126. VINCA. *Rivin. apud Rupp:* 27. Pervinca vulgaris, latifolia, flore coeruleo. *Tourn:* 119. Clematis daphnoides, major. *C. B:* 302. *Dod:* 401.

127. NERIUM. *Tabern:* III. 144. Nerium floribus rufescentibus. *C. B:* 464. *Tourn:* 605. Rhododendrum. *Dod:* 837.

128. APOCYNUM erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus parvis, obsolete purpurascentibus. *Tourn:* 91. Apocynum syriac: incanum, erect: fl: umbellatis, minoribus, obsolete purpurascentibus, siliqvis

---

117—119. Beta vulgaris L: *Spec. Pl,* I. 222, II. 322; H. 56. **120.** Ribes rubrum L: *Spec. Pl.* I. 200, II. 290; H. 50. **121.** R. nigrum L: *Spec. Pl.* I. 201, II. 291; H. 51. 2. **122.** R. Uva crispa L: *Spec. Pl.* I. 201, II. 292. **123.** R. Grossularia L: *Spec Pl.* I. 201, II. 291; H. 51. 4. **124.** R. reclinatum L: *Spec. Pl.* I, 201, II. 291; H. 51. 3. **125.** Staphylea pinnata L: *Spec. Pl.* I. 270, II. 386; Staphylæa H. 69. **126.** Vinca major L: *Spec. Pl.* I. 209, II. 304 **127.** Nerium Oleander L: *Spec. Pl.* I. 209, II. 305; H. 53. **128.** Asclepias syriaca L: *Spec. Pl.* I. 214, II. 313; H. 53. 2.

folliculatis. *Herm: H: L:* B. 53. Apocynum medium, peregrinum, flore umbellato, ex obsolete dilute purpurascente, petalis reflexis. *Moris:* III. p. 69. §. 2. descr.

[Gynandr. Pent. i Leufsta ex.]

Muscæ carnivoræ et alia insecta anelytra infirmiora cum ex hujus floribus mel colligant, jucundo sane spectaculo, pedibus feramini ipsius pistilli implicatis tenentur, ut aufugere nequeant.

129. CRASSA. *Riv: apud Rupp.* Asclepias africana aizoides. *Tourn:* 94. Fritillaria crassa promontorii Bonæ spei. *Stapel.*

Exemp. Umbellatæ Tournefortii omnes. Asclepias. Plumeria.

§. PENTAGYNIA.

130. LINUM sativum. *C. B:* 214. *Tourn:* 339. Lin.

§. POLYGYNIA.

Exemp: Myosurus.

Class. VI. HEXANDRIA.

§. MONOGYNIA.

131. CEPA foliis styliformibus. Cepa sectilis, juncifolia, perennis. *Tourn:* 383. Porrum sectivum, juncifolium. *C. B:* 72. Gräslök.

132. CEPA sterilis. *C. B:* 72. Cepa ascalonica. *Matth:* 389. *Tourn:* 382. Echalottes vulgo ex gallis.

133. CEPA fissilis. *C. B:* 72. Cepa sectilis. *Camer.* 170.

134. CEPA foliis ventricosis, longitudine caulem æqvantibus. Cepa oblonga. *C. B:* 71. *Dod:* 671. *Tourn:* 382.

135. CEPA foliis ventricosis caule curtioribus.

α. Radice rubra: Rödlök. Cepa vulgaris. *C. B:* 71. Cepa vulgaris, floribus et tunicis purpurascentibus. *Tourn:* 382.

β. Radice alba: Cepa vulg: florib: et tunic: candidis. *Tourn:* 382.

---

129. Stapelia variegata L: *Spec. Pl.* I. 217, II. 316; H. 53. **130.** Linum usitatissimum L: *Spec. Pl.* I. 277, II. 397; H. 71. **131.** Allium Schoenoprasum L: *Spec. Pl.* I. 301, II. 429; H. 78. 8. **132.** A. ascalonicum L: *Spec. Pl.* II. 429; H. 79. 9. **133.**? »A. qvod Cepa fissilis *Cam:* epit. 326.» H. 79. 10. **134.** A. fistulosum L: *Spec. Pl.* I. 301, II. 432; H. 78. 8. **135.** A. Cepa L: *Spec. Pl.* I. 300, II. 431; H. 73. 3.

136. PORRUM commune. *Matth:* 386. Porrum commune capitatum. *C. B:* 72. *Tourn:* 382. Porrum. *Tabern:* II. 192. Purio.

137. PORRUM capite bulbifero. Allium sativum alterum, s. Alliosprasum caulis summo circum voluto. *C. B:* 73. *Tourn:* 383. *Moris:* II. p. 383. s. 4. t. 15. f. 10. Råckenbåll.

138. ALLIUM sativum. *C. B:* 73. *Tourn:* 387. Hwitlök.

139. MOLY pyrenaicum, flore luteo. *Rupp:* 138. Moly latifolium luteum, odore Allii. 1. *C. B:* 75. *Moris:* II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 3. Moly flavo flore. *Swert:* I. tab. 60. f. 2. Allium latifolium, luteum. *Tourn:* 384.

140. MOLY alpinum, caule maculato. *Rupp:* 138. Allium montanum, latifolium, maculatum. *C. B:* 74. Allium alpinum, Victorialis mas. *Tabern:* II. 195. Victorialis longa. *Besl. Vern:* 4. fol. 13.

141. SCYLLA floribus in spicam congestis, stellatis. Ornithogalum bifolium, germanicum, coeruleum. *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, bifolius, germanicus. *C. B:* 45.

142. SCYLLA floribus in spicam congestis, cirrhosis. Hyacinthus comosus, hispanicus. *C. B:* 42. *Rudb. Camp. Elys:* II. 22. *Huc forte spectat; fateor tamen flores ejus minus attente a me examinatos esse.*

143. SCYLLA floribus per caulem sparsis. Ornithogalum coeruleum, byzantinum. *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, coeruleus, amoenus. *C. B:* 46.

144. MUSCARI floribus globosis. Muscari arvense, juncifol: coeruleum, minus. *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus. *Dod:* 217. Hyacinthus racemosus, minor, juncifolius. *C. B:* 43.

145. MUSCARI floribus ovatis. Muscari obsoletiore flore. *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus, moschatus. *C. B:* 43. *Rudb. Comp. El.* II. 25. Bulbus vomitorius. *Matth:* 415.

146. HYACINTHUS orientalis, caule maculato. *C. B:* 44. *Tourn:* 345. Hyacinthus orientalis. *Matth:* 669. Hyacinthus orientalis, exalbidus. *Tourn:* 345.

Plantæ hujus varietates innumeræ & infinitæ qvo ad colorem et plenitudinem existunt, qvas merito otiosis hortulanis relinquimus.

---

136. A. Porrum L: *Spec. Pl.* I. 295, II. 423; H. 77. 4. **137.** A. Scorodoprasum *β* L: *Spec. Pl.* I. 297, II. 425; H. 77. 5. **138.** A. sativum L: *Spec. Pl.* I. 296, II. 425; H. 76. 2. **139.** A. Moly L. *Spec. Pl.* I, 301, II. 432; H. 76. 1. **140.** A. Victorialis L: *Spec. Pl.* I. 295, II. 424. **141.** Scilla bifolia L: *Spec. Pl.* I. 309, II. 443. **142.**? Hyacinthus. **143.** Scilla amoena L: *Spec. Pl.* I. 309, II. 443. **144.** Hyacinthus racemosus L: *Spec. Pl.* I. 318, II. 455 eller H. botryoides L: *Spec. Pl.* I. 317, II. 455; H. 85. 4. **145.** Hyacinthus Muscari L: *Spec. Pl.* I. 317, II. 454; H. 85. 3. **146.** H. orientalis L: *Spec. Pl.* I. 317, II. 454; H. 85. 1.

147. ORNITHOGALUM floribus in caule sparsis, homomallis. Ornithogalum majus, spicatum, flore albo. *C. B:* 70. *Tourn:* 379. Ornith. spicat: alb. fl: monspessulanum. *J. B:* II. 628. descr.

148. ORNITHOGALUM floribus in umbellam congestis. Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium, spicatum. *Swert:* I. tab. 57. f. 2. Eliocarmos. *Reneal:* 88.

149 PHALANGIUM floribus in caule simplici sparsis. Phalangium non ramosum, minus. *Rudb. Camp. El.* II. 183. Phalangium parvo flore sive minus ramosum. *C. B:* 29. *Tourn:* 368. Phalangium pulchrius non ramosum. *J. B:* II. 635.

150. TRADESCANTIA s. Ephemerum virginianum. *Rupp:* 55. Ephemerum virginianum, fl: coeruleo, minori. *Tourn:* 368. Moly s: Phalangium virgineanum. *Rudb. Camp. El:* II. 166. Allium s. Moly virginianum. *C. B. Ap:* 516.

Tradescantia probe distinguenda sit a Commelina, ambæ enim sub Ephemeri nomine a quibusdam numerantur.

151. ALOË apice foliorum in aculeum desinente. Aloë folio in oblongum aculeum abeunte. *C. B:* 286. *Tourn:* 366. *Moris:* II. p. 415. s. 4. t. 22. fig. 2 & 3. Aloë mucronato folio, americana, major. *Munt: Aloid:* p. 8. f. 3. Aloë ex America. *Dod:* 355. Aloë spuria. *Rupp:* 364.

Floruit Norcæ 1708 a Septembri per totam hyemem, cujus figuram dedit Soph: El: Brenner poetiska dicter pag. 222 et 224.

152. ALOË vulgaris. *C. B:* 286. *Tourn:* 366. Aloë. *Matth:* 463. In cubile suspensus per totum annum e solo aëre nutrimentum haurit.

153. ALOË verrucis osseis glabrisqve exasperata. Aloe africana, margaritifera, minor. *Rupp:* 261.

154. ALOË foliis in capitula coniformia, laxa, echinata, congestis. Aloë humilis, africana, arachnoidea. *Munt: Al:* fig. 27.

155. ALOË foliis oblongis, obtusis, spinis destitutis sibimet a dorso seqventibus. Aloe africana humilis, folio ex albo et viridi variegato. *Munt: Al:* fig. 28.

---

147. Ornithogalum narbonense L: *Amoen. Acad.* Vol. IV. p. 312, *Spec. Pl.* II. 440. **148.** O. umbellatum L: *Spec. Pl.* I. 307, II. 441; H. 84. 2. **149.** Anthericum Liliago L: *Spec. Pl.* I. 310, II. 445; H. 83. 4. **150.** Tradescantia virginiana L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 411; H. 73. **151.** Agave americana L: *Spec. Pl.* I. 323, II. 461; H. 87. **152.** Aloë perfoliata* vera L: *Spec. Pl.* I. 319, π vera L: *Spec. Pl.* I. 458; H. 86. 2. **153.** A. pumila margaritifera γ L: *Spec. Pl.* I. 322, II. 460. **154.** A. pumila δ arachnoidea L: *Spec. Pl.* I. 322, II. 460; H. 86. 5. β. **155.** A. variegata L: *Spec. Pl.* I. 321, II. 459; H. 87. 9.

156. GLORIOSA. Yucca foliis aloës. *C. B:* 91. *Dill. nov. pl. gen:* 111. *Moris:* II. p. 419. s. 6. t. 23. f 1.

157. TUBEROSA floribus luteis. Lilio-Asphodelus luteus. *Tourn:* 344. *Swert:* I. t. 47. Lileum luteum, Asphodeli radice. *C. B:* 80. Asphodelus liliaceus, luteus. *Tabern:* II. p. 346.

158. TUBEROSA floribus fulvis. Lilio-asphodelus phoeniceus. *Tourn:* 344. Lileum rubrum, Asphodeli radice. *C. B:* 89. Asphodelus liliaceus, luteus. *Tabern:* II. p. 346. Iris tuberosa. *Hortulan.*

159. FRITILLARIA floribus singularibus, ore patentibus.

α. Fl. albis: Fritillaria alba, præcox. *C. B:* 64. *Tourn:* 377.

β. Fl: albis maculis purpurascentibus: Fritillaria alba, variegata. *C. B:* 64. *Tourn:* 377.

γ. Fl: purpuras: maculis albis: Fritillaria præcox, purpurea, variegata. *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Meleagris. *Dod:* 233. *Reneal:* 147.

δ. Fl: pleno: Fritillaria præcox, alba, foliolis octonis aut duodenis. *C. B:* 64. Biwits-ägg(?). Damspehls-blomma.

160. FRITILLARIA foliis in summo caulis plurimis, floribus cylindraceis ore contracturi. Fritillaria polyanthos, flavoviridis. *C. B:* 64. *Tourn:* 377.

161. TULIPA petalis ovatis varie coloratis Tulipa præcox, varia. *C. B:* 57.

Tot sane variationes hujus plantæ existunt, qvot dies in anno sunt. vid. Tournefort etc. *Sufficiat idcirco nominare seqventem.*

a. *Petalis laciniatis punctatis:* Tulipa lutea, lituris qvibusdam viridibus et sangvineis distincta, flore maximo, laciniato. *Tourn:* 376. Tulipa flore luteorubro variegata, petalis laciniatis. *Rudb. Camp. El.* II. 108.

162. TULIPA petalis oblongis, acutis. Tulipa præcox, lutea. *C. B:* 57. Tulipa præcox, flava. *Clus. hist.* 138.

163. IMPERIALIS. Corona imperialis. *Dod:* 202. *Tourn:* 372. *S. Paul.* 45. Lilium s. Corona imperialis. *C. B:* 79.

164. MARTAGON sylvaticum. *Rupp:* 118. Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente. *C. B:* 77. *Tourn:* 370. Lilium flore nutante ferrugineo, majus & minus. *J. B:* II. 692. Krollilia.

---

156. Yucca gloriosa L: *Spec. Pl.* I. 319, II. 456; H. 88. 1. **157.** Hemerocallis Lilioasphodelus *α* flavus L: *Spec. Pl.* I. 324, H. flava *Sp. Pl.* II. 462, H. 88. 1. *β*. **158.** H. Lilioasphodelus *β* fulvus L: *Spec. Pl.* I. 324, H. fulva *Spec. Pl.* II. 462; H. 88. 1. *α*. **159—160.** Fritillaria Meleagris L: *Spec. Pl.* I. 304, II. 436; H. 81. 1. **161—162.** Tulipa gesneriana L: *Spec. Pl.* I. 306, II. 438; H. 82. **163.** Fritillaria imperialis L: *Spec. Pl.* I. 303, II. 435; H. 82. 3. **164—165.** Lilium Martagon L: *Spec. Pl.* I. 303, II. 435; H. 81. 3 & 4.

165. MARTAGON humilius floribus albis. Lilium floribus reflexis, montanum, flore albicanti. *C. B:* 77. *Tourn:* 370.

166. LILIUM unguibus petalorum glabris et integris. Lilium album. *T. Pauli:* 271. Lilium. *Matth:* 547. Lilium album vulgare. *Tourn:* 360. Lilium album, flore erecto & vulgare. *C. B:* 76. Hwit lilia.

167. LILIUM ungvibus petalorum canali villosa insculptis. Lilium purpureocroceum, majus. *C. B:* 76. *Tourn:* 369.

168. LEIROCODON. *Rudb.* Leucojum bulbosum, vulgare. *Rupp:* enl. Lin. Phil. Bot. p. 146. *C. B:* 55. *Rudb. Camp. El:* II. 95. Leucojum bulbosum, hexaphyllum. *Dod:* 230. Narcisso-leucojum vulgare. *Tourn:* 387. Narcissus VII. *Matth:* 770. Snölilia.

169. GALANTHOS. *Nupt. pl.* Leucojum bulbosum, trifolium, minus. *C. B:* 56. *Rudb. Camp. El:* II. 96. Leucojum bulbosum, triphyllum. *Dod:* 230. Narcisso-leucojum trifolium, minus. *Tourn:* 387. Narcissus seu Leucojum, bulbosum, minus, præcox, tribus petalis albis majoribus, cingentia terna minora herbacei coloris. *Moris:* II. p. 364. s. 4. t. 9. f. 23.

170. NARCISSUS flore singulari, corolla petalis breviori.

α. Fl. simplici: Påsklilia. Narcissus albus, circulo purpureo. *C. B:* 48. *Tourn:* 353. Narcissus mediopurpureus. *Dod:* 223.

β. Fl. albo: Narcissus totus niveus, multiplex. *C. B:* 54. *Tourn:* 357. Narcissus albus, pleno flore. *Swert:* I. t. 26. f. 5.

171. NARCISSUS flore singulari, corolla petalis æquali.

α. Flore simplici: Marslilia. Narcissus sylvestris, pallidus, calyce luteo. *C. B:* 52. *Tourn:* 356. Narcissus luteus, sylvestris. *Dod:* 227. Pseudo-Narcissus luteus, simplici flore. *Tabern:* II. 311.

β. Flore pleno: Narcissus multiplex, totus flavus. *C. B:* 54. *Tourn:* 357.

172. NARCISSUS floribus pluribus, corolla petalis breviori. Narcissus medio luteus, copioso flore, odore gravi. *C. B:* 50. *Rudb. Camp. El:* II. 37. *Tourn:* 354. Narcissus medio luteus, alter. *Dod:* 224.

173. ACORUS petalodes, foliis ancipitibus. Kalmus. Acorus verus seu Calamus aromaticus officinarum. *C. B:* 34. Typha aromatica, clava rugosa. *Moris:* III. 246.

[Gynandria Hexandria i Leufsta ex.]

---

166. L. candidum L: *Spec. Pl.* I. 302, II. 433; H. 80. 1. **167.** L. bulbiferum L: *Spec. Pl.* I. 302, II. 433; H. 80. 2. **168.** Leucojum vernum L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 414; H. 74. **169.** Galanthus nivalis L: *Spec. Pl.* I. 288, II. 413; H. 73. **170.** Narcissus poëticus L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 414; H. 74. 1. **171.** N. Pseudo-Narcissus L: *Spec. Pl.* I. 289, II. 414; H. 74. **172.** N. Tazetta L: *Spec. Pl.* I. 290, II. 416; H. 74. 3. **173.** Acorus Calamus *α* vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 324, II. 462.

174. HEDERA *Cæsalp.* Hedera major sterilis*. *C. B:* 305. Hedera arborea. *Tourn:* 613. In sylvis rarissime reperitur.

175. RUSCUS florem e medio nudi folii præbens*. Ruscus. *C. B:* 470. *Matth:* 751. Ruscus myrtifolius, aculeatus. *Tourn:* 79. Laurotaxa myrsinites nostras, foliorum cuspide aculeato. *Pluck. Alm:* 210.

176. RUSCUS florem e medio folii sub ligula emittens*. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente. *Tourn:* 79. Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente. *C. B:* 304. Hippoglossum. *Matth:* 471. Laurotaxa Plinii. *Column. εχφ:* 166.

177. BERBERIS. *Lob. Adv.* Berberis dumetorum. *C. B:* 454. *Tourn:* 614.

In sylvis interdum reperitur, indigena tamen non est.

178. ASPARAGUS sativa. *C. B:* 489. *Tourn:* 300. Asparagus *Matth:* 349. *S. Pauli:* 25. Aparagus hortensis. *Dod:* 691. Sparis.

Exemp: Convallaria, Smilax, Portulaca.

§. TRIGYNIA.

179. COLCHICUM commune. *C. B:* 67. *Tourn:* 348.

Autumno floret, proxima æstate fructum maturat; color floris nunc albus, nunc ruber, nunc alius.

Pleno flore: Colchicum pleno flore. *C. B:* 69. *Tourn:* 349.

180. LAPATHUM sanguineum. *Munt*; *Brit:* p. 211. descr. 113. fig. Lapathum folio acuto, rubente. *C. B:* 115. *Tourn:* 504. *Moris:* II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6.

181. ACETOSA foliis ovatis, ad basin auritis. Acetosa rotundifolia, hortensis. *C. B:* 115. *Tourn:* 503. *Moris:* II. p. 583. s. 5. t. 28. f. 9. Acetosa hortensis. *S. Paul.* 154. Acetosa romana, rotundifolia. *Munt. brit.* p. 224. fol. 200. Acetosa sativa, franca, rotundifolia. *Franck.* Spec. ed. 2, 1651 p. 1.

Exemp: Triglochin.

§. POLYGYNIA.

Exemp: Alisma.

---

174. Hedera Helix γ L: *Spec. Pl.* I. 202, II. 292. **175.** Ruscus aculeatus L: *Spec. Pl.* I. 1041, II. 1474; H. 300. 1. **176.** R. Hypoglossum L: *Spec. Pl.* I. 1041, II. 1474; H. 300. 3. **177.** Berberis vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 330, II. 471. **178.** Asparagus officinalis γ altilis L: *Spec. Pl.* I. 313, II. 448; H, 84. **179.** Colchicum autumnale L: *Spec. Pl.* I. 315, II. 451; H. 90. **180.** Rumex sanguineus L: *Spec. Pl.* I. 334, II. 476; H. 89. 1. **181.** R. scutatus L: *Spec. Pl.* I. 337, II. 480; H. 59. 2.

Class. VIII. HEPTANDRIA.

§. MONOGYNIA.

182. CASTANEA folio multifido*. *C. B:* 479. Castanea eqvina. *Matth:* 624. Hippocastanum. *Riv: pent: irr:* t. 350. H. vulgare. *Tourn:* 612.
Exemp: Trientalis.

Class. VIII. OCTANDRIA.

§. MONOGYNIA.

183. ONAGRA latifolia. *Tourn:* 302. Lysimachia lutea, corniculata. *C. B:* 245. *App.* 516. Lysimachia lutea non papposa, virginiana, major. *Moris:* II. 271.

184. EPILOBIUM hirsutum, magno flore et specioso. *Dill:* 131. Chamænerion villosum, magno flore purpureo. *Tourn:* 303. Lysimachia siliquosa, hirsuta, major, fl. purpureo. *C. B:* 245.

185. RUTA. *Matth:* 493. Ruta hortensis, latifolia. *C. B:* 336. *Tourn:* 257. Winruta.

186. MELIANTHUS africanus. *H. L. B.* 414. c. fig. Melianthus africanus, Pimpinellæ foliis, amplissimis, glaucis. *Moris:* III. 517. Pimpinella spicata, maxima, africana. *Bart: Act. Haffn:* II. 258.
In Horto Regio ad Templ. s. Jacob.

187. CARDAMINDUM majus. *Riv. tetr. irr.* tab. 324. Cardamindum ampliore folio et majore flore. *Tourn:* 430. Indianisk krasse.

188. CARDAMINDUM minus. Cardamindum minus et vulgare. *Tourn:* 430. Nasturtium indicum majus. *C. B:* 306.
Exemp: Hypopithys, Vaccinium, Erica.

§. DIGYNIA.

Exemp: Chrysosplenium.

---

182. Aesculus HippoCastanum L: *Spec. Pl.* I. 344, II. 488; H. 92. **183.** Oenothera biennis L: *Spec. Pl.* I. 436, II. 492; H. 94. **184.** Epilobium hirsutum L: *Spec. Pl.* I. 347, II. 494. **185.** Ruta graveolens γ L: *Spec. Pl.* I. 383, II. 548; H. 102. **186.** Melianthus major L: *Spec. Pl.* I. 639, II. 892; H. 181. **187.** Tropæolum majus L: *Spec. Pl.* I. 345, II. 490; H. 93. 1. **188.** T. minus L: *Spec. Pl.* I. 345, II. 490; H. 93. 2.

§. TRIGYNIA.

189. BISTORTA major, radice magis intorta. *C. B:* 192. *Tourn:* 511. Serpentaria major s. Bistorta. *Fuch:* 773. Ormrot.

§. TETRAGYNIA.

Exemp: Paris, Potamogeton.

Class. IX. ENNEANDRIA.

§. TRIGYNIA.

190. RAPONTICUM. Raponticum thracicum *Alp. de Rap.* c. fig. apt. Rhabarbarum forte Dioscoridis et officinar. *Tourn:* 89. Rhabarbarum rotundifolium verum. *Munt. brit.* p. 192. fol. 15. Lapathum exoticum, folio amplissimo, instar foliorum Brassicæ. *Rupp: alt.* 44.

A Tournefortio male pro Rhabarbaro vero habet.

§. HEXAGYNIA.

Exemp: Butomus.

Class. X. DECANDRIA.

§. MONOGYNIA.

191. PORTULACA sativa. *Dod:* 650. Portulaca latifolia sativa. *C. B:* 288. *Tourn:* 236. Portulaca. *S. Paul:* 323. Portulak.

192. GERANIUM foliis alternatim pinnatis, petiolo flores plures sustinente. Geranium Cicutæ folio, moschatum. *C. B:* 319. *Tourn:* 268. Geranium supinum. *Dod:* 63.

193. GERANIUM foliis cordiformibus per margines leviter laciniatis et obtuse serratis. Geranium folio Althææ. *C. B:* 318. *Tourn:* 268. Geranium VI. *Matth:* 568.

---

189. Polygonum Bistorta L: *Spec. Pl.* I. 360, II. 516; Bistorta H. 95. **190.** Rheum Rhaponticum L: *Spec. Pl.* I. 371, II. 531; H. 98. **191.** Portulaca oleracea β L: *Spec. Pl.* I. 445, II. 638; H. 146. **192.** Geranium cicutarium β moschatum L: *Spec. Pl.* I. 680; ? G. moschatum L: *Spec. Pl.* II. 951. **193.** G. malacoides L: *Spec. Pl.* I. 680, II. 952; H. 198. β.

194. GERANIUM foliis peltatis ad medium et minus laciniatis, petiolo bifloro. Geranium phaeum s. fuscum, petalis reflexis s. planis. *Moris:* II. 516. *Tourn:* 267. Geranium montanum, fuscum. *C. B:* 318. Geranium batrachiodes, hirsutum, flore atrorubente. *C. B. secund. Pin* p. 318. *Burser:* herb. viv. vol. XVIII. 36. Gruinalis montana, petalis nigrofuscis et obscuris planioribus. *Rupp:* Fl. Jen. I. 117.

Exemp: Pyrola, Harmala.

§. DIGYNIA.

195. TUNICA hortensis varia, simplex et plena. *Rupp:* 105. Caryophyllus hort. simpl. flore majore. *C. B:* 208. Caryophyllus multiplex. *C. B:* 207. Näglikor.

Varietiones hujus innumeræ sunt.

196. TUNICA perennis, floribus laciniatis, albis. Caryophyllus flore tenuissime dissecto, albo. *C. B:* 209. *Tourn:* 331. Caryophyllus plumarius. *Tabern:* Ic: 286.

197. TUNICA floribus plurimis in capitulum setis intertextum congestis.

Fl: rubris. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius. *C. B:* 208. Caryophyllus hortensis, latifolius, ruber. *Tourn:* 332. Caryophyllus Carthusianorum I. *Tabern:* II. 2. Thyrsis. *Ren:* 47.

Fl: albis. Caryophyllus barbatus, hort. latif. albus. *Tourn:* 332.

Fl: albis et rubris simul. Caryophyllus barb: hort. latif. diversicolor. *Tourn:* 332.

198. SAPONARIA. *Dod:* 179. Saponaria major. *C. B:* 206. Saponaria vulgaris, simplex. *Moris:* II. s. 5. t. 22. f. 52. Lychnis sylvestris, qvæ Saponaria vulgo. *Tourn:* 336.

§. TRIGYNIA.

199. CUCUBALUS. *Tourn:* 339. Alsine scandens, baccifera. *C. B:* 250. Cucubalus qvibusdam, vel Alsine baccifera. *J. B:* II. 175.

200. MUSCIPULA sempervirens. Lychnis frutescens, myrtifolia, Behen albo similis. *C. B:* 205. Ocymoides fruticosum. *Camer.* h. pag. 109. t. XXXIII.

---

194. G. phæum L: *Spec. Pl.* I. 681, II. 953; H. 198. 10. **195.** Dianthus Caryophyllus L: *Spec. Pl.* I. 410, II. 587; H. 104. 1. **196.** D. plumarius L: *Spec. Pl.* I. 411, II. 589; H. 105. 4. **197.** D. barbatus L: *Spec. Pl.* I. 409, II, 586; H. 105. 6. **198.** Saponaria officinalis L: *Spec. Pl.* I. 408, II. 584; H. 106. 1. **199.** Cucubalus baccifer L: *Spec. Pl.* I. 414, C. baccifera L: *Spec. Pl.* II. 591; H. 109. 1. **200.**? Silene fruticosa L: *Spec. Pl.* I. 417, II. 597; H. 111. 2.

201. MUSCIPULA hispanica, umbellata, latifolia, lævis. *Rupp:* 112. Lychnis viscosa, purpurea, latifolia. lævis. *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Armerius flos IV. *Dod:* 179. Viscaria sativa. *Tabern:* 11. 14. In Scania sponte crescit, etiam fl. albis.

§. PENTAGYNIA.

202. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo. *C. B:* 203. *Tourn:* 334. Lychnis calcedonica. *Tabern:* 11. 9.

203. CORONARIA.

α. Fl: saturate purpureis. Lychnis coronaria Dioscoridis sativa, flore rubro et velut flammeo fulgente. *Tourn:* 334. Lychnis coronaria *Dod:* 170.

β. Fl. carneo. Lychnis coron: Diosc: sat: fl. dilute rubente. *C. B:* 203. *Tourn:* 334.

204. NIGELLA flore majori, simplici, coeruleo. *C. B:* 143. *Tourn:* 258. Melanthium Damascenum. *Dod:* 301. Nigella flore majori pleno coeruleo. *C. B. Tourn.*

[Föres till Polyandria Pentagynia i Leufsta ex.]

Exemp: Sedum.

§. DECAGYNIA.

205. PHYTOLACCA americana, majori fructu. *Tourn:* 299. Solanum virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis, canaliculatis. *Moris:* 111. p. 522. s. 13. f. 22. f. 1.

Class. XI. DODECANDRIA.

§. MONOGYNIA.

206. ASARUM *C. B:*197. *Matth:* 32. *Tourn:* 501. *S. Paull:* 23.

Exemp: Ænapodophyllum.

---

201. S. Armeria L: *Spec. Pl.* I. 420, II. 601; H. 110. **202.** Lychnis chalcedonica L: *Spec. Pl.* I. 436, II. 625, H. 115. **203.** Agrostemma Coronaria L: *Spec. Pl.* I. 236, II. 625; H. 115. 1. **204.** Nigella damascena L: *Spec. Pl.* I. 534, II. 753; H. 153. 1. **205.** Phytolacca americana L: *Spec. Pl.* I. 441, Ph. decandra L: *Spec. Pl.* II. 631; H. 117. **206.** Asarum europæum L: *Spec. Pl.* I. 442, II. 633.

§. **DIGYNIA.**

Exemp: Agrimonia.

Class. XII. EICOSANDRIA.

§. **DIGYNIA.**

Exemp: Cratægus.

§. **TRIGYNIA.**

207. ESULA ad umbellas tribus foliis instructa. Esula palustris. *Rivin. tetr: irr:* tab. 116. Tithymalus palustris, fructicosus. *C. B:* 292. *Tourn:* 87.

208. ESULA ad umbellas duobus foliis instructa. Esula folio Amygdali angusto. *Rup:* 261.

[Till Polyandria Trigynia i Leufsta ex.]

Tithymalus amygdaloides, angustifolius. *Tourn:* 86.

Exemp: Auccuparia.

§. **TETRAGYNIA.**

Exemp: Tetragonolobus, Tormentilla.

§. **PENTAGYNIA.**

209. MALUS pumila, qvæ potius frutex quam arbor, fructu candido* *C. B:* 433. *Tourn:* 362. Paradisäple.

Plures variationes malorum a fallacissimo sapore et colore desumtas recensere inutile esse judicamus.

210. PYRUS sativa, fructu æstivo, longo, magno, partim rubro, partim albido.* *Tourn:* 629. Bon Chrestier.

Varietas alia.

$210^1/_2$. PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccharato, odorato, e viridi flavescente, in ore liqvescente. *Tourn:* 629. Bergamotte.

Reliquas variationes enumerare supersedemus.

---

207. Euphorbia palustris L: *Spec. Pl.* I. 462, II. 662. **208.** E. Cyparissias L: *Spec. Pl.* I. 461, II. 661. **209.** Pyrus Malus β paradisiaca L: *Spec. Pl.* 479, II. 686; H. 130. **210.** P. communis γ pompejana L: *Spec. Pl.* I. 479, II. 686; H. 130. **$210^1/_2$.** P. communis β falerna L: *Spec. Pl.* I. 479, II. 686; H. 130.

211. CYDONIA fructu breviore et rotundiore.* *Tourn:* 633. Mala cotonea minora. *C. B:* 434.

Exemp: Mespilus.

§. **POLYGYNIA.**

212. POTENTILLA fruticosa, trifolia. Pentaphylloides rectum, fructicosum. Eboracense. *Moris:* II. 193. *Tourn:* 298. Cytisus oelandicus. *Rudb. Hort.* 29.

213. FRAGARIA fructu parvi pruni magnitudine. *C. B:* 327. *Tourn:* 296. Fragaria fructu magno. *Besl. Vern:* 7. fol. 8. Jordgubbar.

214. RUBUS idæus fructu albo. *C. B:* 479. *Tourn:* 614. Hwita Hallon.

215. RUBUS caule ramoso, glabro. Rubus humilis Fragariæ folio, fructu rubro. *Rudb. Act: Lit: Svec:* 1720. p. 99. *In Helsingia sponte, unde in hortum Celsianum translatus.* Åckerbär från Nordland.

Class. XIII. POLYANDRIA.

§. **POLYGYNIA.**

216. OPUNTIA foliis subrotundis, procumbens. Opuntia vulgo herbariorum. *Tourn:* 239. Ficus indica, spinoso folio, fructu majori. *C. B:* 458. Ficus indica *Matth:* 211.

217. OPUNTIA foliis oblongo-ovalibus, erecta. Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo et longissimo. *Tourn:* 240.

In horto Carlbergensi.

218. CERASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido* *Tourn:* 625. Moreller.

219. CERASUS fructu acido, serotino, succi sangvinei.* *Tourn:* 625.

220. CERASUS pumila.* *C. B:* 450.

221. CERASUS uno pediculo plura ferens.* *J. B:* I: 223. Cerasus racemosa, hortensis. *C. B:* 450.

---

211. P. Cydonia L: *Spec. Pl.* I. 480, II. 687. **212.** Potentilla fruticosa L: *Spec. Pl.* I. 495, II. 709. **213.** Fragaria vesca β sativa L: *Spec. Pl.* I. 495, F. vesca β pratensis L: *Spec. Pl.* II. 709; H. 133. **214.** Rubus idæus β L: *Spec. Pl.* I. 493, II. 706; H. 133. **215.** R. arcticus L: *Spec. Pl.* I. 494, II. 708. **216.** Cactus Opuntia L: *Spec. Pl.* I. 468, II. 669; H. 120. 6. **217.** C. Ficus indica L: *Spec. Pl.* I. 468, II. 669; H. 120. 7.

218.	Prunus Cerasus	α	caproniana	L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 679; H. 125. 1.
219.	» »	η	austera	
220.	» »	ϑ	pumila	
221.	» »	ι	avium	

222. PRUNUS sativa vulgaris.* *Rupp:* 106. Prunus fructu magno, crasso, subacido. *Tourn:* 622. Plomon.

Fr: majori rubro. Prunus fr: majori, rotundo, rubro. *Tourn:* 622.

Fr: albo.

222$^1/_2$. PRUNUS fructu maximo, rotundo, flavo et dulci. *Tourn:* 622. Hwita plomon.

223. PRUNUS fructu minori, austero.* *Tourn:* 623. Pruna augusto maturescentia, minora et acida. *C. B:* 443. Krikon.

224. PRUNUS sylvestris, præcox, altior.* *Tourn:* 623. Pruna sylvestria, præcocia. *C. B:* 444. Tyska slånon.

225. PERSICA molli carne et vulgaris, viridis et alba.* *C. B:* 440. *Tourn:* 624. Persica mala. *Matth:* 182. Malus Persica. *S. Paul:* 83.

226. ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro.* *Tourn:* 623. Armeniaca malus. *Matth:* 199. Mala Armeniaca majora. *C. B:* 442. Aprikoser.

227. PADUS exotica, folio amplo, crasso, sempervirente.* *Rupp:* 122. Laurocerasus *Camer: hort.* 86. XXIII. *Tourn:* 628. Cerasus folio laurino. *C. B:* 450.

228. MYRTUS latifolia boetica.* *C. B:* 469. *Tourn:* 640.

229. MYRTUS minor vulgaris.* *C. B:* 469. *Torn:* 640.

230. MYRTUS foliis minimis et mucronatis.* *C. B:* 469. *Tourn:* 640.

231. AMYGDALUS sativa, fructu majore.* *C. B:* 441. *Tourn:* 627. Amygdala. *Matth:* 199. Mandelträd.

232. CHRISTOPHORIANA americana, ramosa, baccis niveis. *Moris:* 11. p. 8. s. 2. t. 1 f. 7. *Tourn:* 299. Aconitum baccis niveis. *Cornut:* 76.

233. PHILADELPHUS*. Philadelphus Athenæi et Rivini *Rupp:* 79. Syringa alba s. Philadelphus Athenæi. *C. B:* 398. *Tourn:* 617.

---

222. P. domestica *γ* hungarica. **222$^1/_2$.** P. domestica *ϑ* maliformis L: *Spec. Pl.* I. 475, II. 680; H. 124. **223.** P. domestica *ι* a angustana L: *Spec. Pl.* I. 475, II. 680; H. 124. **224.** P. insititia L: *Amoen. Acad.* Vol. IV. p. 273, *Spec. Pl.* II. 680. **225.** Amygdalus Persica L: *Spec. Pl.* I. 472, II. 676; H. 123. 2. **226.** Prunus Armeniaca L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 679; H. 124. 2. **227.** P. LauroCerasus L: *Spec. Pl.* I. 474, II. 678; Padus Hortus Ups. 126. 1. **228.** Myrtus communis *β* bœtica L: *Spec. Pl.* I. 471, M. communis *δ* boetica L: II. 673; H. 123. 1. *δ*. **229.** M. communis *γ* tarentina L: *Spec. Pl.* I. 471, M. communis *β* L: *Spec. Pl.* II. 673; H. 123. 1. *γ*. **230.** M. communis *δ* mucronata L: *Spec. Pl.* I. 471, M. comm. *ε* mucr. L: *Spec. Pl.* II. 674; H. 123. 1. *β*. **231.** Amygdalus communis L: *Spec. Pl.* I. 473, II. 677; H. 123. 1. **232.** Actæa spicata *β* alba L: *Spec. Pl.* I. 504, II. 722; H. 119. 4. **233.** Philadelphus coronarius L: *Spec. Pl.* I. 470, II. 671; H. 122.

234. PAPAVER caule hispido.

Fl. simplici. Papaver erraticum, majus ῥοιας Dioscoridi, Theophrasto, Plinio. *C. B:* 171. *Tourn:* 218.

Fl. pleno. Papaver erraticum, flore pleno. *C. B:* 71. *Tourn:* 21[illegible]

235. PAPAVER caule glabro. Walmoge.

α. Petalis integris, albis in simplici flore. Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio. *C. B:* 170. *Tourn:* 237.

β. Petalis integris, albis in flore pleno. Papaver flore pleno, album. *C. B:* 170. *Tourn:* 238.

γ. Petalis integris, rubris in simplici flore. Papaver hortense, nigro semino, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinio. *C. B:* 170. *Tourn:* 237.

δ. Petalis integris, rubris in pleno flore. Papaver pleno flore, nigrum. *C. B:* 171. *Tourn:* 238.

ε. Petalis laciniatis, rubris in simplici flore.

Petalis laciniatis, rubris in pleno flore.

η. Petalis integris, laciniatisque in pleno flore albo. Papaver cristatum, floribus rubris, semine nigro. *C. B:* 171. *Tourn:* 237.

236. PAPAVER fructu siliqvoso, cylindraceo. Glaucium flore luteo. *Tourn:* 254. Papaver corniculatum, luteum. *C. B:* 17. Papaver corniculatum, majus. *Dod:* 445.

237. CEREUS erectus, altissimus, syranamensis. *Hor. Par. Bat:* 116.

In horto Ulriksdahl.

§. DIGYNIA.

238. PÆONIA folio nigricante, splendido, qvæ mas. *C. B:* 323. *Tourn:* 273. Pion.

239. PÆONIA communis vel foemina. *C. B:* 323. *Tourn:* 274.

240. PÆONIA foemina, flore pleno, rubro, majore. *C. B:* 324. *Tourn:* 274.

Quamquam Botanici Pæoniam in marem et foeminam distingvunt, ea tamen sexum separatum non præbet.

241. POTERIUM. Sangvisorba minor, montana, lævis, hirsuta. *Rupp:* 58. Pimpinella Sangvisorba, minor, hirsuta. *C. B:* 160. *Tourn:* 157. *Moris:* 111. p. 263. f. 8. t. 18. f. 1. Pimpinella *S. Paul:* 107.

---

234. Papaver Rhoeas L: *Spec. Pl.* I. 507, II. 726; H. 136. 5. **235.** P. somniferum L: *Spec. Pl.* I. 508, II. 726; H. 135. **236.** Chelidonium Glaucium L: *Spec. Pl.* I. 506, II. 724; H. 137. 2. **237.** Cactus hexagonus L: *Spec. Pl.* I. 466, II. 667; H. 119. 4. **238—240.** Pæonia officinalis L. *Spec. Pl.* 530, II. 747; H. 149. **241.** Poterium Sanguisorba L: *Spec. Pl.* I. 994, II. 1411; H. 288. 1.

§. TRIGYNIA.

242. RESEDA foliis integris. Luteola. *Dill:* 92. Luteola herba, Salicis folio. *C. B:* 100. *Tourn:* 423.

243. RESEDA foliis pennatim divisis. Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo. *Tourn:* 423.

244. ACONITUM coeruleum s. Napellus I. *C. B:* 183. *Tourn:* 425. *Moris:* III. p. 463. s. 12. t. 3. f. 9. Napellus flore coeruleo. *Rupp:* 276. Napellus. *S. Paul:* 88. Stormhatar.

245. ACONITUM salutiferum s. Anthora. *C. B:* 184. *Tourn:* 425. Napellus flore luteo. *Rupp:* 275.

246. ACONITUM s. Napellus primus, flore ex coeruleo et albo variegato. *C. B:* 183. *Tourn:* 425.

247. ACONITUM lycoctonum, albis pallidisve floribus. *C. B:* 183. Aconitum 17 Matthioli. *Tabern:* II. 292.

Medelpadiæ sylvis communis est.

248. DELPHINIUM caule erecto. Riddarsporrar. Variationes seqventes præbet.

α. Delphinium hortense, flore majori et simplici coeruleo purpureo. *Tourn:* 427. Consolida regalis, hortensis, flore majori et simplici. *C. B:* 142.

β. Delph: hort: fl: maj: et simpl: albo. *T:* 427.

γ. Celph. hort. fl: maj: et simpl. purpureo. *T:* 427.

δ. Delph. hort. fl: maj: et multiplici purpureo. *T:* 427.

ε. Delph: hort: fl: maj: et multipl: albo. *T:* 427.

ζ. Delph: elatius flore incarnato. *T:* 427.

§. PENTAGYNIA.

249. AQUILEGIA. *Dod:* 181.

α. Melisolenis instructa fl: albo, vel incarnato. Aquilegia flore albo, simplici. *Tourn:* 428. Aquilegia hortensis, simplex, fl. incarnato. *C. B:* 144. *Tourn:* 428.

---

242. Reseda Luteola L: *Spec. Pl.* I. 448, II. 643. **243.** R. alba L: *Spec. Pl.* I. 449, II. 645; H. 149. **244.** Aconitum Napellus L. *Spec. Pl.* I. 532, II. 751. **245.** A. Anthora L: *Spec. Pl.* I. 532, II. 751; H. 152. 3. **246.**? A. variegatum L: *Spec. Pl.* I. 532, II. 750; H. 151. **247.** A. lycoctonum L: *Spec. Pl.* I. 532, II. 750. **248.** Delphinium Ajacis L: *Spec. Pl.* I. 531, II. 748; H. Ups. 150. 1. Jfr. Hort. Cliff. 213. **249.** Aqvilegia vulgaris L: *Spec. Pl.* I. 523, II. 752; H. 152.

β. Melisolenis destituta flore simplici vel pleno. Aquilegia stellaris, flore violaceo. *C. B:* 145. *Tourn:* 429. Aquilegia flore roseo multiplici. *C. B:* 145. *Tourn:* 429.

250. FICOIDES afra, erectior, folio Calendulæ, flore aureo. *Boerh:* I. 290.

In Horto Ulriksdahl.

251. SPIRÆA foliis oblongis, serratis*. Spiræa Salicis folio. *Tourn:* 618. Frutex spicatus, foliis salignis, serratis. *C. B:* 475.

252. SPIRÆA foliis rotundis, integris*. Spiræa Hyperici folio. *Tourn:* 618.

Pruno sylvestri affinis canadensis. *C. B:* 517. desc. *Pluck Phyt.* CCXVIII. 5. fig. opt.

Exemp: Ascyrum.

§. OCTOGYNIA.

253. FLAMMULA. *Rupp:* 61. *Dod:* 400. Clematis s. Flammula repens. *C. B:* 300. *Tourn:* 294.

§. POLYGYNIA.

254. CLEMATIS coerulea, erecta. *C. B:* 300. *Tourn:* 294. Clematis pannonica, flore coeruleo. *J. B:* II. 129. Flammula pannonica, erecta, folio Vincetoxici, flore amplo. *Rupp:* 62.

255. VITICELLA. *Dill. Nov. pl. gen:* 165. Clematis purpurea, repens. *C. B:* 300. *Tourn:* 294. Clematis altera. *Matth:* 617.

256. HEPATICA. *Dill. nov. pl. gen:* 108.

Fl. pleno.

α. Hepatica flore pleno, coeruleo. *Rupp:* 146. Ranunculus tridentalis, vernus, flore pleno, coeruleo. *Tourn:* 287. Trifolium hepaticum, flore pleno. *C. B:* 330.

β. Hepatica flore pleno, purpureo. *Rupp:* 146. Ranunculus tridentatus, vernus, flore pleno, purpureo. *Tourn:* 287.

γ. Hepatica flore pleno, albo.

250.? Mesembryanthemum bicolor L: *Spec. Pl.* I. 485; M. bicolorum L: *Spec. Pl.* II. 695. **251.** Spiræa salicifolia L: *Spec. Pl.* I. 489. II. 700; H. 131. 1. **252.** S. hypericifolia L: *Spec. Pl.* I. 489, II. 701; H. 131. 2. **253.** Clematis Flammula L: *Spec. Pl.* I. 544, II. 766. **254.** C. integrifolia L: *Spec. Pl.* I. 544, II. 767; H. 156. **255.** C. Viticella L: *Spec. Pl.* I. 543, II. 765. **256.** Anemone Hepatica L: *Spec. Pl.* I. 538, II. 758; Hepatica Hort. Ups. 155.

257. ADONIS petalis subrotundis, concavis. Adonis hortensis, flore minore, atrorubente. *C. B:* 178. Adonis. *Dod:* 260.

Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente. *Tourn:* 291.

258. ADONIS petalis oblongis, planis. Adonis montanus, perennis, flore amplo, luteo. *Rupp:* 144. Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore. *Boerh:* I. 15. Adonis præcox, perennis, flore luteo, calyce plano. *Moris:* III. p. 26. f. 6. t. 9. f. 1. Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice. *Tourn:* 291. Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore. *C. B:* 186. Helleborus Hippocratis. *Tabern:* II. 398.

259. RANUNCULUS seminibus planis, echinatis. Ranunculus arvensis, echinatus. *C. B:* 179. *Tourn:* 289. *Moris:* II. p. 440. s. 4. t. 29. f. 23.

260. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno. *C. B:* 179. *Tourn:* 290. Ranunculus erectus, hortensis, flore pleno. *Besl. Vern.* fol. 14.

261. RANUNCULUS dulcis, flore pleno. *C. B:* 179. *Tourn:* 290.

262. HELLEBORUS uniflorus, foliis peltatis. Helleborus niger, tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo. *Tourn:* 272. Helleborus ranunculoides præcox, tuberosus, flore luteo. *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Helleboroides hyemalis. *Boerh:* I. 297. Aconitum. *Rupp:* 249. Aconitum unifolium, luteum, bulbosum. *C. B:* 183.

263. HELLEBORUS floribus e radice emergentibus, foliis digitatis. Helleborus niger, angustioribus foliis. *Tourn:* 272. Helleborus niger, flore roseo. *C. B:* 185.

264. HELLEBORUS floribus e caulibus prodeuntibus, foliis digitatis. Helleborus niger, hortensis, flore viridi. *C. B:* 185.

Helleborus niger, sylvestris, ramosus, latiore folio, deciduo. *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 3. Veratrum nigrum, secundum. *S. Paul:* 10. Swart prustrot.

265. ROSA maxima, multiplex*. *Tourn:* 637. Rosa hollandica, rubella, qvibusdam centifolia, spinoso frutice. *J. B:* II. 37.

---

257. Adonis annua *β* atrorubens L: *Spec. Pl.* I. 547; A. autumnalis L: *Spec. Pl.* II. 771; H. 156. **258.** A. vernalis L: *Spec. Pl.* I. 547, II. 771. **259.** Ranunculus arvensis L: *Spec. Pl.* I. 555, II. 780. **260.** R. acris *β* L: *Spec. Pl.* I. 554, II. 779. **261.**? R. amplexicaulis L: *Spec. Pl.* I. 549, II, 774. **262.** Helleborus hyemalis L: *Spec. Pl.* I. 557, II. 783; H. 158. 3. **263.** H. foetidus L: *Spec. Pl.* I. 558, II. 784. **264.** H. viridis L: *Spec. Pl.* I. 558, II. 784; H. 158. 2. **265.**? Rosa centifolia L: *Spec. Pl.* I. 491, II. 704; H. 132. *ι*.

266. ROSA flore albo, pleno*. *Tourn:* 637.

267. ROSA rubra, multiplex*. *C. B:* 481. *Tourn:* 637. Varietas. Rosa versicolor. *C. B:* 481. *Tourn:* 637. Rosa semiplena, flore variegato. *Volck.*

268. ROSA lutea, multiplex*. *C. B:* 483. Rosa lutea, flore pleno. *J. B:* II. 48.

In horto Carlbergensi.

269. ROSA punicea*. *Cord:* 11. *Virg. ecl.* 5.

In horto Jacobino.

Exemp: Benedicta, Caltha.

Classis XIV. DIDYNAMIA.

§. TETRANDRIA.

270. SALVIA major, an Sphacelus Theophrasti. *C. B:* 237. *Tourn:* 180. Salvia major. *Dod:* 290.

271. SALVIA coma purpurea. Horminum coma purpureo-violacea. *Tourn:* 178. Horminum sativum. *C. B:* 238.

272. HORMINUM pratense. *Riv: irr. mon.* I. tab. 36. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore coeruleo. *Tourn:* 197. Horminum pratense, foliis serratis. *C. B:* 238. *Moris:* III. p. 393.

273. BETONICA. *Dod:* 40. *Riv: mon. irr. Tilland:* 203.

Floribus rubris. Betonica purpurea. *C. B:* 235. *Tourn:* 203.

Fl. albis. Betonica alba. *C. B:* 235. *Tourn:* 203.

274. MOLDAVICA foliis simplicibus, foliis ad exortum petiolorum nullis.

Fl: coeruleis. Moldavica Betonicæ folio, fl. coeruleo. *Tourn:* 184. Melissa peregrina, folio oblongo. *C. B:* 229. Melissa moldavica. *Matth:* 550. Cedronella. *Rivin. apud Rupp:* 219. Pseudo Melissa. *Rivin. irr. mon:* I. tab. 73.

Fl: albis. Moldavica Betonicæ folio, flore albo. *Tourn:* 184.

---

266. R. alba *β* L: *Spec. Pl.* I. 492, II. 705; H. 132. ♃. **267.** R. gallica L: *Spec. Pl.* II. 704; H. 132. *β*. **268.** R. eglanteria L: *Spec. Pl.* I. 491, II. 704; H. 132. ♀. ϰ. **269.** R. centifolia var. **270.** Salvia officinalis L: *Spec. Pl.* I. 23, II. 34; H. 10. 1. **271.** S. Horminum L: *Spec. Pl.* I. 24, II. 34. **272.** S. pratensis L: *Spec. Pl.* I. 25, II. 35; H. 10. 2. **273.** Betonica officinalis L: *Spec. Pl.* I. 573, II. 810; H. 164. **274.** Dracocephalum moldavica L: *Spec. Pl.* I. 595, II. 830; H. 166. 3.

275. HYSSOPUS foliis oblongis, integris, planis & glabris.

Fl: coeruleis. Hyssopus officinarum, coerulea, spicata. *C. B:* 217. *Tourn:* 200.

Fl: albis. Hyssopus vulgaris, alba. *C. B:* 218. *Tourn:* 201.

Fl: rubris. Hyssopus flore rubro. *C. B:* 217. *Tourn:* 201.

Fl: incanus. Vix descripta. Colitur a Patre charissimo, in Smolandia et Stenbrohult habitante. Flores hujus minores sunt, quam antecedentium, in aliis omnino conveniunt.

276. SATUREJA. *Riv. irr. mon.* I. tab. 44. Kyndel, Safwer. Satureja sativa. *Tourn:* 197. Satureja sativa, hortensis, s. Cunila sativa. *C. B:* 218.

277. LAVENDULA foliis integris. Lawendel. Lavendula angustifolia. *C. B:* 216. *Tourn:* 198. Lavendula. *Matth:* 29.

278. LAVENDULA foliis multifidis. Lavendula folio dissecto. *C. B:* 216. *Tourn:* 198.

279. THYMUS vulgaris, folio latiore. *Tourn:* 196.

α. Thymus vulg: fol: latiore, flore purpureo. *C. B:* 219.

β. Thymus vulg: fol: latiore fl: albicante. *C. B:* 219. Timian. *Marum. Matth:* 489. Pseudo-marum. *Riv. irr. mon.* I. tab. 13. Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis. *Tourn:* 205. Tragoriganum latifolium. *C. B:* 145.

280. MASTICHINA. *Boerh:* I. 156. Marum. *Riv. irr. mon.* I. tab. 40. Marum vulgare s. Clinopodium. *Dod:* 270.

Sampsucus s. Marum Mastichen redolens. *C. B:* 224. Thymbra hispanica, Majoranæ folio. *Tourn:* 197.

281. MENTHA spicata, foliis rotundis, crispis. Mentha crispa. *Riv. irr. mon.* I. tab. 50. Mentha rotundifolia, crispa, spicata. *C. B:* 227. *Tourn:* 189. Krusmuntha.

282. MENTHA spicata, foliis oblongis, subtus hirsutis. Mentha sylvestris, rotundiore folio. *C. B:* 227. *Tourn:* 189. Menthastrum folio rugoso, spontaneum, flore spicato, odore gravi. *J. B:* III. 219.

283. MENTHA verticillata, glabra, ad summum apicem usqve flosculos emittens. Mentha palustris, spicata. *Riv. irr. mon.* I. tab. 49. Mentha rotundifolia, palustris, s. aqvatica major. *C. B:* 227. *Tourn:* 182.

---

275. Hyssopus officinalis L: *Spec. Pl.* I. 569, II. 798; H. 162. **276.** Satureja hortensis L: *Spec. Pl.* I. 568, II. 795; H. 161. 1, **277.** Lavandula Spica L: *Spec. Pl.* I. 572, II. 800; H. 162. 1. **278.** L. multifida L: *Spec. Pl.* I. 572, II. 800; H. 162. 2. **279.** Thymus vulgaris *β* L: *Spec. Pl.* I. 591, II. 825; H. 160. 1. **280.** T. Mastichina L: *Spec. Pl.* II. 827; H. 160. **281.** M. crispa L: *Spec. Pl.* I. 576, II. 805; H. 168. 1. **282.** M. spicata *γ* rotundifolia L: *Spec. Pl.* I. 576; M. rotundifolia L: *Spec. Pl.* II. 805. **283.** M. aqvatica L: *Spec. Pl.* I. 576, II. 805.

284. MENTHA verticillata, foliis ovalibus, integris. Mentha aquatica s. Pulegium vulgare. *Tourn:* 187. Pulegium. *Riv. irr. mon.* I. tab. 23.

Pulegium latifolium. *C. B:* 222.

285. MELISSA hortensis. *C. B:* 229. *Tourn:* 193. Melissa. *Riv. irr. mon.* I. tab. 45. Hiärtans frögd.

286. OCYMUM vulgatius. *C. B:* 226. *Tourn:* 204. Ocymum magnum. *Tabern:* II. 55. Basilika.

287. OCYMUM minimum. *C. B:* 226. Ocymum minimum, caryophyllatum. *Besl. æst: ord:* 7. f. 10. f. 3.

In Horto Golnitziano.

288. MAJORANA vulgaris. *C. B:* 224. *Tourn:* 199. Majorana. *Riv. irr. mon.* I. tab. 58. Amaracus. *Matth:* 487. Mäiram.

298. SCORDIUM. *C. B:* 247. *Knaut:* 88. Chamædrys palustris, canescens, s. Scordium officinarum. *Tourn:* 205.

290. ROSMARINUS hortensis, angustiore folio. *C. B:* 217. *Tourn:* 195. Rosmarinus. *Riv. irr. mon.* I. tab. 39. Rosmarinum coronarium. *Matth:* 524.

291. CHAMÆPITHYS foliis trifidis. Chamæpithys lutea, vulgaris, s. folio trifido. *C. B:* 249. *Tourn:* 208. Chamæpithys. *Riv. irr. mon.* I. tab. 14. Chamæpithys prima. *Dod:* 46.

Exemp: Labiatæ omnes Tournefortii.

DIDYNAMIA TETRANDRIA.

292. VERBENA communis, coeruleo flore. *C. B:* 269. *Tourn:* 200. Verbena. *Matth:* 667.

293. DIGITALIS.

α. Flor. purpureis: Digitalis purpurea, folio aspero. *C. B:* 243. Digitalis purpurea. *Dod:* 169. *Tourn:* 165.

β. Flor. albis: Digitalis flore magno, candido. *Tourn:* 165. Digitalis aspera, flore candido. *C. B:* 244.

294. SCROPHULARIA foliis cordiformibus, irregulariter serratis, petiolis communibus ab alis egredientibus. Scrophularia flore

---

284. M. Pulegium L: *Spec. Pl.* I. 577, II. 807. **285.** Melissa officinalis L: *Spec. Pl.* I. 592, II. 827; H. 163. **286.** Ocimum Basilicum L: *Spec. Pl.* I. 597, II. 833; H. 168. **287.** O. minimum L: *Spec. Pl.* I. 597, II. 833; H. 169. **288.** Origanum Majorana L: *Spec. Pl.* I. 590, II. 825; H. 161. **289.** Teucrium Scordium L: *Spec. Pl.* I. 565, II. 790. **290.** Rosmarinus officinalis L: *Spec. Pl.* I. 23, II. 33; H. 11. **291.** Teucrium Chamæpitys L: I. 562, II. 787; H. 160. 4. **292.** Verbena officinalis L: *Spec. Pl.* I. 20, II. 29. **293.** Digitalis purpurea L: *Spec. Pl.* I. 621, II. 866; H. 178. 1. **294.** Scrophularia vernalis L: *Spec. Pl.* I. 620, II. 864; H. 177. 2.

luteo. *C. B:* 236. *Prod:* 112. *Riv. irr. mon. Tourn:* 166. Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo. *Moris:* II. p. 486. s. 5. t. 8. f. 2.

295. ANTIRRHINUM calcari destitutum, foliis lanceolatis, spicatum. Kalfnos. Antirrhinum flore albo, oris luteis. *Tourn:* 168. Antirrhinum majus alterum, folio longiore. *C. B:* 212.

296. ANTIRRHINUM calcaratum, ramosum, foliis oblongis, florem ex alis demittens. Antirrhinum arvense minus. *C. B:* 212. Linaria pumila, vulgatior, arvensis. *Tourn:* 169.

197. ACANTHUS foliis spinis destitutis. Acanthus sativus mollis Virgilii. *C. B:* 328. Acanthus sativus. *Dod:* 707. Acanthus lævis. *Besl. æst. ord:* II. fol. 2. f. 3.

In Horto Carlbergensi.

298. ECBOLIUM frutescens, labio petali superiori inflexo*. Ecbolium. *Riv. mon. irr.* 129. Ecbolium s. Adhatoda Zeylanensium. *Pluck. Phyth:* CLXXIII. 3. fig. Adhatoda Zeylanensium. *H. L. B:* 643. *Tourn:* 175. Dictamno forte affinis indica, arborescens, Lauri americanæ foliis s. Ecbolium Zeylanensium foliis Laurinis. *Breyn. cent:* 41.

Exemp: Dodartia, Dortmanna, Pedicularis, Odontites, Crista, Melampyrum, Euphrasia, Chelene, Sqvamaria.

Classis XV. TETRADYNAMIA.

§. HEXANDRIA.

299. NASTURTIUM erectum, foliis multifidis.

α. Planis: Nasturtium hortense vulgatum. *C. B:* 103. *Tourn:* 213. Nasturtium. *Matth:* 394. Krasse.

β. Crispis: Nasturtium hortense crispum. *C. B:* 104. *Tourn:*

300. THLASPIDIUM foliis Iberidis. *Rupp:* 259. Thlaspidium creticum qvibusdam, flore rubente. *Tourn:* 213. Thlaspidium umbellatum, creticum, Iberidis folio. *C. B:* 106. Thlaspi VI. *Matth:* 395. Draba s. Arabis aut Thlaspi Candiæ. *Dod:* 713.

Hanc humanitati S. S. Theol. Doct. Ol. Celsii debeo, qvi ob summum favorem, qvo memet amplexus fuit, plures alias contribuit.

---

295. Antirhinum majus L: *Spec. Pl.* I. 617, *β* II. 859; H. 175. 8. **296.** A. minus L: *Spec. Pl.* I. 617, II. 852. **297.** Acanthus mollis L: *Spec. Pl.* I. 639, II. 891; H. 181. **298.** Justicia Adhatoda L: *Spec. Pl.* I. 15, II. 20; H. 7. **299.** Lepidium sativum L: *Spec. Pl.* I. 644, II. 899; H. 183. 1. **300.** Iberis umbellata L: *Spec. Pl.* I. 649, II. 906; H. 184. 2.

301. COCHLEARIA. *Dod:* 583. *S. Paul:* 206. Cochlearia folio subrotundo. *C. B:* 110. *Tourn:* 215. Cochlearia major batavica, subrotundo folio. *Moris:* II. p. 308. s. 3. t. 20. f. 1.

302. ARMORACIA. *Rivin apud Rupp.* 77. Cochlearia folio cubitali. *Tourn:* 215. Raphanus rusticanus. *C. B:* 96. Raphanus vulgaris et rusticanus. *Matth:* 333. Pepparrot.

303. LEPIDIUM foliis ovato acumniatis, serratis, glabris. Lepidium latifolium. *C. B:* 97. *Tourn:* 216. Lepidium. *Fuchs:* 484. Bittersaltza.

304. ERUCA maxima, canadensis. *Cornut:* 15. *Moris:* II. 230. Herba doria. *Dod:* 141. *qvoad figuram tantum.*

305. BRASSICA capitata, alba. *C. B:* 111. *Tourn:* 219. Brassica capitata, albida. *Dod:* 612. Brassica capitata. *Matth:* 345. Hwit hufwud kåhl.

306. BRASSICA alba vel viridis. *C. B:* 111. Brassica vulgaris, sativa. *Dod:* 610.

307. BRASSICA capitata rubra. *C. B:* 111. *Dod:* 610.

308. BRASSICA sabauda, rugosa. *J. B:* II. 828. Brassica alba, crispa. *C. B:* 111. Brassica sabauda. *Dod:* 613.

309. BRASSICA cauliflora. *C. B:* 111. *Tourn:* 219. *Dod:* 613. Brassica multiflora. *J. B:* II. 828. Blomkåhl.

310. BRASSICA radice Napi, s. non caulescens. *Rupp: alt.* 59. Napobrassica. *C. B:* 111. *Prod:* 54. Rotkåhl.

311. BRASSICA caule rapum gerens. *Dod:* 625. [ed. 1616]. Brassica gongyloides. *C. B:* 111.

312. BRASSICA fimbriata. *C. B:* 112. Brassica tophosa. *Tabern. icon.* 401.

Qvod autem hæ Brassicæ diversæ sunt species, vix credere possum, cultura enim multas difformavit. Ex hisce omnibus Brassica gongylodes nostris in hortis rarissima est.

---

301. Cochlearia officinalis L: *Spec. Pl.* I. 647, II. 903. **302.** C. Armoracia L: *Spec. Pl.* I. 648, II. 904. **303.** Lepidium latifolium L: 644, II. 899. **304.**? Brassica Eruca L: *Spec. Pl.* I. 667, II. 932; H. 190. 5.

305.	Brassica oleracea	δ capitata	L: *Spec. Pl.* I. 667, II, 932; H. 189. 1. δ.							
306.	»	»	β viridis	»	»	»	»	»	»	» 189. β.
307.	»	»	γ rubra	»	»	»	»	»	»	» 189. 1. γ.
308.	»	»	ε sabauda	»	»	»	»	»	»	» 189. 1. ε.
309.	»	»	ι botrytis	»	»	»	»	»	»	» 189. 1. ϑ.
310.	»	»	ϰ Napobrassica	»	»	»	»	»	»	» 189. 1. ι.
311.	»	»	λ gongylodes	»	»	»	»	»	»	» 189. 1. ϰ.
312.	»	»	ϑ sabellica	»	»	»	»	»	»	» 189. 1. ξ.

313. NAPUS sativa, radice alba. *C. B:* 95. *Tourn:* 229. Napus. *Dod:* 663. *Matth:* 331.

314. RAPA sativa rotunda, radice candida. *C. B:* 89. *Tourn:* 228. Rapa sativa, oblonga, s. foemina. *C. B:* 90. Rofwa.

315. RAPHANUS radice terra abscondita.

α. Glabra flor. purpurascentibus. Raphanus major vel orbicularis, rotundus. *C. B:* 96. *Tourn:* 209. Raphanus I. *Matth:* 332. Raphanus seu Radicula sativa. *Dod:* 665.

β. Glabra fl. albis. Raphanus major vel orbicularis, flor. candidis. *C. B. Tourn.* Månads Rätticka.

γ. Rugosa. Raphanus niger. *C. B:* 95. *Tourn:* 229. Winterrätticka.

316. RAPHANUS radice supra terram conspicua. Raphanus niger, oblongus. *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Raphanus II. *Matth:* 332. Radicula sativa, minor. *Dod:* 655. Radijs.

317. HESPERIS caule villoso. Hesperis montana, pallida, odoratissima. *C. B:* 202. *Tourn:* 222. Witsioe.

318. HESPERIS caule glabro.

α. Flor. purpurascentibus. Hesperis hortensis. *C. B:* 202. Hesperis hortensis, flor. purpureo. *Tourn:* 222. *Moris:* II. p. 251. s. 3. t. 10. f. 1.

β. Flor. albis simplicibus. Hesperis hortensis, fl. candido. *Tourn:* 222. Viola hyemalis, fl: albo. *Tabern:* II. 25.

γ. Flor. albis plenis. Hesperis hortensis, flore pleno, albo. *Tourn:*

319. LEUCOJUM foliis acutis.

α. Leucojum luteum vulgare. *C. B:* 202. *Tourn:* 221. Keiri luteum vulgare. *Rupp:* 70. Leucojum aureum. *Matth:* 575.

β. Leucojum luteum, fl. pleno, majus. *Tourn:* 222.

γ. Leucojum luteum, fl. pleno, minus. *Tourn:*

320. LEUCOJUM foliis obtusis.

α. Leucojum purpureum vel rubrum. *C. B:* 200. *Tourn:* 220.

β. Leucojum incanum, majus, multiplex fl. purpureo. *Tourn:* 221.

γ. Leucojum incanum, majus (: flore albo :). *C. B:* 200.

δ. Leucojum incan: majus, multiplex, flore albo. *C. B:* 200.

---

313. Brassica Napus *β* L: *Spec. Pl.* I. 666, II. 931; H. 190. 4. **314.** B. Rapa L: *Spec. Pl.* I. 666, II. 931; H. 190i 3. **315—316.** Raphanus sativus L: *Spec. Pl.* I. 669, II. 935; H. 188. **317.** Hesperis tristis L: *Spec. Pl.* I. 663, II. 927; H. 187. 1. **318.** H. matronalis L: *Spec. Pl.* I. 663, II. 927; H. 188. 2. **319.** Cheiranthus Cheiri L: *Spec. Pl.* I. 661, II. 924; H. 187. 2. **320.** C. incanus L: *Spec. Pl.* I. 662, II. 924; H. 187. 1.

ε. Leucojum incanum, majus, coccineum. *Moris:* II. 250.
ζ. Leucojum incan: maj: coccineum, multiplex. *Moris:*

§. OCTANDRIA.

321. THYMELÆA Lauri folio sempervirens*. *Tourn:* 595. Laureola sempervirens, flore viridi, qvibusdam Laureola mas. *C. B:* 462. Laureola sempervirens, flore luteo. *J. B:* I. 564. Laureola. *Dod:* 365.
In Horto Piperiano.

Classis XVI. POLYDYNAMIA.

§. PENTADYNAMIA, DECANDRIA.

322. OXYTRIPHYLLUM ramosum. Oxys lutea. *Tourn:* 88. Oxys flor. luteis. *Tabern:* II. 227. Trifolium acetosum, corniculatum. *C. B:* 330. Trifolium acetosum, cornicul: luteum, minus, repens et etiam procumbens. *Moris:* II. p. 183. s. 2. t. 7. f. 2.

Classis XVII. MONODELPHIA.

323. MALVA mauritanica. *Rupp:* 13. Malva folio Ficus. *Prod:* 137. Altera. *C. B:* 315. Alcea rosea, hortensis, maxima, folio Ficus nigricante & aspero. *Tourn:* 98. Kattost.

324. MALVA foliis inferioribus sinuatis, superioribus ad petiolum usq. multifidis.

α. Flor: albis. Alcea vulgaris major, fl. candidiore. *C. B:* 316. *Tourn:* 97.

β. Flor: rubris. Alcea vulg. maj. fl. ex rubro roseo. *C. B: Tourn:*

325. MALVA margine foliorum crispo et undulato. Malva foliis crispis. *C. B:* 315. *Tourn:* 95. Malva crispa. *Dod:* 642. *Besl. æst:* 6. f. 9.

---

321. Daphne Laureola L: *Spec. Pl.* I. 357, II. 510; H. 94. **322.** Oxalis corniculata L: *Spec, Pl.* I. 435, II. 623; H. 116. **323.** Malva mauritiana *β* L: *Spec. Pl.* I, 689, II. 970; H. 200. 3. **324.** M. moschata L: *Spec. Pl.* I. 690, II. 971; H. 202. **325.** M. verticillata *β* crispa L: *Spec. Pl.* I. 689, M crispa *Spec. Pl.* II. H. 200. 2.

326. ALTHÆA Dioscoridis. *Breyn: Prod.* II. 12. Althæa Dioscoridis et Plinii. *C. B:* 315. *Tourn:* 97. Althæa. *Matth:* 600. Althæa Ibiscus. *Dod:* 614.

327. ALCEA. Malva major. *Matth:* 339. Ståckroser.

α. Floribus simplicibus carneis, l. purpureis, l. luteis, l. albis.

a. Malva rosea, folio subrotundo, fl. dilutius rubescente. *C. B:* 315. *Tourn:* 94.

b. Malva rosea, fol: subrot: fl: ex rubro nigricante. *T.*

c. Malva ros: fol: subrot: fl: simplici, luteo. *T.*

d. Malva ros: fol: subrot: fl: candido. *T.*

β. Fl. plenis carneis, l. purpureis, l. luteis, l. albis.

e. Malva ros: fol: subrot: fl: pleno, incarnato. *T.*

f. Malva ros: fol: subrot: fl: pleno, nigricante. *T.*

g. Malva fol: pleno et subluteo. *T.*

h. Malva fl: pleno, albo. *T.*

328. KETMIA Syrorum qvibusdam*. *C. B:* 316. *Tourn:* 98. Alcea arborescens syriaca. *C. B:* 316. Alcea arborescens glabra, Ketmia dicta. *J. B:* II. 957.

329. IBISCUS*. Malva arborea, veneta dicta, parvo flore. *C. B:* 315. Althæa maritima, veneta. *Tourn:* 97.

330. BAMMIA. *Rivin. apud Rupp:* 38. Ketmia vesicaria, vulgaris. *Tourn:* 101. Alcea vesicaria. *C. B:* 317. *Dod:* 646. Hypechoum. *Matth:* 673.

Classis. XVIII. DIDELPHIA.

§. AEQVALIS.

331. FUMARIA caule simplici, coma laciniata. Fumaria bulbosa, radice solida, calcari et folio cristato. *J. B:* III. 205. Fumaria bulbosa, radice non cava, major. *C. B:* 144. *Tourn:* 214.

332. FUMARIA caule simplici, coma integra.

α. Fl. rubris. Fumaria bulbosa, radice cava, major (: *C B:* 143 :), fl. rubro, dilutiore. *Tourn:* 422. Fumaria bulbosa. *Tilland:* 52. Fuma-

---

326. Althæa officinalis L: *Spec. Pl.* I. 686, II. 966; H. 204. **327.** Alcea ficifolia L: *Spec. Pl.* I. 687, II. 967; H. 204. 2. **328.** Hibiscus syriacus L: *Spec. Pl.* I. 695, II. 978; H. 205. 3. **329.** Lavatera arborea L: *Spec. Pl.* I. 690, II. 972; H. 202. 1. **330.** Hibiscus Trionum L: *Spec. Pl.* I. 697, II. 981; H. 206. 6. **331.** Fumaria bulbosa γ solida L: *Spec. Pl.* I. 699, II. 983. **332.** F. bulbosa α cava L: *Spec. Pl.* I. 699, II. 983.

ria altera. *Matth:* 722. Pseudo-fumaria. *Rivin: tetr. irr.* II. tab. 198. Split radice rotunda, cava. *Rivin. apud Rupp.* 257.

β. Fl. albis. Fumaria bulb: rad: cava, maj: fl: albo. *C. B: Tourn: Has duas varietates in Scania sponte nascentes vidi.*

§. **INÆQVALIS.**

333. LUPINUS caule in ramos subdiviso. Lupinus sativus, fl. albo. *C. B:* 347. *Tourn:* 392. Lupinus fl. albo. *Rivin. tetr. irr.* II. tab. 150. Lupinus. *Matth:* 328. *Tilland:* 90. Lupiner.

334. LUPINUS caule erecto ramos emittente.

α. Fl. coeruleis. Lupinus angustifolius, coeruleus, elatior. *Tourn:* 392.

β. Fl: luteis. Lupinus sylvestris, fl. luteo. *C. B:* 348. *Tourn:* 392. Lupinus fl. luteo. *Rivin. tetr. irr:* II. tab. 151.

335. FABA.

α. Major seminibus albis l. rubris. Faba flore candido, lituris nigris conspicuo. *C. B:* 338. *Tourn:* 391. Faba major. *Rivin. tetr. irr:* II. tab. 148. Faba fructu ex purpura nigrescente. *Tourn:* 392.

β. Minor seminibus albis l. rubris. Faba rotunda, oblonga s. cylindracea, minor s. eqvina alba. *Tourn:* 392. Faba minor s. eqvina. *C. B:* 338. Faba rot: obl: s. cyl: min. s. eqv: nigra. *Tourn:* 393.

336. PHASEOLUS convolvens.

α. Seminibus albis. Phaseolus vulgaris. *Tourn:* 412. Phaseolus. *Riv. irr. tetr:* II. tab. 155. Smilax hortensis s. Phaseolus major. *C. B:* 339.

β. Seminibus albis, nigris lituris pictis. Phaseolus vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituris destincto. *Tourn:* 412. Phaseolus vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato. *Tourn:* 412.

337. PHASEOLUS non scandens. Phaseolus puniceo flore. *Tourn:* 414. Phaseolus indicus, fl. coccineo s. puniceo. *Moris:* II. p. 69. s. 2. t. 5. f. 4.

338. CICER Brunf.

α. Flor albis: Cicer sativum, flore candido. *C. B:* 347. *Tourn:* 389.

β. Fl. rubris: Cicer sativum, semine rufo. *C. B: Tourn:* Cicer rubrum. *Tilland:* 105.

---

333. Lupinus albus L: *Spec. Pl.* I. 721, II. 1015; H. 209. 1. **334.** L. angustifolius L: *Spec. Pl.* I. 721, II. 1015. **335.** Vicia Faba L: *Spec. Pl.* I. 737, II. 1039; H. 218. 1. **336.** Phaseolus vulgaris L: *Spec. Pl.* I, 723, II. 1016; H. 213. 1. **337.** P. coccineus L: *Spec. Pl.* I. 724. Ph. vulgaris β coccineus *Spec. Pl.* II. 1016; H. 213. 3. **338.** Cicer arietinum L: *Spec. Pl.* I. 738, II. 1040; H. 224. 1.

339. PISUM.

α. Pisum cortice eduli. *Tourn:* 394. Pisa sine cortice duriore. *C. B:* 243. Pisa leptoloba, qvæ simul cum folliculis comeduntur. *Volck:* 335.

β. Pisum hortense, fructu nigra linea maculato. *Tourn.*

γ. Pisum hortense fructu siliqva maxima. *Tourn.*

δ. Pisum hortense majus, flore fructuq. variegato. *C. B. Tourn.*

ε. Pisum arvense, fructu viridi. *C. B. Tourn.*

ζ. Pisum arvense, fructu albo. *Tourn.*

340. LATHYRUS geminifolius, petiolo ex alis bifloro. Lathyrus siculus. *Rivin. apud Rupp:* 251.

341. LATHYRUS geminifolius, petiolo ex alis multifloro, foliis ovatis. Lathyrus arvensis, repens, tuberosus. *C. B:* 334. *Tourn:* 395. Lathyrus arvensis. *Riv. irr. tetr.* II. tab. 167. Lathyrus arvensis, radice tuberosa, repente. *Moris:* II. p. 51. s. 2. t. 2. f. 1. Pseudo-Apios. *Matth:* 785.

342. LATHYRUS foliis alternatim pennatis, petiolo ex unifloro. Clymenum hispanicum, fl. vario, siliqva plana. *Tourn:* 396.

343. FALCATA frutescens*. Falcata incana. *Riv. irr. tetr:* II. tab. 210. *Dill: n. pl. g:* 130. Medica trifoliata, frutescens, incana. *Tourn:* 412. Cytisus incanus, siliqvis falcatis. *C. B:* 389. Cytisus ut existimatur. *Dod:* 559.

344. LABURNUM*. *Riv. irr. tetr:* II. 187. Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo. *Tourn:* 648. Anagallis non foetida, major l. alpina. *C. B:* 391.

345. SILIQVASTRUM*. *Tourn:* 646. Siliqva sylvestris rotundifolia. *C. B:* 402. Arbor judæ. *Dod:* 786.

In Horto Ulriksdahl.

346. HEDYSARUM, clypeatum, flore svaviter rubente. *Tourn:* 405. Hedysarum. *Rivin. irr. tetr.* II. tab. 223. Onobrychis semine clypeato, aspero, major. *C. B:* 350. Onobrychis major, perennis, siliculis articulatis, asperis, clypeatis, recta junctis, fl. ruberrimo. *Moris:* II. p. 129. s. 2. t. 2. f. 4.

---

339. Pisum sativum L: *Spec. Pl.* I. 727, II. 1026; H. 215. 1. **340.** Lathyrus odoratus α siculus L: *Spec. Pl.* I. 732, II. 1033; H. 216. 1. **341.** L. tuberosus L: *Spec. Pl.* I. 732, II. 1033; H. 216. 1. **342.** L. Clymenum L: *Spec. Pl.* I. 732, II. 1032; H. 217. 6. **343.** Medicago arborea L: *Spec. Pl.* I. 778, II. 1096; H. 230. 5. **344.** Cytisus Laburnum L: *Spec. Pl.* I. 739, II. 1041; H. 210. **345.** Cercis Siliqvastrum L: *Spec. Pl.* I. 374, II. 534; H. 99. 1. **346.** Hedysarum coronarium L: *Spec. Pl.* I. 750, II. 1058; H. 231. 1.

347. TETRAGONOLOBUS. *Knaut:* 188. Lotus tetragonolobus, fl. ruberrimo. *Riv. tetr. irr:* II. tab. 205. Lotus ruber, siliqva angulosa. *C. B:* 332. *Tourn:* 403. Lotus siliqvosa, fl: fusco tetragonolobus. *J. B:* II. 358.

348. GENISTA juncea*. *Tourn:* 643. Genista. *Matth:* 764. Spartium arborescens, seminibus Lentis similibus. *C. B:* 396. Macrolobion. *Rencalm:* 33.

349. NEPA*. *Raj.* Genistella spinosa. *Riv. tetr. irr.* II. tab. 192. Genistella. *Tabern:* III. 184. Genista. *Tabern:* ibm. Genista Spartium minus, germanicum. *Tourn:* 644. Genista spinosa, minor, germanica. *C. B:* 395.

350. MELILOTUS erecta, floribus in spicis congestis.

α. Flor albis: Melilotus officinarum Germaniæ, fl. albo. *C. B:* 331. *Tourn:* 407. Melilotus siliculis pendentibus, curtis, candida, major. *Moris:* II. s. 2. t. 16. f. 1.

β. Flor luteis: Melilotus officinarum Germaniæ. *C. B:* 331. *Tourn:* 407. Trifolium odoratum s. Melilotus vulgaris, flore luteo. *J. B:* II. 370.

351. MELILOTUS erecta, floribus in capitula digestis. Melilotus major, odorata, violacea. *Moris:* II. p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. *Tourn:* 409. Melilotus coerulea. *Rivin. tetr. irr:* II. tab. 134. Lotus hortensis, odorata. *C. B:* 331. Lotus sylvestris. *Matth:* 724.

352. FOENUM græcum sativum. *C. B:* 348. *Tourn:* 409. Foenum græcum. *Tilland:* 138. Foeno græcum. *Matth:* 317.

353. ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris, sylvestris. *Tourn:* 416. *Moris:* II. 107. Glycyrrhyza sylvestris, fl. luteo-pallescentibus. *C. B:* 352.

354. COLUTHEA*. *Rivin. tetr. irr:* II. tab. 147. *Matth:* 520. *Dod:* 772. Colutea vesicaria. *C. B:* 396. *Tourn:* 649.

Exemp: Polygala.

---

347. Lotus tetragonolobus L: *Spec. Pl.* I. 773, II. 1089; H. 220. 1. **348.** Spartium junceum L: *Spec. Pl.* I. 708, II. 995; H. 208. 1. **349.** Genista germanica L: *Spec. Pl.* I. 710, II. 999. **350.** Trifolium Melilotus officinalis L: *Spec. Pl.* I. 765, II. 1089; H. 223. 8. **351.** T. Melilotus coerulea L: *Spec. Pl.* I. 764, II. 1077; H. 223. 7. **352.** Trigonella Foenum græcum L: *Spec. Pl.* I. 777, II. 1095; H. 229. 2. **353.** Astragalus glycyphyllos L: *Spec. Pl.* I. 758, II. 1067. **354.** Colutea arborescens L: *Spec. Pl.* I. 723, II. 1045; H. 228. 1.

Classis XIX. SYNGENESIA.

§. CONJUGIUM PURUM.

355. TRAGOPOGON foliis integris, glabris.

α. Floribus violaceis: Tragopogon purpureo-coeruleum, Porri folio, qvod Artifi vulgo. *C. B:* 274. *Tourn:* 477.

Tragopogon alterum. *Matth:* 380. Båckskiägg. Scorzonera latifolia, sinuata. *C. B:* 275. *Moris:* III. 81. *Tourn:* 476.

356. PILOSELLA repens, multiflora. Pilosella indica. *Cornut:* 309. Pilosella polyclonos, repens, major, fl. amplo, aurantiaco. *Moris:* III. p. 78. s. 7. t. 8. f. 7. Pilosella peregrina, fl. saturate croceo. *Rupp:* 196. Hieracium hortense, flor: atro-purpurascentibus. *C. B:* 128. *Tourn:* 471. *Pont: Diss.* 89.

357. LACTUCA sativa. *C. B:* 122. *Tourn:* 473.

α. Lactuca florescens. *Matth:* 371.

β. Lactuca capitata. *C. B. Tourn.* Hufwud Laktuk.

γ. Lactuca crispa. *C. B. Tourn.* Krus Laktuk.

358. SONCHUS paludosus, altissimus, hastato folio. *Moris:* III. 61. Sonchus tricubitalis, folio cuspidato. *Raj:* s. 163. Sonchus asper, arborescens. *C. B:* 124. *Tourn:* 474.

359. CICHORIUM sylvestre. *Matth:* 361.

α. Fl: coeruleis: Cichorium sylvestre & officinarum. *C. B:* 125. *Tourn:* 479.

β. Fl: albis: Cichorium sylvestre, fl. albo. *C. B:* 235. *Tourn. Londini sponte in campis copiosissime proveniunt.*

360. B. CARDUUS albis maculis notatus, vulgaris. *C. B:* 381. *Tourn:* 440. Carduus leucographus. *Dod:* 710. Silybum albis maculis notatum, flore purpureo. *Vaill. Ac. R. Sc:* pag. 219.

361. CINARIA hortensis, foliis non aculeatis. *C. B:* 383. *Tourn:* 442. Carduus non aculeatus. *Matth.* 454. Ärtskockor öfwer jord.

362. CNICUS sqvamis capitulorum in spinas ramosas productis. Cnicus sylvestris hirsutior s. Carduus benedictus. *C. B:* 378. *Tourn:*

---

355. Tragopogon porrifolium L: *Spec. Pl.* I. 789, II. 1110; H. 243. 2. **356.** Hieracium aurantiacum L: *Spec. Pl.* I. 801, II. 1126; H. 238. 3. **357.** Lactuca sativa L: *Spec. Pl.* I. 795, II. 1118, H. 242. **358.** Sonchus palustris L: *Spec. Pl.* I. 793, II. 1116; H. 244. 1. **359.** Cichorium Intybus L: *Spec. Pl.* I. 813, II. 1142. **360.** Carduus syriacus L: *Spec. Pl.* I. 823, II. 1153; H. 250. 3. **361.** Cynara Scolymus L: *Spec. Pl.* I. 827, II. 1159; H. 251. **362.** Cnicus benedictus L: *Spec. Pl.* I. 826; Centurea benedicta L: *Spec. Pl.* II. 1296; Cnicus Hort. Ups. 250.

450. Carduus benedictus. *Matth:* 541. *Tilland:* 28. Carduus luteus procumbens, sudorificus & amarus. *Moris:* III. p. 160. s. 7. t. 34. f. 1. Kard-Benedict.

363. CNICUS erectus, foliis inferioribus laciniatis, superioribus integris, serratis. Cnicus pratensis, Acanthi folio, fl: flavescente. *Tourn:* 450. Carduus pratensis, latifolius. *C. B:* 376. Cirsium fibrosum, foliis latioribus divisis, viridibus, floribus albicantibus. *Moris:* III. p. 150. s. 7. t. 20. f. 20. Cirsium acanthoides pratense, flore ochroleuco. *Vail:* 38.

364. CARTHAMUS.

α. Fl. fulvo: Carthamus officinarum, fl: croceo. *Tourn:* 457. Cnicus sativus s. Carthamus officinarum. *C. B:* 378. Cnicus s. Carthamus. *Dod:* 359. Cnicus. *Matth:* 797. Saflor.

365. SPHÆROCEPHALUS perennis. Echinopus. *Tourn:* 463, major, fl: candido, staminibus in medio coeruleis. *Ejusd.* Carduus sphærocephalus, latifolius, vulgaris. *C. B:* 381. Carduus sphærocephalus. *Dod:* 710.

366. XERANTHEMUM. Xeranthem: fl: simplici, purpureo, majori. *Tourn:* 499. Stoebe. *Rivin apud Rupp:* 206. Jacea Oleæ folio, capitulis simplicibus. *C. B:* 272. Ptarmica altera. *Dod:* 698. Flos æternitatis. *Hort.*

367. CHRYSOCHOME. *Dill. n. pl. gen:* 167. Coma aurea germanica. *Boerh:* I. 121. Conyza Linariæ folio. *Tourn:* 455. Virga aurea Linariæ folio, floribus congestis et umbellatim dispositis. *Moris:* III. p. 125. Linaria folioso capitulo luteo, major. *C. B:* 213.

368. PETASITES major et vulgaris. *C. B:* 197. *Tourn:* 451. Petasites. *S. Paul:* 104 fig. c. flore. Pestilensört.

369. ELICHRYSUM perenne, calycibus argenteis. Elichrysum americanum latifolium. *Tourn:* 453. Gnaphalium latifolium americanum. *C. B:* 263. Helichrysum s. Chrysocome repens, foliis deciduis, flore externe albo, intus flavescente. *Moris:* III. p. 88.

370. ELICHRYSUM orientale. *C. B:* 264. *Prod:* 123. *Tourn:* 453. Gnaphalium luteum peregrinum, specioso flore. *Volck:* 193.

---

363. C. oleraceus L: *Spec. Pl.* I. 826, II. 1156. **364.** Carthamus tinctorius L: *Spec. Pl.* I. 830, II. 1162; fl. 251. 1. **365.** Echinops sphærocephalus L: *Spec. Pl.* I. 814, II. 1314; H. 248. 1. **366.** Xeranthemum annuum L: *Spec. Pl.* I. 857, II. 1201; H. 255. **367.** Chrysocoma Linosyris L: *Spec. Pl.* I. 841, II. 1178. **368.** Tussilago Petasites L: *Spec. Pl.* I. 866, II. 1215. **369.** Gnaphalium margaritaceum L: *Spec. Pl.* I. 850, II. 1198; H. 255. **370.** G. orientale L: *Spec. Pl.* I. 853, II. 1195; H. 256. 3.

371. SANTOLINA foliis teretibus*. *Tourn:* 460. Abrotanum foemina, foliis teretibus. *C. B:* 136. Abrotanum foemina. *Matth:* 468.

372. TANACETUM foliis pennatis, crispis. Tanacetum fol. crispis. *C. B:* 132. *Tourn:* 461. Krusig Renfana.

373. TANACETUM foliis integris, serratis. Tanacetum hortense, foliis & odore Menthæ. *Tourn:* 461. Balsamita major. *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. fig. 1. *Boerh:* I. 12.

374. SERRATULA foliis pennatim sectis, æqvaliter serratis. Crupina Belgarum. *Knaut:* 142. *Rupp:* 173. Iacea annua, foliis lanceolatis, serratis, purpurascente flore. *Tourn:* 444. Rhaponticoides annua, foliis lanceolatis, serratis, purpurascente flore. *Vaill. Ac. R. sc:* 1719. p. 228. Chondrilla fol. laciniatis; serratis, purpurascente flore. *C. B:* 130. Chondrilla hispanica. *Tabern:* I. 469.

SYNGENESIA IMPURA PER SCORTA SUPERFLUA. §. CONJUGIUM IMPURUM PER SCORTA SUPERFLUA.

375. JACOBÆA foliis crassis, subtus niveis. Jacobæa maritima. *C. B:* 131. *Tourn:* 486.

376. JACOBÆA africana frutescens, fl: amplo, purpureo, elegantissimo Senecionis folio. *Volck:* 225 fig. & descr.

377. DORIA foliis serratis. Solidago sarracenica. *Dod:* 141. Jacobæa alpina, fol. longioribus, serratis. *Tourn:* 485. Virga aurea angustifolia, serrata. *C. B:* 268.

378. SOLIDAGO foliis integris, floribus homomallis. Virga aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita. *Tourn:* 484. Virga aurea mexicana. *C. B:* 153. descr.

379. AMELLUS foliis lanceolatis scabris, ternis utrinqve crenis communiter notatis. Aster atticus coeruleus, vulgaris. *C. B:* 267. *Tourn:* 481. *Pont. Diss:* 226. NB. Amellus. *Virg: Georg:* L. 4. v. 271.

Est etiam flos pratis, cui nomen Amello fecere Agricolæ: facilis qværentibus Herba, namqv. uno ingentem tollit de cespite sylvam, aureus ipse, sed in foliis, qvæ plurima circumfunduntur, violæ sublucet purpura nigræ.

371. Santolina Chamæcyparissus L: *Spec. Pl.* I. 842, II. 1179; H. 252. 1. **372.** Tanacetum vulgare β crispum L: *Spec. Pl.* I. 845, II. 1184. **373.** T. Balsamita L: *Spec. Pl.* I. 845, II. 1184; H. 255. **374.** Centaurea Crupina L: *Spec. Pl.* I. 909, II. 1201; H. 255. **375.** Othonna maritima L: *Spec. Pl.* I. 925; Cineraria maritima L: *Spec. Pl.* II. 1244; Othonna L: Hort. Ups. 273. 2. **376.** Senecio elegans L: *Spec. Pl.* I. 869, II. 1218; H. 260. 2. **377.** S. saracenicus L: *Spec. Pl.* I. 871; S. saracenicus L: *Spec. Pl.* II. 1221; H. 260. 1. **378.** Solidago mexicana L: *Spec. Pl.* I. 879, II. 1234. **379.** Aster Amellus L: *Spec. Pl.* I. 873, II. 1226.

380. AMELLUS disci floris diametro longitudinem radii bis superante. Aster pratensis, autumnalis, Conyzæ folio. *Tourn:* 488. Conyza media, Asteris flore luteo, l. tertia Dioscoridis. *C. B:* 265. Conyza media Matth. fl. magno, luteo, humidis locis proveniens. *J. B:* II. 1050. Conyza media. *Dod:* 52.

381. HELENIUM officinarum. *Rupp:* 163. Helenium vulgare. *C. B:* 276. Aster omnium maximus, Helenium dictus. *Tourn:* 483. Enula campana. *Till:* 136. Ålands-ört.

382. ASTER perennis, foliis lanceolatis, serotinus. Aster virginianus, angustifolius, serotinus, parvo albente flore. *Rupp:* 168. Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore. *Tourn:* 482.

383. ASTER annuus, foliis inferioribus latioribus, crenis qvibusdam instructis, superioribus v. integris. Aster annuus, ramosus, canadensis. *Tourn:* 482. Bellis ramosa, umbellifera. *Cornut:* 193.

384. CHAMÆMELUM nobile, s. Leucanthemum odoratius. *C. B:* 135: *Tourn:* 494. Chamæmelum odoratum. *Dod:* 259. Sötblomster.

α. Floribus plenis: Chamæmelum nobile, fl. multiplici. *C. B:* 135. *Tourn:* 494. Chamæmelum romanum, flore multiplici. *Tabern:* I. 156. [p. 56].

385. MATRICARIA vulgaris s. sativa. *C. B:* 133. *Tourn:* 493.

386. MATRICARIA latifolia, petalis fistulosis, simplex. *Moris:* III. p. 32. s. 6. t. 6. f. 10.

Varietas antecedentis, ni fallor.

387. BELLIS caule nudo, uniflora.

α. Non mutata: Bellis sylvestris minor. *C. B:* 261. *Tourn:* 491. Bellis minor. *Matth:* 593.

In Scania sponte.

β. Flore pleno albo: Bellis hortensis, flore pleno eoq. magno, albo. *Tourn.*

γ. Flore pleno incarnato: Bellis hort. fl. pleno eoq. magn. incarnato. *Tourn.* Bellis hortensis. *Dod:* p. 265 in ed. 1583.

δ. Floris radio fistuloso: Bellis hortensis rubra, flore multiplici, fistuloso. *Tourn:* 491.

---

380. Inula dysenterica L: *Spec. Pl.* I. 882, II. 1237. **381.** I. Helenium L: *Spec. Pl.* I. 881, II. 1236. **382.** Aster tradescanti L: *Spec. Pl.* I. 876, II. 1230; H. 262. 2. **383.** A. annuus L: *Spec. Pl.* I. 875, II. 1229; H. 262. 1. **384.** Anthemis nobilis L: *Spec. Pl.* I. 894, II. 1260. **385—386.** Matricaria Parthenium L: *Spec. Pl.* I. 890, II. 1255; H. 263. **387.** Bellis perennis L: *Spec. Pl.* I. 886, II. 1248; H. 265.

388. PTARMICA foliis integris, lanceolatis, serratis. Ptarmica vulgaris, folio longo, serrato, fl. albo. *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis, serrato folio. *C. B:* 98. Dracunculus pratensis viridis s. Ptarmica vulgaris, folio serrato. *Moris:* III. p. 40. s. 6. t. 12. f. 1.

β. Floribus plenis: Ptarmica vulgaris, flore pleno. *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis, fl. pleno. *C. B:* 98.

389. CHRYSANTHEMUM folio minus secto, glauco. *Tourn:* 492. Bellis lutea, foliis profunde incisis, major. *C. B:* 262.

Sponte in Scania inter segetes floret.

390. CHRYSANTHEMUM majus, folio profunde laciniato, magno flore. *C. B:* 144. *Tourn:* 492.

α. Chrysanthemum fl. partim luteo, partim candido. C. B.

β. Chrysanthemum fl. pleno, partim luteo, partim candido. Tourn.

391. ABROTANUM mas, angustifolium, majus. *C. B:* 136. *Tourn:* 459. Abrotanum mas. *Dod:* 21. Abrodd.

392. CALENDULA. *Dod:* 254.

α. Fl. simplicibus: Caltha vulgaris fl: pallido. *C. B:* 275. *Tourn:* 498.

β. Fl. plenis: Caltha polyanthos major. *C. B. Tourn.* Caltha polyanthos maxima. *C. B. Tourn.*

γ. Fl. proliferis: Caltha prolifera, minoribus floribus. *C. B. Tourn.* Calendula prolifera. *Till:* 146. Ringblomma.

393. TAGETES caule in ramos subdiviso.

α. Fl. simplicibus: Tagetes indicus minor, simplici flore, s. Caryophyllus indicus s. Flos africanus. *Tourn:* 488. Tanacetum africanum s. Flos africanus minor. *C. B.* 133. Flos africanus. *Dod:* 254.

β. Fl. plenis: Tagetes indicus minor, multiplicato flore. *Tourn.* Samets blomma.

394. TAGETES caule erecto, ramos laterales emittente.

α. Fl. simplici: Tagetes maximus rectus, flore simplici et luteopallido. *Tourn:* 488. Tanacetum s. Flos africanus major, simplici flore. *C. B.* 133.

β. Fl. plenis: Tagetes maximus rectus, fl. maximo, multiplicato. *Tourn.* Tanacetum s. Flos africanus major, fl. pleno. *C. B:* 132. Caryophyllus indicus major. *Matth:* 430.

---

388. Achillea Ptarmica L: *Spec. Pl.* I. 898, II. 1266; H. 265. 1. **389.** Chrysanthemum segetum L: *Spec. Pl.* I. 889, II. 1254. **390.** C. coronarium L: *Spec. Pl.* I. 890, II. 1254; H. 263. **391.** Artemisia Abrotanum L: *Spec. Pl.* I. 845, II. 1185; H. 257. 2. **392.** Calendula officinalis L: *Spec. Pl.* I. 921, II. 1304; H. 274. 1. **393.** Tagetes patula L: *Spec. Pl.* I. 887, II. 1249; H. 267. 1. **394.** T. erecta L: *Spec. Pl.* I. 887, II. 1249; H. 267. 2.

γ. *Floris radio tubulato:* Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso. *Tourn.* Tanacetum s. Flos mexicanus, flore fistuloso. *C. B.*

δ. *Flore e flosculis tubulosis pleno:* Tagetes indicus flore fistuloso, duplicato. *Tourn:* 489.

SYNGENESIA IMPURA PER SCORTA FRUSTRANEA. §. CONJUGIUM IRREGULARE FRUSTRANEUM.

395. CORONA multiflora, nutante flore. Sol amplissimo, nutante flore. *Rupp:* 104. Corona solis II. *Tabern. Icon:* 762. *Tourn:* 489. Helenium indicum, maximum. *C. B:* 276. Chrysanthemum indicum, annuum, maximum, ramosum, s. Flos solis major ramosus. *Moris:* III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Sohlblomma.

396. CORONA pumila. Corona solis minor, foemina. *Tabern:* II. 443. *Tourn:* 489. Helenium indicum, minus. *C. B:* 277.

397. CORONA radice tuberosa. Sol altissimus, radice tuberosa, esculenta. *Rupp:* 155. Corona solis parvo flore, tuberosa radice. *Tourn:* 489. Helianthemum indicum, tuberosum. *C. B.* 277. Chrysanthemum perenne, majus, foliis integris, americanum, tuberosum. *Moris:* III. p. 23. s. 6. t. 6. f. 57.

Raro admodum heic floret, unicam tantum 1727 mense Novembri Londini florentem observari. Ärtskåcker under jorden.

398. RUDBECKIA foliis divisis.

α. *Laciniis latioribus:* Corona solis, foliis amplioribus, laciniatis. *Tourn:* 490. Obeliscotheca Hydrophylli folio, lobis latioribus. *Vaill: Ac: R: sc:* 1720. p. 426. Doronicum americanum, laciniato folio. *C. B:* 514. descr. Chrysanthemum americanum, perenne, foliis divisis, dilute virentibus, majus. *Moris:* III. p. 22. s. 6. t. 6. f. 52.

Rudbeckia *est plantæ genus flore radiato sive composito ex flosculis planis et tubulatis simul.*

Perianthium *e gemino ordine foliorum sibi incumbente constat, qvorum qvisq. sex communiter foliis instruitur, iisq. obtusis.*

Radius *12 plerumque flosculis planis, pistilloque destitutis, embryone abortiente impositis componitur.*

Disci *ipsius flosculi tubulati, qvinquefidi, androgyni sunt.*

Semina *succedunt flosculis disci, paralele qvadragona, apice lævi margine coronata.*

---

395. Helianthus annuus L: *Spec. Pl.* I. 904, II. 1276; H. 268. 1. **396.**? H. multiflorus L: *Spec. Pl.* I. 905, II. 1277; H. 268. 2. **397.** H. tuberosus L: *Spec. Pl.* I. 905, II. 1277; H. 268. 3. **398.** Rudbeckia laciniata L: *Spec. Pl.* I. 906, II. 1279; H. 269. 1.

Basis (: *placenta* :) *pyramidalis, sqvamulis deciduis, singulis seminibus subjectis instructa est.*

Tournefortius *eam ad Coronam solis refert, a qva ut facie externa, ita etiam partibus fere omnibus generationi dicatis, differt.*

Coronæ perianthium *sqvamis innumeris in acutum desinentibus componitur.*

Radius *flosculis planis innumeris instruitur.*

Semina *obliqva, qvadrangularia s. compresso-qvadragona sunt, corona membranacea destituta.*

Flosculi *tubulati ventriculo ampliato ab omnibus sui classis generibus diversi eradunt.*

Placenta *plana s. potius concava.*

Generi huic novo a sene venerabili, Botanico excellenti, Nobilissimo ac generosissimo D:no Olavo Rudbeck filio in Acad. Upsaliensi Botanices Professore publico, nomen indere volui, nec non a Beato patre ejusdem nominis et muneris, qvi qvantum Botanicem locupletarunt, patet ex Hujus horto Upsaliensi, Illius autem methodo singulari in Diss. de fundament: pl: notitia proposita; peregrinatione historiæ naturalis ergo in Lapponiam instituta; catalogo pl. laponicarum in Act: lit: Svec: 1720 exhibito; nec non vastissimo ipso opere Botanico Camporum Elysæorum.

399. CYANUS foliis inferioribus laciniatis, superioribus integris, annuus.

Floribus maxime varians.

α. Cyanus segetum atro-purpurascente flore. *Vail:* 4.

β. Cyanus flore rubro. *Tourn:* 446.

γ. Cyanus radio albo, disco carneo.

δ. Cyanus radio albo, disco coeruleo. Cyanus segetum, disco coeruleo cum corona candida. *Tourn:* 446.

400. CYANUS foliis omnibus laciniatis.

α. Fl: luteis: Cyanus floridus, odoratus, turcicus s. orientalis major, flore luteo. *Tourn:* 446. Amberboi flore luteo, odorato. *Vaill. Ac. R. sc:* 1719 p. 230.

β. Fl: coeruleis: Cyanus florid: odorat: turcicus s. orient: major, flore coeruleo. *Tourn.*

401. CYANUS foliis integris, perennis. Cyanus montanus, latifolius vel Verbasculum Cyanoides. *C. B:* 273. *Tourn:* 445. Cyanus major. *Dod:* 250. Cyanus montanus, perennis, latifolius, flore grandi. *Moris:* III. s. 7. t. 25. f. 1.

---

399. Centaurea Cyanus L: *Spec. Pl.* I. 911. II. 1289. **400.** C. moschata L: *Spec. Pl.* I. 909, II. 1286, H. 271. 5. **401.** C. montana L: *Spec. Pl.* I. 911, II. 1289; H. 270. 1.

§. CONJUGIUM IMPURUM NECESSARIUM.

402. TARCHON foliis integris. Abrotanum Lini folio, acriore, odorato. *Tourn:* 459, Draco hortensis. *C. B:* 98. Draco herba. *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. Dragnællus. *Matth:* 410. Dragun.

403. TARCHON foliis multifidis. Absinthium ponticum, tenuifolium, incanum. *C. B:* 138. *Tourn:* 457. Absinthium tenuifolium. *Dod:* 24. Absinthium ponticum. *Matth:* 465. Romersk mahlört.

Class. XX. GYNANDRIA.

§. DIANDRIA.

Exemp: Orchis, Satyrium. iisque affinia.

§. HEXANDRIA.

404. ARISTOLOCHIA clematitis recta. *C. B:* 307. *Tourn:* 162. *Moris:* III. p. 509: s. 12. t. 17. f. 5. Aristolochia multiflora. *Riv: mon: irr:* I. tab. 116. Aristolochia saracenica. *Dod:* 324.

§. POLYANDRIA.

405. ARUM vulgare. *C. B:* 195 Arum vulgare non maculatum. *Tourn:* 158. Arum. *Riv: irr: mon:* I. tab. 124.

Class. XXI. MONOECIA.

§. TRIANDRIA.

406. MAYS spicis seminiferis, simplicibus. Mays granis aureis. *Tourn:* 531. *Mont:* 23. Frumentum indicum, Mays dictum. *C. B:* 25. Frumentum indicum. *Matth:* 305. Turkiskt hwete.

Exemp: Carex.

---

402. Artemis Dracunculus L: *Spec. Pl.* I. 849, II. 1189; H. 256. **403.** A. pontica L: *Spec. Pl.* I. 847, II. 1187; H. 257. 3. **404.** Aristolochia clematitis L: *Spec. Pl.* I. 962, 1364; H. 279. **405.** Arum maculatum L: *Spec. Pl.* I. 966, II. 1370; H. 279. **406.** Zea Mays L: *Spec. Pl.* I. 971, II. 1378; H. 281.

§. **TETRANDRIA.**

407. BUXUS arborescens*. *C. B:* 471. *Tourn:* 578. Buxus. *Dod:* 782. *Matth:* 151. *S. Paul:* 34.

408. BUXUS foliis rotundioribus. *C. B. Tourn.* Chamæpyxos. *Tabern:* III. 141. Buxbaum.

α. Margine foliorum lutea: Buxus minor, foliis per limbum aureis. *Tourn:* 579.

409. URTICA fructu in globos digesto. Urtica pilulifera, folio profundius Urticæ majoris in modum serrato, semine magno Lini. *Raj. s:* 140. Urtica urens pilulas ferens, I Dioscoridis, semine Lini. *C. B:* 232. *Tourn:* 535. Urtica urens prior. *Dod:* 151. Urtica prima. *Matth:* 707.

Exemp: Alnus.

§. **PENTANDRIA.**

410. AMARANTHUS spiris florum ad terram usque propendentibus. Amaranthus maximus, semine rubello, qvi granis rubris Petri Ciceæ. *C. B:* 121. *Tourn:* 235. Blitum paniculis propendentibus, semine rubro. *Volck:* 66. Tusenskiön.

410½. AMARANTHUS variegatus, colore hilariori, qvæ foemina. *C. B. Tourn:* 236.

§. **OCTANDRIA.**

Exemp: Myriophyllum.

§. **DECANDRIA.**

Exemp: Coriaria.

§. **POLYANDRIA.**

411. RICINUS vulgaris. *Tourn:* 532. *C. B:* 432. Ricinus. *Matth:* 771.

412. PINUS sativa*. *C. B:* 491. *Tourn:* 585.

Exemp: Qvercus, Sagittaria.

407—408. Buxus sempervirens L: *Spec. Pl.* I. 983, II. 1394; H. 283. **409.** Urtica pilulifera L: *Spec. Pl.* I. 983, II. 1395; H. 282. 2. **410.** Amaranthus caudatus L: *Spec. Pl.* I. 990, II. 406; H. 285. **410½.** A. tricolor L: *Spec. Pl.* I. 989, II. 1043; H. 286. 3. **411.** Ricinus communis L: *Spec. Pl.* I. 1007, II. 1430; H. 289. **412.** Pinus Pinea L: *Spec. Pl.* I. 1000, II. 1419; H. 288.

§. ADELPHIA.

413. CUCUMIS sativus vulgaris, maturo fructu subluteo. *C. B:* 310. *Tourn:* 104. Cucumis vulgaris. *Dod:* 651. Gurka.

414. MELO vulgaris. *C. B:* 310. *Tabern:* 104. Melo s. Melopepo vulgaris, Cucumis Galeni. *Dod:* 652. Melon.

415. PEPO oblongus. *C. B:* 311. *Tourn:* 105. Pepo major, oblongus. *Dod:* 654. Pompa.

416. CUCURBITA longa, folio molli, flore albo. *J. B:* II. 214. Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli. *C. B:* 313.

417. MOMORDICA vulgaris. *Tourn:* 103. Balsamina. *Matth:* 97. Balsamina rotundifolia, repens s. mas. *C. B:* 306.

418. BRYONIA aspera s. alba, baccis nigris. *C. B:* 297. *Tourn:* 102. Bryonia alba, baccis nigris. *S. Paul:* 30. Vitis alba. *Matth:* 791.

In Scania prope Londinum ubique in sepibus.

Flores masculini a foemininis in eadem planta remoti sunt, non autem in diversa, ut alii volunt.

§. SYNGENESIA.

Exemp: Xanthium, Ambrosia.

Class. XXII. DIOECIA.

§. TETRANDRIA.

Exemp: Urtica, Lentiscus.

§. PENTANDRIA.

419. SPINACIA mas. Spinacia vulgaris sterilis. *Tourn:* 533. Lapathum hortense s. Spinacia sterilis. *C. B:* 115.

420. FOEMINA fructu aculeato. Spinacia vulgaris, capsula seminis aculeata. *Tourn:* Lapathum hort. s. Spinacia, semine spinoso. *C. B.* Lapathum hort. *Munt. Brit:* p. 263. fol. 59.

---

413. Cucumis sativus L: *Spec. Pl.* I. 1012, II. 1437; H. 292. 1. **414.** C. Melo L: *Spec. Pl.* I. 1011, II. 1436; H. 292. 2. **415.** Cucurbita Pepo *β* L: *Spec. Pl.* I. 1010, II. 1435; H. 291. 2. **416.** C. lagenaria L: *Spec. Pl.* I. 1010, II. 1434; H. 291. 1. **417.** Momordica Balsamina L: *Spec. Pl.* I. 1009, II. 1433; H. 293. 1. **418.** Bryonia alba L: *Spec. Pl.* I. 1012, II. 1438. **419—421.** Spinacia oleracea L: *Spec. Pl.* I. 1027, II. 1456; H. 296.

421. FOEMINA fructo obtuso. Spinacia vulgaris, capsula foeminæ non aculeata. *Tourn.* Lapathum hort. s. Spinacia sem. non spinoso. *C. B.* Spinat.

422. CANNABIS mas. Cannabis foemina. *J. B:* III. 447. Cannabis erratica. *C. B:* 320. *Tourn:* 535.

423. CANNABIS foemina. Cannabis mas. *J. B:* III. 447. Cannabis erratica. *C. B. Tourn.* Hampa.

424. LUPULUS mas. Lupulus foemina. *C. B:* 298. *Tourn:* 535.

425. LUPULUS foemina, strobilis albis. Lupulus mas. *C. B. Tourn.* Convolvulus perennis, heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliaceis, strobili instar. *Moris:* II. p. 37.

426. LUPULUS foemina, strobilis rufescentibus. Variatio hæc strobilos minores, sed copiosiores, segniusque maturescentes profert. Humbla.

§. HEXANDRIA.

427. ACETOSA foliis oblongis basi aperta. Acetosa hispanica maxima. *Munt: brit:* p. 225. fol. 213. Ab hac cultura tantum differre puto Acetosam pratensem. *C. B:* 114.

§. OCTANDRIA.

428. LAURUS vulgaris*. *C. B:* 460. *Tourn:* 597. *mas et foemina.* Laurus mas et foemina. *Tabern. icon:* 950. Lager.

429. LAURUS latifolia mas et foemina*. *Tabern:* III. 44. Laurus latifolia *πλατυτερα* Dioscoridis *C. B. Tourn.*

430. LAURUS vulgaris, folio undulato*. *H. R. P. mas.* Laur: vulg: folio undulato, foemina. *H. R. P.*

431. POPULUS foliis laciniatis, mas et foemina*. Populus alba, majoribus foliis. *C. B:* 429. *Tourn:* 592.

432. POPULUS foliis rhombo similibus, mas et foemina*. Populus nigra. *C. B. Tourn.*

§. DODECANDRIA.

433. MERCURIALIS foliis integris, caule ramoso.

α. Mas: Mercurialis spicata s. foemina Dioscoridis et Plinii. *C. B:* 121. *Tourn:* 534. Mercurialis foemina. *S. Paul:* 293.

422—423. Cannabis sativa L: *Spec. Pl.* I. 1027, II. 1457; H. 297. **424—426.** Humulus Lupulus L: *Spec. Pl.* I. 1028, II. 1457. **427.** Rumex Acetosa L: *Spec. Pl.* I. 338, II. 481; H. 90. 6. **428—430.** Laurus nobilis L: *Spec. Pl.* I. 369, II. 529; H. 98. **431.** Populus alba L: *Spec. Pl.* I. 1034, II. 1463. **432.** P. nigra L: *Spec. Pl.* I. 1034, II. 1464. **433—434.** Mercurialis annua L: *Spec. Pl.* I. 1035, II. 1465; H. 298.

434. *β. Foemina:* Mercurialis testiculata s: mas Dioscoridis et Plinii. *C. B:* 121. *Tourn:* 534. Mercurialis mas. *S. Paul:* 292.

435. MERCURIALIS foliis integris, caule simplici.

α. Mas: Mercurialis montana, spicata. *C. B:* 122. *Tourn:* 534. Mercurialis sylvestris foemina. *Tabern:* II. 256.

436. *β. Foemina:* Mercurialis montana, testiculata. *C. B. Tourn.* Mercurialis sylvestris mas. *Tabern:* II. 255. Cynocrambe. *Matth:* 798.

Species antecedens annua est, hæc vero perennis; illa exotica est, hæc autem in Scania occurrit. Hujus mas in hortis nostris viduus est, foemina enim temporum infortunio obiit sine prole.

§. POLYANDRIA.

437. JUNIPERUS foliis sibi ad basin incumbentibus*.

α. Mas: Sabina folio Tamarisci. *C. B:* 487. Sabina sine baccis. *Matth:* 107.

438. *β. Foemina:* Sabina folio Cupressi. *C. B.*

Class. XXIII. MECHÉA.

§. MONOECIA & ADULTERI.

439. CORYLUS sativa, fructu albo minore s: vulgaris. *C. B:* 417. *Tourn:* 581. Lambertiskt Hasselträd.

440. VERATRUM flore subviridi. *Tourn:* 273. Helleborus albus, flore subviridi. *C. B:* 186. *Moris:* III. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1. Elleborum album. *Matth:* 755. Hwit prustrot.

441. CITRUS petiolis foliorum cordiformibus, fructu subrotundo umbilico prominente.*. Citreum vulgare. *Tourn:* 621. Malus medica. *C. B:* 435. *Dod:* 779. Citronträd.

442. CITRUS petiolis foliorum marginatis, fructu globoso*. Aplesin.

443. CITRUS petiolis foliorum simplicibus, fructu globoso. Aurantium acri medulla, vulgare. *Tourn:* 620. Aurantia mala. *Matth:* 186.

435—436. M. perennis L: *Spec. Pl.* I. 1035, II. 1465. **437—438.** Juniperus Sabina L: *Spec. Pl.* I. 1039, II. 1472; H. 299. 1. **439.** Corylus Avellana *β* L: *Spec. Pl.* I. 998, II. 1417; H. 286. **440.** Veratrum album L: *Spec. Pl.* I. 1044, II. 1479. **441.** Citrus Medica L: *Spec. Pl.* I. 782, II. 1100; H. 236. 1. **442.** C. Aurantium *β* sinensis L: *Spec. Pl.* I. 783, II. 1101; H. 236. 3. *β*. **443.** C. Aurantium L: *Spec. Pl.* I. 782, II. 1100; H. 236. 2. *α*.

Malus Aurantia major. *C. B:* 436. Malus Aurantia. *Dod:* 780. Pomerantzträd.

Moechea et Cryptogamia.

§. MONOECIA β SCORTA.

444. ATRIPLEX erecta, foliis triangularibus.

α. Pallide virens: Atriplex hortensis alba s. pallide virens. *C. B:* 119. *Tourn:* 505.

β. Rufescens: Atriplex hortensis rubra. *C. B. Tourn.*

445. PARIETARIA perennis, foliis acuminatis. Parietaria officinarum et Dioscoridis. *C. B:* 121. *Tourn:* 509. Parietaria. *Dod:* 102. *Tabern:* II. 252.

§. DIOECIA α ADULTERI.

Exemp: Fraxinus.

Class. XXIV. CRYPTOGAMIA.

446. FICUS communis*. *C. B:* 457. Ficus. *J. B:* I. 128.

447. FICUS humilis*. *C. B:* 457. *Tourn:* 663. *Dill: Nov: gen: app.* 163. *ubi character.* Ficus. *Matth:* 211. Fikonträd.

Exemp: Musci et Fungi.

448. ANANAS aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea. *Plum:* 653. Carduus brasilianus, foliis Aloës. *C. B:* 384.

In Horto Ulriksdahl floruit 1729 mense Majo et fructum maturavit Octobri, curante Hortulano curioso Wolmero.

449. SEMPERVIVUM surculis cauliferis, ventricosis. Sempervivum arborescens. *Rupp:* 132. Sedum majus, arborescens. *J. B:* III. 686. *C. B:* 282.

In Horto Piperiano.

450. RIPHES foliis glabris, petiolis spinosis*. Chamæriphes foliis flabelliformibus. *Pont.* Chamæriphes. *Dod:* 820. Palma minor. *C. B:*

---

444. Atriplex hortensis L: *Spec. Pl.* I. 1053, II. 1493; H. 303. 1. **445.** Parietaria officinalis L: *Spec. Pl.* I. 1052, II. 1492; H. 302. **446—447.** Ficus Carica L: *Spec. Pl.* I. 1059, II. 1513; H. 305. **448.** Bromelia Ananas L: *Spec. Pl.* I. 285, II. 408; H. 73. 1. **449.** Sempervivum arboreum L: *Spec. Pl.* I. 464, II. 664; H. 118. **450.** Chamærops humilis L: *Spec. Pl.* I. 1187, II. 1657.

506. Palma humilis dactylifera, radice repente, sobolifera, folio flabelliformi, pedunculo spinoso. *Boerh:* II. 169.

In Horto Ulriksdahl. Liten Palm.

451. CERATONIA*. *H. L. B. Dod:* 787. Siliqva edulis. *C. B:* 402. *Tourn.* Siliqva dulcis officinis. Johannis Bröd.

[Pent. Monog. och Appendix i Leufsta ex.]

452. PALIURUS*. *Dod:* 756. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso. *C. B:* 477. Rhamnus s. Paliurus folio jujubino. *J. B:* I. 35.

In Horto Piperiano.

APPENDIX.

453. FAGOPYRUM erectum. Fagopyrum vulgare erectum. *Tourn:* 511. Erysimum Theophrasti, folio hederaceo. *C. B:* 27. Frumentum saracenicum. *Matth:* 305. Bohwete.

[Octandria Trigynia i Leufsta ex.].

In campis maxima cum copia qvotannis seritur.

454. CANNACORUS latifolius vulgaris. *Tourn:* 367. Arundo indica, latifolia. *C. B:* 19.

[Triandria Monog. i Ifwetofta ex.]

455. THUYA*. Thuya Theophrasti. *C. B:* 488. *Tourn:* 587. Arbor vitæ s. Paradisiaca vulgo dicta ad Sabinam accedens. *J. B:* I. 126.

456. CEDRUS folio Cupressi major, fructu flavescente. *C. B:* 487. *Tourn:* 588. Oxycedrus Lycia. *Dod:* 853. Ceder.

457. CUPRESSUS mas ramos extra se spargens. *Tourn:* 587. *C. B:* 488. Cupressus. *Matth:* 119.

458. CUPRESSUS meta in fastigium convoluta, qvæ foemina. *C. B:* 488. *Tourn:* 587.

[Dioecia Tetrandria i Leufsta ex.]

459. LENTISCUS vulgaris. *C. B:* 399. *Tourn:* 580. Lentiscus. *Matth:* 94. *Dod:* 859.

460. JUGLANS foliis integris. Nux juglans s. regia vulgaris. *C. B:* 417. *Tourn:* 581. Nux juglans. *Matth:* 202. Wallnöt.

---

451. Ceratonia Siliqva L: *Spec. Pl.* I. 1026, II. 1513; H. 296. **452.** Rhamnus Paliurus L: *Spec. Pl.* I. 194, II. 281; H. 46. **453.** Polygonum Fagopyrum L: *Spec. Pl.* I. 364, II. 522; H. 96. **454.** Canna indica L: *Spec. Pl.* I. 1, II. 1; H. 1. **455.** Thuja occidentalis L: *Spec. Pl.* I. 1002, II. 1421; H. 289. 1. **456.** Juniperus phoenicea L: *Spec. Pl.* I. 1040, II. 1471. **457—458.** Cupressus sempervirens L: *Spec. Pl.* I. 1002, II. 1422; H. 288. **459.** Pistacia Lentiscus L: *Spec. Pl.* I. 1026, II. 1455; H. 296. **460.** Juglans regia L: *Spec. Pl.* I. 997, II. 1415; H. 286.

461. FAGUS floribus masculinis in capitula globosa collectis*. Fagus. *Dod:* 832. *C. B:* 419. *Matth:* 160. *Tourn:* 584.

In Smolandia et Scania vastissimas constituit sylvas, heic tantum in hortis conspicitur.

462. FAGUS floribus masculinis in capitula cyllindracea collectis. Castanea sativa. *C. B:* 418. *Tourn:* 584. Kastanieträd.

463. MORUS fructu nigro*. *C. B:* 459. *Tourn:* 581. Mullbärsträd.

[Dioecia Tetrandria i Leufsta ex.]

464. CARPINUS*. *Matth:* 122. *Dod:* 829. *Tourn:* 583. Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis. *C. B:* 427. Aceris cognata foliis oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedentibus, vasculis disjunctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis oppositis, plurimis, confertis. *Pluk. Alm:* 7.

In Scania sponte.

465. OLEA sativa*. *C. B:* 472. Olieträd.

466. ELEAGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo, olivæformi, subdulci*. *Tourn: coroll:* 53. Eleagnus. *Camer. epit:* p. 106. fig. Olea sylvestris, folio molli, incano. *C. B:* 472.

467. PUNICA, qvæ malum granatum fert*. *Tourn:* 636. Malus punica sativa. *C. B:* 438.

468. RHUS foliis pennatis, foliolis oblongis, acutis, utrinque glabris*.

[Pentandria Trigynia i Leufsta ex.]

Rhus canadensis, folio longiori, utrinque glabro. *Tourn:* 611. Rhus angustifolium. *C. B:* 414. Sumach angustifolium. *Prod:* 158.

Plantam hanc a *Bursero* accepit C. Bauhinus, ut in prodromo fatetur. *Burserus* in Herbario XX. 77 dicit se hanc nostram misisse *Bauhino* sub nomine prædicto. Synonymon autem *Tournefortii* in se clarum est.

S. D. G.

469. MELOCACTUS americana minor. *Boerh:* 83. Melocactus minor et lactescens. *Rupp:* 41. Melo-carduus mammillaris, minimus, sessilis, uberior, spinulis imbecillioribus donatus. *Moris:* III. 171.

---

461. Fagus sylvatica L: *Spec. Pl.* I. 998, II. 1416. **462.** F. Castanea β L: *Spec. Pl.* I. 997, II. 1416; H. 287. **463.** Morus nigra L: *Spec. Pl.* I. 986, II. 1398; H. 283. 1. **464.** Carpinus Betulus L: *Spec. Pl.* I. 998, II. 1416. **465.** Olea europæa L: *Spec. Pl.* I. 8, II. 11. **466.** Eleagnus angustifolia L: *Spec. Pl.* I. 121, II. 171; H. 31. **467.** Punica Granatum L: *Spec. Pl.* I. 472, II. 676; H. 122. **468.** Rhus glabra L: *Spec. Pl.* I. 265, II. 380. **469.**? Cactus mammillaris L: *Spec. Pl.* I. 466, II. 666; H. 119. 1.



Hortus academicus Upsaliensis cum suis areis quarum maxima Z.N.A.A. insignita planta, in Adonide recensenda, instructa est secundum ordinem per numeros. Traditum, de quo ~~pauca~~ infra

Orig. Storlek. Fotolit. G.L.A.

CAROLI LINNÆI

SVECI

ADONIS UPLANDICUS

SIVE

HORTUS UPLANDICUS,

IN QVO PLANTÆ FERE OMNES, QVÆ IN VARIIS HORTIS ET AGRIS UPLANDIÆ, IMPRIMIS AUTEM IN HORTO BOTANICO UPSALIENSI SERUNTUR, CONTINENTUR. SECUNDUM METHODUM PLANTARUM SEXUALEM IN ORDINEM REDACTÆ, QVA PLANTÆ IN CERTAS CLASSES ET SECTIONES DISTRIBUUNTUR, NOMINIBUSQVE SPECIFICIS NOVIS ET VERIS INSIGNIUNTUR.

TANTUS AMOR FLORUM!

ILLUSTRISSIMÆ

SOCIETATI

LITERARIAE ET SCIENTIARUM

REGIAE

D. D. D.

AUCTOR.

L. B. S.

Cum Botanicas prælectiones et demonstrationes publicas per aliqvot annos, ex consensu Nobiliss: et Generos: D. D. Ol. Rudbeck Fil. Anat: et Botan: p. p., in Horto Academico Upsaliensi proposuerim, a multis monitus sum, ut catalogum plantarum, ibidem reperiundarum, conscriberem. Sic enim Discentes *βοτανόφιλοι* labore illo levarentur, qvo hactenus unamqvamqve herbam sub dio celeri manu in charta notare necesse habuerunt, qvod tamen sine defectu nominis fieri vix potuit; petitis itaqve eorum annuens praesentem catalogum conscripsi.

In hoc catalogo non tantum enumeravi omnes plantas exoticas in Horto Academico Upsaliensi jam reperiundas, verum etiam eas, qvas in diversis Hortis circa Upsaliam et Stockholmiam observavi; qvæ cum exacte conveniant cum stirpibus in Hortis Lundinensibus Scanorum a me visis, inserviat hic catalogus tam Studiosis Lundinensibus qvam Upsaliensibus, imo etiam unicuiqve hortum aliqvem Magnatum ingredienti.

Et qvoniam nulla *Methodus* hactenus usu recepta mihi arrisit, *propriam*, nuperqve a staminibus et pistillis elaboratam secutus sum, qvam propediem v. D. sub nomine *Nuptiæ Plantarum* publicæ luci dare animus est.

Secundum hanc meam methodum etiam plantas in Horto Academico Upsaliensi, antea confuse mixtas, disposui, ita ut qvilibet plantam sibi ignotam primo intuitu ibidem reperiat.

Nomina aliqvot *specifica nova* plantis indidi, qvæ ab omnibus aliis, heic repertis, sive sint hortenses, sive sylvestres discernuntur.

Variationes pro diuersis speciebus, cum vulgo Botanicorum, non habui, sed eas minusculis literis et lineola — — — notatis sub sua planta addidi, ita ut lineola — — — nomen genericum . . . . . puncta autem specificum antecedens indicant.

Arbores ab herbis separare nolui, sed in gratiam tyronum * asterisco notavi, qvo facilius eas [arbores] dignoscant.

Sylvestres plantas, in horto sæpe translatas, frustra in hoc catalogo qværit Lector, eas enim consulto omisi, qvandoqvidem Max: Rev: D:nus Ol. Celsius S. S. Th. Doct. et Prof. P. in FLORA UPLANDICA, brevi publicanda, illas omnes enumerat.

Circa *Synonyma Casp: Bauhinum* in *Pinace* semper citavi, apud qvem tyrones omnes auctores, qvi ante ipsum scripserunt, qværant. Tournefortium propter characteres genericos, *Dodonæum* vero, *Tabernæmontanum* et *Matthiolum* propter figuras addixi.

Si comperiar hæcce grata fore Lectori, a me, si Deus vitam viresqve largiatur, exspectet.

I. FUNDAMENTA BOTANICA 8:vo in qvorum
Tom. 1. *Bibliothecam Botanicam* methodice digestam.
2. *Systemata Botanica* omnia contracta.
3. *Physiologiam Plantarum.*
4. *Reqvisita Generica* et *Classica.*
5. *Nomina Generica*, *Specifica* et *Variantia.*
6. *Descriptiones Plantarum* recte tradendi *Methodum.*
7. *Characteres Plantarum Universales* tradam.

II. ORNITHOLOGIAM SVECANAM cum nova methodo.

III. METHODUM NOVAM NATURALEM QUADRUPEDUM.

IV. INSECTA UPLANDICA methodice digesta.

Ubiqve brevitati litare studui, qvo libellus gratior acceptiorqve fieret.

Vale L. B. et fave ausis.
Upsaliæ 1731 Maji 13 styl: vet:
æt: 24.

CAROLUS LINNÆUS.

Explicatio nominum auctorum abbreviatorum.

Botanicis paucis, iisqve vulgatissimis, fui contentus, ne tyrones multitudine deterrerentur, utpote

Besl: Besleri Hortus Eystettensis. Norimb. 1613 fol: Reg. *fig.*
Breyn: Breynii Prodromus. Ged: 1689 4:to.
C. B: Casp: Bauhini Pinax. Bas. 1681 [(ed. I) 1623 ed. II. 1671] 4:to. *Synonyma.*
Corn: Cornuti Hist: pl: Canadensium. Par: 1635. 4:to.
Dill: Cat: pl: [*Dillenii* Catalogus plantarum] Gissentium. Francof. 1719 8:vo.
Dill: n: pl: g: [Nova plantarum genera] ibidem in appendice.
Dod: [*Dodonaei*] Pemptades Stirpium. [Antverpiæ 1583 & 1616. fol.]
Franc: Franckenii Speculum Botanic: Renovat: Ups 1659. 4:to.
H. L. B: Hermanni Hortus Lugduno-Batavus. Lugdb. 1687. 8:o.
J. B: Johannis Bauhini Historia Plant. Ebr. 1650 & 1651. 4:to. tom 3.
Matth: Matthioli Commentarii. Venet. 1570 fol. *figuræ.*
Mont: Monti Prodromus stirp: agri Bononiensis. Bon. 1719. 4:to.
Moris: Morison Historia pl. universalis tom. 2 & 3. Oxonii 1680 & 1699. fol.
Paul: Sim. Pauli Flora Danica. Haff. 1648. 4:to. figuræ.
Prodr: Casp. Bauhini Prodromus [ed. II]. Basel 1671. 4:to.
Reneal: Renealme Specimen histor: plant: Paris 1711 [1611]. 4:to.
Rudb: Rudbeck pater Hortus Botanicus [ed. III]. Ups. 1685. 8:vo. *Nomina svetica.*
Rudb: Act: *Rudbeck* fil. Index pl. Laponicarum. Act. lit. sv. 1720.
Rudb: Camp. El. *Rudbeck* [pater et filius] Campi Elysæi. Tom. 2:dus. Ups. 1701 [fol.]
Rudb: Jacob Rudbeck [pater] Deliciæ Vallis Jacobææ. [Ups.] 1666. 12:mo.
Rup: Ruppii Flora Jenensis [(ed. I)] Francof. 1718. 8:vo [ed. II. 1726].
Swert: Swertii Florilegium. Amst. 1647. fol.

Tabern: [*Tabernæmontani*] Historia plant. Francof. 1613 [1625] fol. germ. *figur.*
Tourn: *Tournefortii* Institutiones [Rei Herbariæ]. Paris. 1700. 4:to [tom. I—III]. Character.
Till: *Tillands* Cat: pl: circa Aboam. Ab: 1683. 8:vo. fig.
Vaill: *Vaillant* Botanicum Parisiense. Leid. 1727. fol.
Vaill: Ac. Reg: [*Vaillant*] Acad: Reg: Sc: [Paris] 1718. 1719. 1720.
Volck: *Volckameri* Flora Norimbergensis. [Norimbergæ 1700. 4:to] Reliqvas rarissime l. numqvam allegavi.

Catalogus Hortorum,

e quibus Plantas enumerandas collegi.

I. UPLANDIA
- A. *Upsaliæ*
  1. Hortus Botanicus Academicus.
  2. Hortus Regius s. Arcis.
  3. Hortus *Celsianus.*
  4. Hortus Pharmaceuticus.
- B. *Holmiæ*
  5. Hortus Jacobinus Regius wid S. Jacob.
  6. Hortus Carlbergensis Regius. (Carlberg).
  7. Hortus Vallis *Ulricæ* Regius. (Ulriksdahl.) Olim Vallis Jacobæa.
  8. Hortus Drottningholmensis Regius.
  9. Hortus *Piperianus* på Kungsholmen.
  10. Hortus *Warmholtzianus* på Söder-Malm.
  11. Hortus *Golnitzianus* på Norr-Malm.
  12. Hortus *Alichianus* ibid.
  13. Hortus *Ingemarianus.* Ingemarshof.
  14. Hortus Hornbergensis.
- C. *Roslagia*
  15. Hortus Löfstadiensis.
  16. Hortus Wäsbyensis.

II. SMOLANDIA
  17. Hortus Stenbrohultensis charis. patris.

III. SCANIA

18. Hortus Botanic: Acad: Lundensis.
19. Hortus *Aschenbergianus.* Hwitsiöfle.
20. Horti varii Malmogiæ.
21. Horti varii Christianstadii.

Approbatio.

HORTUM UPLANDICUM, qvem Clarissimus et in re Botanica Versatissimus Auctor D:n. Carolus Linnæus, præsentibus Societatis Regiæ Literariæ et Scientiarum Membris, d. 19 Maji An. 1731 exhibuit, a Nobilissimo et Celeberrimo Anat: et Botanices Professore D:no Olavo Rudbeck Filio esse perlectum et communi applausu Societatis approbatum, testatur.

Ups. d. 20 Juni 1731.

ANDREAS CELSIUS.
Soc. Lit. et Sc. Reg Secretar.

Schema,

cujus ductum in demonstrandis plantis in Horto Academico Upsaliensi seqvutus sum.

1. *Nomen:* *α.* genuinum genericum et specificum.
   β. Synonyma C. B: et Systematicorum recentiorum.
   γ. —— veterum diversa.
   δ. Sveticum.
2. *Ethymologia:* nominum omnium (: 1 :).
3. *Classes, Sectiones:* *α.* *Cæsalp: Morison: Raj: Hermanni, Boerhaavi.*
   β. *Rivini, Knautii, Tournef:* Nostr.
   γ. Particular: ut *Vaill: Ponted: Sirballi, Dillenii, Raj.*
4. *Charact: generic:* *α.* *Tournef:* et Methodicorum reliqvorum.
   β. Noster character universalis et naturalis.
   γ. Hallucinationes Methodicorum in genere.
5. *Species.* Svecia qvot sylvestres et hortenses.
   Differentia in nomine specific: (: 1 :) explicatur.

6. *Descriptio* α. secund: R. A: completa et naturalis.
β. specialis. Curiosum in structura.
γ. Inventor.
7. *Locus natalis* α. Elevatio poli.
β. Regionis.
γ. Soli.
8. *Tempus florendi* α. Mensis.
β. Dies.
9. *Cultura* α. Specialis.
β. Duratio.
γ. Luxuriationes.
10. *Usus* α. Medic: a. Officinal. Partes, qvæ asservantur.
b. —— Praeparata, qvæ ex hoc conficiuntur.
c. ——— Composita, qvæ ingrediuntur.
d. Operandi modus ex qvibus principiis.
e. Vires selectissimæ in morbis qvibus.
f. ——— falso attributæ.
g. Exhibendi modus: pulvere, R, spirit. etc.
h. —— dosis.
i. ——— vehiculum.
k. —— cautela.
β. Chymicus c: principiis chymicis.
γ. Physicus.
δ. Oeconomicus et culinaris (Diæteticus).
11. *Tradita* α. Historiæ et Fabulæ curiosæ.
β. Poëtica.
γ. Superstitiosa, fraudes etc.

Divisio Methodi Nostræ.



Explicatio Methodi

in pagina antecedenti demonstratæ.

Stamina et *Pistilla* sunt vel

- nuda et visibilia, in
  - uno eodemque flore, ubi stamina sunt vel
    - distincta et separata
      - longitudine æqvalia vel inordinate inæqvalia, ubi vel
        - 1. stamen ..... 1.
        - 2. stamina ..... 2.
        - 3. stamina ..... 3.
        - 4. ..... 4.
        - 5. ..... 5.
        - 6. ..... 6.
        - 7. ..... 7.
        - 8. ..... 8.
        - 9. ..... 9.
        - 10. ..... 10.
        - 12. ..... 11.
        - 20. ..... 12.
        - plura stamina ..... 13.
      - Proportionaliter inæqvalia.
        - 2. longiora ..... 14.
        - 4. longiora ..... 15.
        - plura longiora ..... 16.
    - Cohærentia
      - staminibus
        - in 1 corpore ..... 17.
        - in 2 corporibus ..... 18.
      - Apicibus ..... 19.
      - staminibus et apicibus cum pistillo confuse mixtis ..... 20.
  - distincto et diverso flore, ubi
    - alii flores tantum stamina, alii autem tantum pistilla præbent, idque vel in
      - eadem planta ..... 21.
      - diversa planta ..... 22.
    - alii flores tantum stamina, vel tantum pistilla habent; alii utraque simul exhibent ..... 23.
- tecta et membrana abscondita s. involuta ..... 24.

NB. Monogynia, Digynia, Tetragynia etc. idem est ac pistillum unicum, geminum, qvaternum etc.

Classes in Systemate nostro Sexuali allegorice nominatæ.



Explicatio Methodi

in pagina præcedenti exhibitæ.

Stamina et *Pistilla* sunt vel

- visibilia in flore
  - uno eodemqve ubi stamina
    - distincta longitudine
      - æqvalita l. citra proportionem inæqvalia
        - Stamen unicum .... 1.
        - stamina duo ..... 2.
        - stamina tria..... 3.
        - stamina qvatuor ... 4.
        - stamina qvinqve ... 5.
        - stamina sex ..... 6.
        - stamina septem .... 7.
        - stamina octo ..... 8.
        - stamina novem ..... 9.
        - stamina decem ..... 10.
        - stamina duodecim .. 11.
        - stamina viginti ..... 12.
        - stamina plura ..... 13.
      - inæqvalia, proportionata
        - st: 2 reliqvis longior: 14.
        - st: 4 —— longiora 15.
    - coalita
      - staminibus tantum — st: coalita in unum 16. / duo .. 17.
      - apicibus tantum ..... 18.
      - apicibus et pistillis simul ..... 19.
  - distincto et diverso, ubi
    - fl: masculini et foeminini separati sunt in
      - eadem planta ..... 20.
      - diversa planta ..... 21.
    - flores androgyni et masculini l. foeminini in eadem specie ..... 22.
- inconspicua, nec oculis patentia, membrana l. capsula saepe involuta ..... 23.

Class. I. MONANDRIA.

Hujus classis plantæ nullæ in hortis nostris seruntur.

§. MONOGYNIA.

Exemp: Chara. Limnopeuce.

§. DIGYNIA.

Exemp: Corispermum *Juss:*

§. PENTAGYNIA.

Exemp: Aponogeton *Ponted.*

Class. II. DIANDRIA.

§. MONOGYNIA.

1. *SYRINGA foliis cordatis *Mihi.* Syringa coerulea *C. B:* 398. Synon. Syringa fl: coeruleo *Rudb:* Hort. Syringa lusitanica *Tabern:* III. 133. fig. Lilac. *Tourn:* 601. charact. Lillach *Dod:* 766. Calobotrychis: *Reneal:* 30 desc. [et fig.]. Blå wild Jasmin *Rudb:* H. 108. Syren vulgo.

2. *SYRINGA foliis lanceolatis, integris. Syringa Ligustri folio *Rup:* 24. Lilac Ligustri folio *Tourn:* 602.

3. SYRINGA foliis inferioribus lanceolatis, integris et superioribus laciniatis. Syringa laciniato folio *Rupp:* 24. Lilac laciniato folio *Tourn:* 602. Ligustrum foliis laciniatis. *C. B:* 476. *Prod:* 158. Agem lilac [lilag] persarum, laciniato [inciso] folio *Cornut:* 189. fig. descr. Jasminum persicum *Rudb:* H. 57. Persisk Jasmin *Rudb:* H. 58.

---

1. S. vulgaris Linné Species plantarum (ed. I. 1753) pag. 9, ed. II. (1762—63) pag. 11; Hortus Upsaliensis (1748) pag. 6. n. 1. **2.** S. persica L: Sp. pl. I. 9, II. 11; Hort. Ups. 6. 2. **3.** S. persica β laciniata L: Sp. II. 11; Hort. Ups. 6. 3.

4. *LIGUSTRUM *Matth:* 137. *Tourn:* 596. *Fuchs* 480. Ligustrum germanicum *C. B:* 475. Lig. vulgare *Rudb:* 65. Liguster *Rudb:* 66.

5. *JASMINUM foliis pinnatis, petalis acutis. Jasminum vulgatius, flore albo *C. B:* 397. *Tourn:* 597. Jasminum *Dod:* 405. Gelseminum [Gelsiminum] *Matth:* 75. Jasminum vulgare, fl. albo *Rudb:* H. 57. Gemen Jassmin *Rudb:* H. 58.

Petala qvotidie dejicit, non secus ac arbor tristis, qvas itaqve genere non inepte a *Commelino Fl. Mal:* conjunctas esse judico.

6. *JASMINUM hispanicum, flore majore, externe rubente *J. B:* II. 101. *Tourn:* 597. Jasminum humilius, magno flore *C. B:* 398. Gelsiminum catalonicum *Cam: Ept.* 37.

7. *JASMINUM humile, luteum *C. B:* 397. (Jasminum trifolium, foliis sparsis, petalis obtusis.) Jasminum s. Gelseminum luteum *J. B:* II. 102. *Tourn:* 597. Jasminum luteum *Lob:* ic: II. 106.

8. *JASMINUM luteum, vulgo dictum bacciferum *C. B:* 398. *Tourn:* 597. Trifolium fruticans qvibusdam, Polemonium flore luteo *J. B:* I. 134 [*J. Bauhini Hist.* I. 2. p. 374]. Trifolium fruticans *Dod:* 561.

9. *JASMINUM [GELSIMINUM] indicum, flavum, odoratissimum *Ferrar:* [*Cult. Florum* p. 393]. Westindisk Jassmin *Rudb:* H. 58.

10. *ADHATODA frutescens, petalorum labio superiori inflexo. Adhatoda Zeylanensium *H. L. B.* 643. fig. *Tourn:* 175. Ecbolium s. Adhatoda Zeylanensium *Pluck: phyt.* 173. 3. Ecbolium *Riv: irr. mon.* [tom. I. tab. 38.] Dictamni forte affinis, indica, arborescens, Lauri americani foliis s. Ecbolium Zeylanensium foliis Laurini *Breyn:* Prodr. 2. 41. Älskogs-tiufnad.

Exemp: Circæa, Veronica, Saururus, Lentibularia.

Class. III. TRIANDRIA.

§. MONOGYNIA.

11. VALERIANA foliis infimis integris, summis pennatim divisis. Valeriana hortensis, Phu folio Olusatri Dioscoridis. *C. B:* 164.

---

4. L. vulgare L: Sp. pl. I. 7, II. 10; saknas i Hort. Ups. **5.** J. officinale L: Sp. pl. I. 7, II. 9; Hort. Ups. 5. 1. **6.** J. grandiflorum L: Sp. pl. II. 9; saknas i Hort. Ups. **7.** J. humile L: Sp. pl: I. 7, II. 9; Hort. Ups. 5. 3. **8.** J. fruticans L: Sp. pl. I. 7, II. 9; Hort. Ups. 5. 4. **9.** J. odoratissimum L: Sp. pl. I. 7, II. 10; Hort. Ups. 5. 2. **10.** Justitica Adhatoda L: Sp. pl. I. 15, II. 20; Hort. Ups. 7. **11.** V. Phu L: Sp. pl. I. 32, II. 45; Hort. Ups. 13. 1.

Tourn: 132. Phu magnum. *Matth:* 34. *Fuchs:* 856. Valeriana vera s. Phu magnum *Rudb:* H. 115. Stor Walerian. Theriaksört *Rudb:* H. 116.

12. LACHANUM (Dichotoma). Locusta. *Rivin: irr: mon:* [I. tab. 6.] charact. fig. Valerianella arvensis, præcox, humilis, semine compresso. *Tourn:* 132. Valeriana campestris, inodora, major. *C. B:* 165. Olus album [Afbum Olus] *Dod:* 636. *Rudb:* H. 81. Winter Rapuntzel Hortulanis. Wårsalat *Rudb:* H. 82.

13. CROCUS autumnalis, flore purpureo *Rudb:* H. 33. Crocus sativus. *C. B:* 65. *Tourn:* 350. Crocus *Fuchs:* 441. *Lob:* ic. I. 137. Höstsafran med purpurblomma.

Pistillum hujus est qvod in officinis sub CROCI nomine divenditur.

14. CROCUS vernalis, foliis styliformibus, cujus variationes:

α. Petalo violaceo. Crocus vernus, angustifolius, magno flore. *C. B:* 67. *Tourn:* 352. Crocus vernus, fl: purpureo.

β. Petalo candido. Crocus vernus, angustifolius, magno flore, candido. *C. B:* 67. *Tourn:* 352. Crocus vernus, flore albo *Rudb:* H. 33.

γ. Petalo fulvo, striis coeruleis. Crocus vernus, angustifolius, variegatus. *C. B:* 67. *Tourn:* 353. Crocus vernus, aureus, veriegatus *Besler* [hyem. ord. 1. fol. 2. fig. III]. Crocus vernus, flore aureo, striis purpureis *Rudb:* H. 33. Wårsafran.

15. GLADIOLUS floribus homomallis. Gladiolus floribus uno versu dispositis, major et procerior. *C. B:* 41. *Tourn:* 365. Gladiolus *Rivin: irr: mon:* [I. tab. 110] character et fig. Gladiolus fl. purpureo *Rudb:* H. 47. Åcker lillior *Rudb:* H. 48.

16. IRIS hortensis, pallide coerulea *C: B:* 31. *Tourn:* 358. Iris dilute coerulea, inuolucro albo *Tabern:* ic. 647 [Hist. p. 359. fig. II]. Himmelsblå stora Swerds lillior.

17. IRIS vulgaris, germanica sive sylvestris. *C. B:* 30. *Tourn:* 358. Iris vulgaris, violacea, s. purpurea, [hortensis &] sylvestris. *J. B:* 11. 709. Iris hortensis latifolia *C. B:* 30 [31] *Tourn:* 358. Iris germanica *Fuchs:* 317. Iris latifolia, major, vulgaris, flore coeruleo, lab: purp. *Rudb:* 57. Gemen Swerds [Swärdz] lillia *Rudb:* 58.

---

12. V. Locusta *α* olitoria L: Sp. pl. I. 33, II. 47; Hort. Ups. 14. **13.** C. sativus *α* officinalis L: Sp. pl. I. 36, II. 50; Hort. Ups. 15. **14.** C. sativus *β* vernus L: Sp. pl. I. 36, II. 50; Hort. Ups. 15. **15.** G. communis L: Sp. pl. I. 36, II. 52; Hort. Ups. 16. **16.**? I. susiana L: Sp. pl. I. 38, II. 55 enl. C. Bauhini Pinax och L: Hort. Cliff.; saknas i Hort. Ups. **17.** I. germanica L: Sp. pl. I. 38, II. 55; Hort. Ups. 16. 1.

18. IRIS lutea variegata Camerarii. *C. B:* 32. *Tourn:* 360. Iris variegata ex luteo et purpureo. *Cam:* hort. 80. Gulbrokug Swerds lillia.

19. IRIS dalmatica major. *C. B:* 31. *Tourn:* 359. Iris dalmatica major, flore vulgari, minus violaceo. *J. B:* 2: 715.

20. IRIS petalis imberbibus, fructu trigono, apicibus petalorum ovatis, extrorsum latioribus. Iris pratensis, angustifolia, non foetida, altior. *C. B:* 32. *Tourn:* 361. *Rudb:* Camp. Elys. II [tom. I] p. 198. f. II. Iris tenuifolia, major, flore coeruleo et striato *J. B:* II. 727. Iris XI species prior *Clus:* pan. 253. Iris sylvestris, angustifolia, major *Tabern:* II. p. 341. Blåhwit smalbladig Swärds lillia *Rudb:* 60.

21. IRIS petalis imberbibus, fructu hexagono, apicibus petalorum ovatis, extrorsum acutioribus, caule rotundo. Iris pratensis, angustifolia, folio foetido. *C. B:* 32. *Tourn:* 360. Iris angustifolia 1. *Clus:* hist: 228. *Besl: æst: ord.* 3. fol. 4. fig. 3. Purpurblå smalbladig Swerds [Swärdz] *Rudb:* 60.

22. IRIS petalis imberbibus, fructu hexagono, caule ancipiti. Iris angustifolia, prunum redolens, minor *C. B:* 33. *Tourn:* 361. *Rudb:* Camp. Elys. II [I] p. 200. f. 9. Iris graminea, cui pereunt qvotannis folia. *J. B:* II. 727. Gräsbladig Swerds [Swärdz] lillia *Rudb:* 60.

23. CANNACORUS latifolius vulgaris *Tourn:* 367. Arundo indica, latifolia *C. B:* 19. Arundo indica, florida, Cannacorus qvorundam *Lob:* ic. [T. I tab.] 56. Indianisk Blommeröör *Rudb:* H. 22.

§. DIGYNIA.

24. SECALE

α. Vere satum. Secale vernum vel minus. *C. B:* 23. *Mont:* 4. syn. char. Rogga s. secale *Dod:* 470 [ed. 1583 p. 490, ed. 1616 p. 499]. Wåhr-Rogh.

In Uplandia raro, in Smolandia autem communiter seritur.

β. Autumno satum. Secale hybernum vel majus. *C. B:* 23. *Mont:* 3. Secale *Matth:* 311. Winter-Rogh. In agris Uplandicis ubiqve.

---

18. I. variegata L: Sp. pl. I. 38, II. 56; Hort. Ups. 16. 2. **19.**? I. sambucina L: Sp. pl. II. 55. **20.** I. sibirica L: Sp. pl. I. 49, II. 57; Hort. Ups. 17. 4. **21.** I. spuria L: Sp. pl. I. 39, II. 58; H. 17. 5. **22.** I. graminea L: Sp. pl. I. 39, II. 58; H. 17. 6. **23.** Canna indica L: Sp. pl. I. 1, II. 1; Hort. Ups. 1. **24.** S. cereale L: Sp. pl. I. 84, II. 124; H. 22.

25. TRITICUM spica mutica *Lob:* [Siligo spica mutica *Lob:* ic. I. tab. 25]. Triticum hybernum, aristis carens *C. B:* 21. *Mont:* 2. Triticum *Dod:* 480 [in ed 1583, p. 489 in ed. 1616]. Winterhwete. Hæc species in Uplandia communiter seritur.

26. TRITICUM spica multiplici *C. B:* 21. Triticum cum multiplici spica, glumas facile deponens *J. B:* II. 407.

27. TRITICUM aristatum, glumis hirsutis. Triticum typhinum simplici folliculo *C. B:* 29 [21]. Triticum cinereum, [cinericeum], maximis aristis donatum, triturando glumas deponens. *J. B:* II. 408. *Mont.* 2. Triticum aristatum, spica maxima, cinerea, [cinericea] glumis hirsutis *Raj.* S. 387.

28. HORDEUM spica hexasticha. (Hordeum spica hexagonoangulata.) Hordeum polystichum vernum. *C. B:* 22. *Mont:* 4. Hordeum. *Matth:* 306. Korn. In agris ubiqve.

29. HORDEUM spica disticha, granis cum gluma connatis. (Hordeum spica compressa.) Hordeum distichon. *C. B:* 23. *Dod:* 492. Oelandskorn. Heic rarius.

30. HORDEUM spica disticha, glumis grano adnatis. (Triticum spica angulata, aristata.) Triticum spica Hordei Londinensibus *Raj:* Syn. 387. *Mont:* 3. Hordeum nudum sive Gymnocrithon *J. B:* II. 430 descr. Zeopyrum sive Tritico-speltum *C. B:* 22. Zeopyron *Dod:* 486. Himmelskorn.

In agris inter ultimam speciem qvandoqve reperitur.

31. AVENA seminibus nigris. Avena nigra. *C. B:* 23. *Mont:* 6. Rarius.

—— seminibus albis. Avena vulgaris s. alba. *C. B:* 23. *Mont:* 6. Comuniter Hafre. Posterior variatio comuniter, prior rarissime heic reperitur.

32. PANICUM spica digitali. Panicum italicum seu panicula majore. *C. B:* 27. *Tourn:* 515. Panici indici spica. *Dod:* 498. Lille Hirs *Rudb:* H. 84.

33. MILIUM *J. B:* II. 446. Milium semine luteo vel albo *C. B:* 26. *Tourn:* 514. Milium *Fuchs:* 411. *Matth:* [p. 313]. Hvit [Hwijt] och gult hirs *Rudb:* H. 76.

---

25. T. hybernum L: Sp. pl. I. 86, II. 126; Hort. Ups. 21. 2. **27.** T. turgidum L: Sp. pl. I. 86. II. 126; Hort. Ups. 21. 3. **27.**? T. polonicum L: Sp. pl. II. 127, saknas i Sp. pl. (ed. I) och Hort. Ups. **28.** H. vulgare & hexastichon L: Sp. pl. I. 85, II. 125; Hort. Ups. 22. Dessa båda senare skilda arter sammanblandas här. **29 & 30.** H. distichon L: Sp. pl. I. 85, II. 125; Hort. Ups. 23. **31.** A. sativa L: Sp. pl. I. 79, II. 118; Hort. Ups. 20. **32.** P. italicum L: Sp; pl. I. 56, II. 83; Hort. Ups. 19. **33.** Panicum miliaceum L: Sp. pl. I. 58, II. 86; Hort. Ups. 20.

34. PHALARIS *J. B:* II. 442. *Tabern:* I. p. 534. Phalaris major, semine albo. *C. B:* 28. Gramen spicatum, semine miliaceo, albo. *Tourn:* 518. Canariefrö *Rudb.* H. 88.

35. GRAMEN paniculatum, aqvaticum, Phalaridis semine, folio variegato *Tourn:* 523. *Scheuchz:* Hist: 127 descr. Gramen paniculatum, folio variegato *C. B:* 3. Spanskt gräs [gräås] *Rudb:* H. 50.

Class. IV. TETRANDRIA.

§. MONOGYNIA.

36. ALCHYMILLA foliis qvinatis. (Alchymilla foliis digitatis.) Alchimilla alpina, Qvinqvefolii folio, subtus argenteo. *Tourn:* 508. Alchimilla [Alchymilla] alpina, folio sericeo, instar Pentaphylli profunde secto. *Rupp:* alt. 51. Alchimilla perennis, incana, argentea s. sericea, satinum provocans. *Volck:* 16. Tormentilla alpina, folio sericeo. *C. B:* 326. Alpinum petrosum et minimum Pentaphyllum *Lob:* ic. [T. I tab.] 691. Daggeört med delta blad.

37. PLANTAGO foliis cordato ovatis, spica foliosa. (Plantago spica foliosa, cujus foliola petalis multo longiora.) Plantago latifolia, rosea, floribus qvasi in spica dispositis *C. B:* 189. *Tourn:* 126. Plantago multiplex *Tabern:* II. 408. Rosen grobladh spessachtig [aktigh] *Rudb:* H. 92.

38. PLANTAGO cauliculis proliferis, diffusis, perianthio inæqvali. (Plantago ramosa, procumbens, foliis lanceolatis.) Psyllium majus erectum *C. B:* 191. *Tourn:* 128. Psyllium minus. *C. B:* 191. *Prodr:* 99. *Tourn:* 129. Pulicaris herba *Lob:* ic. t. 437 [436]. Psyllium *Dod:* 115. Loppefrö *Rudb:* H. 94.

A Plantagine genere plane non differt, conveniunt enim partes fructificationis omnes, præsertim petala et stamina, ab omnibus in universum floribus peculiari sua figura diversa.

39. CORNUS arborea, baccis oblongis. Cornus hortensis mas *C. B:* 447. *Tourn:* 641. Cornus *Matth:* 192. *S. Paul.* 2 c. fructu. *Besl.* hyem. fol. 9. [7 fig. III] c. flore. Cornellträd [trä] med hwijt frucht *Rudb:* H. 32.

---

34. Ph. canariensis L: Sp. pl. I. 54, II. 79; Hort. Ups. 19. **35.** Phalaris arundinacea β picta L: Sp. pl. I. 55, II. 80, saknas i Hort. Ups. **36.** Alchemilla alpina L: Sp. pl. I. 123, II. 179, saknas i Hort. Ups. **37.** P. major γ L: Sp. pl. I. 113, II. 163; Hort. Ups. 29. 3 β. **38.** P. Psyllium L: Sp. pl. I. 115; II. 167; Hort. Ups. 29. 2. **39.** C. mas β L: Sp. pl. I. 117, II. 171; Hort. Ups. 29.

40. *CORNUS arborea, baccis globosis. Cornus foemina *C. B:* 447. *Tourn:* 641. Ossea *Riv:* apud *Rupp:* 82. Virga sangvinea *Matth:* 192. [193]. *Dill:* n. pl. g. 145. Cornelle trä hon. *Rudb:* H. 34.

In Scania sponte occurrit.

Male a Corno genere separatur, conveniunt enim partes fructificationis omnes, ut et facies. Petioli heic longiores per se insuffientes sunt dirimere, qvod reliqvæ omnes partes fructificationis conclusere.

41. CORNUS herba. (Cornus herbacea uniflora.) Mesomora alba, baccis in corymbo rubris *Rudb:* fil. Act. lit. Svec, 1720 p. 97. Herba Paris flore magno, polyclonos [polycoccos], edulis *Rudb:* fil. It. Lap. 11. Chamæpericlymenum. *Raj:* Syn. III. [p. 261]. Periclymeno accedens planta monanthos nostras *Moris:* III. 538 [p. 535]. Periclymenum humile norvegicum *C. B:* 302. Alsine baccifera svecorum [svevorum] *Rudb:* H. 5. *Franck:* [Spec. Bot. p. 3]. Smörbär, Hönsebär. *Rudb.* H. 6.

In horto Celsiano. In Smolandia autem sponte provenit; qvoad omnes partes tam exacte convenit fructificatione, ac ovum ovo, genere itaqve cum Corno convenire pronuntio, qvod propria didicit autopsia.

42. *EVONYMUS vulgaris, granis rubentibus *C. B:* 428. *Tourn:* 617. Evonymus [Evonimus] *Matth:* 152. *Dod:* 771. Spindelträd *Rudb:* H. 31 [42].

Folia hujus arboris qvotannis ab Erucis totaliter in horto Upsal. consumuntur, qvæ in papiliones albos, punctis nigris notatos consperguntur, qvales *Merian:* Metam. Tom. II p. 43 tab. XLIV depinxit. Papiliones hi omnes hujus speciei plantas in horto Academico devastant, reliqvas ne tangunt qvidem.

43. EPIMEDIUM *C. B:* 323. *Tourn:* 232. *Moris:* II p. 96. [196] s. 2. t. 20. f. 5. *Lob:* ic. I. 325. Honungsklöfwer.

44. RUBIA sativa *Matth:* 592 [598]. *Fuchs:* 280. Rubia tinctorum sativa *C. B:* 333. *Tourn:* 114. Färgare root röd *Rudb:* H. 100.

45. DIPSACUS (capitulis) floribus pyramidalibus. Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. *C. B:* 385. *Tourn:* 466. Dipsacus purpureus *Fuchs:* 284 [225]. Labrum veneris alterum *Matth:* 380 [450]. Wantmakare tistel den [ten] willa *Rudb:* 22.

---

40. C. sanguinea L: Sp. pl. I. 117, II. 171; saknas i Hort. Ups. **41.** C. suecica L: Sp. pl. I. 118, II. 171; saknas i Hort. Ups. **42.** E. europæus L: Spec. pl. I. 197, II. 286; saknas i Hort. Ups. **43.** E. alpinum L: Sp. pl. I. 117, II. 171; Hort. Ups. 29. **44.** R. tinctorum L: Sp. pl. I. 109, II. 158; Hort. Ups. 28. **45.** D. fullonum L: Sp. pl. I. 97, II. 140; Hort. Ups. 25. 1.

46. DIPSACUS (capitulis) floribus convexis. Dipsacus sylvestris, capitulo minore vel Virga pastoris minor. *C. B:* 385. *Moris:* III. p. 158 [168] s. 7. t. 36. f. 5. Dipsacus tertius *Dod:* 723. Virga pastoris. *Matth:* 451. Wantmakare tistel then [ten] mindre, heller herde staf *Rudb:* 22.

47. SCABIOSA (capitulis) floribus fastigiatis, (flosculorum) petalorum lacinia (exteri) exteriori acuta. Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo. *C. B:* 270. *Tourn:* 464. *Moris:* III. p. 48. s. 6. t. 14. f. 26. Indianisk skabbegräs *Rudb:* H. 104.

48. SCABIOSA (capitulis) floribus hæmisphæricis, flosculis exterioribus reflexis, interioribus erectis. Scabiosa alpina, foliis Centaurii majoris. *C. B:* 270. *Tourn:* 464. *Moris:* III. p. 46. s. 6. t. 13 f. 10. Scabiosa alpina, centauroides, [aliis Centaurium nothum]. *Besl. æst:* 6 [ord. 9] fol. 8 f. I. Hwit indianisk skabbegräs [*Rudb:* H. 104].

Exemp: Centunculus, Cordifolium (Unifolium), Sherardia *Dill:*, Vaillantia, Aparine, Asperula, Gallium, (Camphorata).

§. DIGYNIA.

49. HYPECOUM *C. B:* 172. Hypecoon. *Dod:* 446. Hypecoon latiore folio. *Tourn:* 230. Hypecoon siliqvis erectis, articulatis, incurvis. *Moris:* II. p. 279. Cuminum sylvestre (II) *Matth:* 506. Cuminum sylvestre, alterum, siliqvosum *Lob:* ic. I. 744. Getahorn, Båckhorn *Rudb:* H. 56.

50. SANGVISORBA (capitulis) spicis subrotundis. Sangvisorba major *Fuchs:* 788. Sangvisorba major, pratensis. *Rupp:* 58. Pimpinella Sangvisorba, major *C. B:* 160. *Tourn:* 156. *Moris:* III. p. 264. s. 8. t. 18. f. 7. Brun större Pimpinella *Rudb:* H. 90.

51. SANGVISORBA (capitulis spicæformibus) spicis oblongis. Sangvisorba canadensis, flore albo, spicato *Rupp:* 58. Pimpinella maxima, canadensis *Cornut:* 175. *Tourn:* 157. Största pimpinella med hwit ax [*Rudb:* H. 90].

§. TETRAGYNIA.

52. RHODIA foemina. Rhodia radix *C. B:* 286. Rhodia s. Rosea radix *Lob:* ic. I. 391. Anacampseros, radice Rosam spirante

---

46. D. pilosus L: Sp. pl. I. 97, II. 141; Hort Ups. 25. 2. **47.** S. atropurpurea L: Sp. pl. I. 100, II. 144; Hort. Ups. 26. 3. **48.** S. alpina L: Sp. pl. I. 98, II. 141; Hort. Ups. 26. 1. **49.** H. procumbens L: Sp. pl. I. 124, II. 181; Hort. Ups. 31. 1. **50.** S. officinalis L: Sp. pl. I. 116, II. 169; saknas i Hort. Ups. **51.** S. canadensis L: Sp. pl. I. 117, II. 169; saknas i Hort. Ups. **25.** Rhodiola rosea L: Sp. pl. I. 1035, II. 1465; saknas i Hort. Ups.

major. *Tourn:* 264. Telephium luteum, minus, radice Rosam redolente. *Moris:* III. p. 468. s. 12. t. 10. f. 8. Rosenroot *Rudb:* H. 98.

Sponte provenientem in Wallawari [Walliwari] monte altissimo Laponiæ Lulensis prope Qvicklock [Qvickjock] reperit Nob. et Generosiss. D:nus *O. Rudbeck fil.* et in hortum Academicum transtulit. In horto citato vidua est, hinc qvotannis floret, novosqve reparat amores, sed incassum furit, nec semina foecundiora profert.

53. *AQVIFOLIUM foliis subrotundis margine spinoso.

α. Aqvifolium s. agrifolium vulgo *Tourn:* 600. Aqvifolium *Matth:* 131. [Agrifolium] *Dod:* 746.

β. Ilex aculeata, baccifera, folio sinuato *C. B:* 425. Aqvifolium foliis subrotundis, spinis et limbis argenteis *Tourn:* 600.

Class. V. PENTANDRIA.

§. MONOGYNIA.

A. *Gymnomonosperma.*

54. CHENOPODIUM foliis oblongis, (ad latera) sinuatis. Chenopodium ambrosioides, folio sinuato. *Tourn:* 506. Botrys ambrosioides vulgaris. *C. B:* 138. Botrys *Matth:* 565. *S. Paull:* 182. fig. Atriplex odora s: svaveolens. *Moris:* II. 605. Dufwegräs *Rudb:* H. 18.

55. CHENOPODIUM foliis oblongis, dentatis. Chenopodium svaveolens, foliis longioribus, mexicanum *Rupp:* 318. Chenopodium [Botrys] ambrosioides, mexicanum [mexiocana] *C. B:* [*Pin.* p. 138 *App.* p.] 516 descr.

56. CHENOPODIUM foliis lanceolatis, ad alas villosum. Chenopodium Lini folio, villoso. *Tourn:* 506. Linaria scoparia *C. B:* 212. Herba studiosorum *Tabern:* II. 102. Osyris *Dod:* 101. Bellevedere *Volck:* 59. Qwaste lingräs *Rudb:* H. 66.

57. HALIMUS latifolius s. fruticosus. *C. B:* 120. Atriplex latifolia s: Halimus fruticosus. *Tourn:* 505. Halim trä. *Rudb:* H. 50.

58. HALIMUS Portulacæ folio *Rudb:* H. 49. (Halimus s: Portulaca marina *C. B:* 120). Atriplex marina [maritima], angustissimo

---

53. Ilex Aquifolium L: Sp. pl. I. 125, II. 181; Hort. Ups. 32. **54.** Ch. Botrys L: Sp. pl. I. 219, II. 320; Hort. Ups. 55. 5. **55.** Ch. ambrosioides L: Sp. pl. I. 219, II. 320; Hort. Ups. 56. 6. **56.** Ch. Scoparia L: Sp. pl. I. 221, II. 321; Hort. Ups. 55. 2. **57.** Atriplex Halimus L: Sp. pl. I. 1052, II. 1492; saknas i Hort. Ups. **58.** Atriplex Portulacoides L: Sp. pl. I. 1053, II. 1493; saknas i Hort. Ups.

folio *Tourn:* 505. Halimus minor *C. B:* 120. *Prodr.* [p. 59] fructum non maturum. Blitum.

59. MOROCARPUS major *Rupp. alt:* 271. Chenopodio-Morus major *Boerh:* II. 91. Atriplex Mori fructu major, s. Fragifera major *Moris:* II. p. 606. s. 5. t. 2. f. 1. Spinachia fragifera *Zorn:* 648 tab. 1. Spinacia baccifera *Hortulanis.* Wirginianisk [Wirginisk] bäärmålla *Rudb:* H. 14.

B. *Gymnotetrasperma.*

60. BORRAGO *Dod:* [Borago *Dod:* pempt. ed. 1583, p. 616, ed. 1616 p. 627]. Buglossum s. Borrago *Matth:* 757 [737]. Buglossum latifolium, Borrago *C. B:* 256. Floribus coeruleis. Borrago floribus coeruleis *Tourn:* 133. Floribus albis. Borrago floribus albis *Tourn:* 133. Stoffer blomma. Wälsk oxetunga *Rudb:* H. 18.

61. HELIOTROPIUM *Dod:* 70. Heliotropium majus *Tabern:* II. p. 251. Heliotropium majus Dioscoridi *C. B:* 253. *Tourn:* 139. Solegräs *Rudb:* H. 70 [52].

62.. LYCOPSIS perianthio globoso. Echioides flore pullo, calice amplo *Rupp: alt:* 177. Buglossum procumbens, annuum, pullo, minimo flore *Moris:* III. p. 439. s. 11. t. 26. f. 11.

63. LITHOSPERMUM ramulis reflexis. Lithospermum majus erectum *C. B:* 258. *Tourn:* 137. Lithospermum minus. *Matth:* 596. Stenfrö. Stenbräckia, Pärlegräs *Rudb:* H. 66.

64. CONSOLIDA *Rivin. apud Rupp:* 8 fl: purpurascentibus. Symphytum, Consolida major, flore purpureo, qvæ mas. *C. B:* 259. *Tourn:* 158 [138]. Symphytum majus s. Consolida major *Matth:* 620. Symphytum magnum *Fuchs:* 158 [fig. p. 695].

—— *Riv: apud Rupp:* 8. fl. albis. Symphytum, Consolida major, flore albo, qvæ foemina. *C. B: Tourn:* Groört, Walört, Sliggeört, Sårläkia [Blostilla] *Rudb:* H. 108.

65. CERINTHE qvorundam [minor], flavo flore *Turn:* 80. Cerinthe minor *C. B:* 258. Waxört *Rudb:* H. 18 [28].

---

59. Blitum capitatum L: Sp. pl. I. 4, II. 6; Hort. Ups. 3. **60.** Borago officinalis L: Sp. pl. I. 137, II. 197; Borrago Hort. Ups. 34. **61.** H. europæum L: Sp. pl. I. 130, II. 187; Hort. Ups. 33. 1. **62.** L. vesicaria L: Sp. pl.I. 138, II. 198; Hort. Ups. 35. **63.** L. officinale L: Sp. pl. I. 132, II. 189; saknas i Hort. Ups. **64.** Symphytum officinale L: Sp. pl. I. 136, II. 195; saknas i Hort. Ups. **65.** C. minor L: Sp. pl. I. 137, II. 196; saknas i Hort. Ups.

C. *Capsulata.*

66. PRIMULA disco petali concavo.

α. Perianthio immutato, petulo ferrugineo. Primula veris hortensis, flore ferrugineo, umbellato. *Tourn:* 124.

β. Perianthio petaliformi. Primula veris caulifera, prolifera, odorata *Tourn:* 125. *J. B:* III. p. 496. Primula veris prolifera *Tabern:* II. 33. Verbasculum proliferum *C. B:* 242. *Moris:* II. p. 554. s. 5. t. 24 f. 2.

67. PRIMULA disco petali plano. Primula veris, pallido flore, elatior *Clus:* [*Hist.* 301] *Tourn:* 124. Primula veris major *Dod:* 147. Verbasculum pratense vel sylvaticum, inodorum *C. B:* 241.

α. Perianthio petaliformi, petalo luteo. Primula veris prolifera, flore majore *Tourn:* 125. Större oxelägg blekguul.

β. Perianthio petaliformi, petalo variegato. Primula veris, flore geminato, inodoro *Tourn:* 124. Oxelägg [Oxeleg] med blomma uhr [ur] blomma *Rudb:* H. 94.

γ. Perianthio immutato, flore pleno. Primula veris multiflora [III], sylvestris [I] *Tabern:* II. 34. *Tourn:* 124. Verbasculum sylvestre, magno plenoqve flore. *C. B:* 242.

68. PRIMULA disco petali infundibuliformi.

α. Petalo purpureo. Auricula ursi, rubro flore *Clus: Pan.* 346. Auricula ursi, flore purpureo *Tourn:* 120. *Lob:* ic. 570. Sanicula alpina, purpurea *C. B:* 242

β. Petalo nigricante, sericeo. Auricula ursi, flore magno, atropurpureo, holosericeo, [simplici] umbone candido amplissimo *Tourn:* 120.

γ. Petalo variegato. Auricula ursi, flore variegato *Tourn:* 121. Sanicula alpina, flore variegato *C. B:* 242.

69. ANAGALLIS phoeniceo flore *C. B:* 562. *Tourn:* 142. Anagallis mas *Dod:* 32. *Fuchs:* 18. Hönsekåhl [Hönssekåål] med röd [rödh] blomma *Rudb:* 8.

In Scania juxta vias sponte.

70. VIOLA flagellis procumbentibus, floribus odoratis. Viola martia, purpurea, flore simplici, odoro *C. B:* 199. *Tourn:* 419. Blåbruna Marsfioler *Rudb:* H. 118.

---

66. P. veris officinalis L: Sp. pl. I. 142, II. 204; Hort. Ups. 37. 2. *α* & *β*. **67.** P. veris *β* elatior L: Sp. pl. I. 143, II. 204; Hort. Ups. 37. 2. *γ*. **68.** P. Auricula L: Sp. pl. I. 143, II. 205; Hort. Ups. 36. **69.** A. arvensis L: Sp. pl. I. 148, II. 211; saknas i Hort. Ups. **70.** V odorata L: Sp. pl. I. 934, II. 1324; Hort. Ups. 276.

—— flagellis procumbentibus, floribus odoratis, plenis. Viola martia, multiplici flore coeruleo [purpureo vel rubello] *C. B:* 199. *Tourn:* 419.

71. VIOLA (erecta) foliis oblongis, caule ramoso, diffuso (petalis sericeis).

α. Viola tricolor, hortensis, repens, an *φλόξ καὶ φλόγιον* Theophrasti *C. B:* 199. *Tourn:* 420.

β. Viola tricolor, hortensis, repens, flore violaceo, holoserico [holosericeo], purpureo et aureo *Tourn:* 421.

γ. Viola tricolor hort: repens, fl: purpureo et luteo *C. B:* Viola tricolor *Dod:* 159 [158]. Helge Trefaldighets [heetz] blomma *Rudb:* 118. Flos Trinitatis *Hortul.* a tribus maculis in variatione & flori aspersis.

72. IMPATIENS florum petiolis propriis, floribus ferrugineis. Balsamina foemina *C. B:* 306. *Tourn:* 418. *Tabern:* II. 154. Balsamine altera *Fuchs:* 190. Balsamina *Riv: irr: tetr:* [tab. 244].

—— floribus albis. Balsamina foemina, flore (candido) albo *Tourn:* 418. Balsamört hon *Rudb:* 16. Mödomsört.

73. NICOTIANA foliis amplexicaulibus. Nicotiana major, latifolia *C. B:* 169. *Tourn:* 117. Hyoscyamus peruvianus. *Dod:* 449. Petum mas. *Neand: Tabacol.* c. fig. Tabacum *S. Paul.* p. 361 fig. Blennochois *Reneal:* 38. fig. descr. [p. 33 fig. p. 37]. Toback med långa blad [blan] *Rudb:* 56.

74. APOLLINARIS. Petum *Rivin. apud Rupp:* 24. Priapeja [Priapeia] *Knaut: fil.* 56. Priapeja quibusdam, Nicotiana minor *J. B:* III. 270 [630]. Hyoscyamus tertius *Matth:* 506 [675]. Nicotiana foemina *S. Paul:* p. 253. fig. Gachyphylle *Reneal:* 40 descr.

Ad genus Nicotiae ob faciem externam referrem, nisi partes fructificationis omnes in figura deferrent.

75. STRAMONIUM fructu spinoso, oblongo, flore albo. *Tourn:* 119. Solanum foetidum, fructu [poma spinoso oblongo] spinoso, oblongo *C. B:* 168. Datura vulgo. Spijkklubba. Kiärleks willa *Rudb:* H. 36.

76. VERBASCUM (capsulis) pericarpiis globosis, foliis oblongis, dentatis, glabris. Blattaria lutea, folio longo, laciniato *C. B:* 240. *Tourn:* 147. Blattaria annua, ramosa, floribus luteis, staminibus pur-

---

71. V. tricolor *β* L: Sp. pl. I. 936, II. 1326; Hort. Ups. 276. **72.** I. Balsamina L: Sp. pl. I. 938, II. 1328; Hort. Ups. 276. **73.** N. Tabacum L: Sp. pl. I. 180, II. 258; Hort. Ups. 45. 1. **74.** Nicotiana rustica L: Sp. pl. I. 180, II. 258; Hort. Ups. 45. 2. **75.** Datura Stramonium L: Sp. pl. I. 179, II. 255; Hort. Upl. 43. **76.** V. Blattaria L: Sp. pl. I. 178, II. 254; Hort. Ups. 46.

pureis *Moris:* II. p. 489. s. 5. t. 9. ad. decim: ref: Blattaria *Matth:* 718. Gult (Guult) edelstensgräs thet största *Rudb:* H. 18.

77. LYSIMACHIA humifusa, foliis orbiculatis. Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo *Tourn:* 141. Nummularia major lutea *C. B:* 309. Nummularia supina s. Nummularia officinarum *Rupp:* 19. Penningegräs *Rudb:* H. 70.

78. CONVOLVULUS foliis cordiformibus. Convolvulus purpureus, folio subrotundo *C. B:* 295. *Tourn:* 82. *Moris:* II. p. 183 [13] s. 1. t. 3. f. 7. Campanula indica *J. B:* II. p. 165. Indianisk Binda med skiöna stora purpurblommor *Rudb:* H. 32.

79. CONVOLVULUS caule recto, foliis oblongis. Convolvulus lusitanicus, flore cyaneo *Tourn:* 83. Convolvulus peregrinus, coeruleus, folio oblongo *C. B:* 295. Convolvulus non convolvulus vulgo. In horto Golnitziano.

80. SCAMMONIUM germanicum *Hoffm: Fl: Alt: sylv.* (Convolvulus foliis tricuspidatis, angulis posticis abscissis.) Convolvulus major, albus *C. B:* 294. *Tourn:* 82. Convolvulus [vulgaris,] major, albus, s. flore majore, albo. *Moris:* II. p. [12. s. 1. t. 3. f. 6.]. Convolvulus lævis [Smilax læuis] major *Dod:* 388.

Species hæc sine controversia cum Scammonio genere convenit, an autem Scammonium sit species Convolvuli adhuc sub judice lis est; rationem pete e *Fundam. meis Botanicis.*

81. MIRABILIS *Riv: apud Rupp.* 1.

α. Jalappa flore exalbido Tourn: 129.

β. Jalappa flore purpureo Ibd.

γ. Jalappa flore ex purpureo et luteo [mixto] variegato Tourn: ibd. Solanum mexicanum, [mexiocanum] flore magno *C. B:* 168. Mirabilis del Peru *Clus: Pan.* 400. Mirabile peruvianum *Moris:* III. p. 592 [598] s. 15. t. 1. f. 1. Viola peruviana *Tabern:* II. 31. Undergräs *Rudb:* H. 76. Belle de nuit *Gallis.*

82. POLEMONIUM floribus coeruleis. Polemonium vulgare, coeruleum *Tourn:* 146. Vulneraria [Valeriana] Blattariæ flore coeruleo *Moris:* II [III] 605. Valeriana coerulea *C. B:* 164. Valeriana græca *Dod:* 348. Blå gräkisk Walerian *Rudb:* 116.

---

77. L. Nummularia L: Sp. pl. I. I. 148, II. 211; saknas i Hort. Ups. **78.** C. hederaceus L: Sp. pl. I. 165, C. purpureus Sp. pl. II. 219; Hort. Ups. 38. 1. **79.** C. tricolor L: Sp. pl. I. 158, II. 225; Hort. Ups. 38. 2. **80.** Convolvulus sepium L: Sp. pl. I. 153, II. 218; saknas i Hort. Ups. **81.** M. Jalapa L: Sp. pl. I. 177, II. 252; Hort. Ups. 43. **82.** P. coeruleum L: Sp. pl. I. 162, II. 230; saknas i Hort. Ups.

—— floribus albis. Polemonium vulgare album *Tourn:* 146. Viola [Valeriana] alba *C. B:* 164.

83. CAMPANULA maxima, foliis latissimis, flore coeruleo *C. B:* 94. *Tourn:* 108. Campanula pulchra a Tossano Carolo missa *J. B:* II. 807.

Sponte provenit ad acidulas Wicksbergensis, ubi copiose eam collegi, omissa tamen est a *Lindero* in Flora Wicksbergensi, cum multis aliis, e. gr. Subularia, Plantago monanthos, Dortmanna, Monorchis, Sanicula T., Mercurialis perennis, Picris (?) etc.

—— max: fol: latissimis, flore albo *C. B:* 94. *Tourn:* 109. Ab Hortulanis pro Campanula pyramidali habetur. Stora bredbladiga klåcker.

84. CAMPANULA pyramidata, altissima *Tourn:* 109. Pyramidalis lævis *J. B:* II. 808. Rapunculus hortensis, latiori folio s. Pyramidalis *C. B:* 93. Pyramid klåcker.

In horto Warmholtziano et Golnitziano.

85. CAMPANULA vulgatior, foliis Urticæ, flore duplici et triplici coeruleo *Tourn:* 109. *β* flore albo. Campanula vulg: fol: Urt: fl: dupl: albo *Tourn:* 109.

D. *Baccifera.*

86. *TINUS foliis ovatis, subtus ad exortum venarum levi hirsutie aspersis. Tinus prior *Tabern:* III. 46. *Tourn:* 607. Laurus sylvestris, Corni foeminæ foliis subhirsutis *C. B:* 641 [461]. Luden bladig Lagerträ [*Rudb:* H. 64].

87. *RHAMNUS. ALATERNUS I *Clus:* [*Hisp.* 56]. *Tourn:* 595. Alaternus Turneri *Tabern:* III. 132. *C. B:* 476 [477]. Alat. Clusii ibidem. Phylica [Philyca] elatior *C. B:* 476. Alaterträ. *Rudb:* H. 4.

88. *ALATERNUS aurea, foliis ex luteo variegatis [*H. R. P.*] *Tourn:* ibd.

89. *ALATERNUS monspeliaca, foliis profunde [profundius] incisis *H. R. P. Tourn:* 595. Alaternus seu Phylica, foliis angustioribus, profunde serratis *Boerh:* 214.

---

83. C. latifolia L: Sp. pl: I. 165, II. 233; saknas i Hort. Ups. **84.** C. pyramidalis L: Sp. pl. I. 164, II. 233; saknas i Hort. Ups. **85.** C. Trachelium L: Sp. pl. I. 166, II. 245; saknas i Hort. Ups. **86.** Viburnum Tinus L: I. 267, II. 383; Hort. Ups. 69. **87—89.** Rh. Alaternus L: Sp. pl. I. 193, II. 281; Hort. Ups. 67; jfr Hort. Cliff. 70. 7.

90. *TOXICODENDRON foliis ternatis, integris. Toxicodendron triphyllum [triphyllon] *Tourn:* 611. Edera trifolia canadensis *Cornut:* 96 [fig. in pag. 97]. Epimedium frutescens [fruticescens], virginianum *Rudb:* 39. *Vaill:* Jack. 13. Törnblads trä *Rudb:* 40.

90½. *CAPRIFOLIUM ramulis proliferis [floriferis], perfoliatum. Caprifolium italicum *Dod:* 406. *Tourn:* 608. Periclymenum italicum. *Rivin: irr: mon:* [tab. 123]. Periclymenum perfoliatum *C. B:* 302. Wallhorns blomma. Wälska geteblad *Rudb:* H. 24 [22].

91. PASSIFLORA foliis crenatis, tripartito divisis *Pluk: Alm:* 281. Granadilla hispanis, Flos passionis italis *Tourn:* 240. Granadilla trifolia, flore roseo, clavato *Wolck:* [*Volck:*] 199. Clematis [Clematitis] trifolia, flore roseo, clavato *C. B:* 301. Christi Kårs blomma *Rudb:* H. 44.

Si quis Passifloram et Murucujam ad Gynandriam § Pentandriam referre velit, non repugnabo.

92. *SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, serratis. Sambucus fructu in umbella nigro *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Sambucus *Matth:* 782. *Fuchs:* 64. Hylleträ *Rudb:* H. 102. Fläder.

93. *SAMBUCUS arborea, foliis pennatis, multifidis. Sambucus laciniato folio *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Sambucus lacinioso folio *Dod:* 832. Krusbladig [Kruss bladigh] Hylleträ *Rudb:* H. 102.

94. SAMBUCUS herbacea. Sambucus humilis, s: Ebulus *C. B:* 456. *Tourn:* 606. Ebulus *Pont: Anth:* 270. *Charact. Tillands* 102 fig. *Fuchs:* 65. Attig Lilleflärr, Sommerhyld *Rudb:* H. 38.

95. *SAMBUCUS foliis simplicibus, laciniatis, floribus omnibus castratis. Opulus flore globoso *Tourn:* 607. Sambucus aquatica, flore globoso, pleno *C. B:* 456. Sambucus [V] aquatica [II], polyanthos *Tabern:* III. 119 [118]. Snöbållsbuske.

96. *VITIS vinifera *C. B:* 299. *Fuchs:* 84. Windrufwor [Wijndrufwor]. Winranka *Rudb:* 118.

Hujus infinitæ existunt variationes præsertim a fructu desumtæ, qvas enumerare et distingvere curiosis oenopolis relinqvimus.

97. *SOLANUM foliis oblongis, simplicibus, frutescens. Solanum fruticosum, bacciferum *C. B:* 166. *Tourn:* 149. Pseudo-Capsicum.

90. Rhus Toxicodendron L: Sp. pl. I. 266, II. 381; Hort. Ups. 68. **90½.** Lonicera Caprifolium L: Sp. pl. I. 173, II. 246; Hort. Ups. 42. 1. **91.** P. incarnata L: Sp. pl. I. 959, II. 1360; Hort. Ups. 278. 2. **92.** S. nigra L: Sp. pl. I. 269, II. 385; Hort. Ups. 69. **93.** S. nigra γ laciniata L: Sp. pl. I. 270. II. 386; Hort. Ups. 69. **94.** S. Ebulus L: Sp. pl. I. 269, II. 385; saknas i Hort. Ups. **95.** Viburnum Opulus β roseum L: Sp. pl. I. 268, II. 384. **96.** V. vinifera L: Sp. pl. I. 202, II. 293; Hort. Ups. 50. **97.** S. Pseudo-Capsicum L: Sp. pl. I. 184, II. 263; Hort. Ups. 48. 1.

Dod: 706. Amomum Plinii [Strycnodendron sive Solanum arborescens] *Lob: ic:* [tom. I tab.] 265. Buskachtig peppargräs *Rudb:* H. 22.

98. SOLANUM foliis pennatis, radice tuberosa. Solanum tuberosum, esculentum, flore albo *C. B:* 167. *Prod.* 87 [83] fig. *Tourn:* 149. *Moris:* III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 19. Solanum tuberosum s. Papas peruvianorum *Rudb:* H. 105. Potatoës et Tryffel vulgo. (Papas et potatoes vulgo.)

99. SOLANUM pomiferum, foliis pinnatis, serratis. Solanum pomiferum [fructu rotundo, striato, molli] *C. B:* 167. Solanum amorellum malis aureis *Franck: Specul.* [ed. II. p. 28]. Lycopersicon Galeni *Tourn:* 150. Aurantia mala *Dod:* 706 [in ed. 1583 p. 455, in ed. 1616 p. 458]. Kärleks [Kärlekz] äplen, Älskogs [Elskogz] äplen *Rudb:* H. 92. (Poma amoris Hortulanis.)

100. CAPSICUM fructu oblongo, leviter incurvo (incurvato). Capsicum actuarii *Lob: ic.* I. 316. Capsicum siliquis longis, propendentibus *Tourn:* 152. Solanum urens [Capsicum dictum], siliqua propendente, rubra *Moris:* III. p. 528. s. 13. t. 2. f. 1. Piper indicum, vulgatissimum *C. B:* 102. Indianisk pepar med långa [longa] skijdor *Rudb:* H. 22.

101. PHYSALIS Alkekengi officinarum *Tourn:* 151. Solanum vesicarium *C. B:* 166. Solanum vesicarium, vulgare [vulgatius], repens, fructu et vesica rubra *Moris:* III. p. 526. s. 13. f. 16. Halicacabum vulgare *Fuchs:* 68 [fig. in pag. 688]. Hiärtans korn. Judenkiörssbär *Rudb:* H. 106.

102. CERATONIA *Dod:* 787 [in ed. 1616]. Siliqva edulis *C. B:* 402. *Tourn:* 578. Siliqva dulcis officinarum. Johannis Bröd.

Exemp: A. Persicara, Herniaria.
B. Buglossum, Cynoglossum, Pulmonaria, Echium, Asperugo, Scorpiuros.
C. Androsace, Hottonia, Hydrophyllum, Samolus, Glaux, Cyclamen, Menyanthes, Centaurium, (Parnassia), Hyoscyamus, Diervilla, Hermannia (Qvamoclit).
D. Frangula, Mandragora, Bellona etc.

---

98. S. tuberosum L: Sp. pl. I. 185, II. 265; Hort. Ups. 48. 3. **99.** S. Lycopersicum L: Sp. pl, I. 185, II. 265; Hort. Ups. 49. 4. **100.** C. annuum L: Sp. pl. I. 188, II. 270; Hort. Ups. 47. **101.** Ph. Alkekengi L: Spec. pl. I. 183, II. 262; Hort. Ups. 49. **102.** C. Siliqva L: Sp. pl. I. 1026, II. 1513; Hort. Ups. 296.

§. DIGYNIA.

A. *Involucro nullo.*

103. IMPERATORIA *Rivin. irr. pent.* [tab. 241]. Imperatoria major *C. B:* 156. *Tourn:* 317. Laserpitium germanicum *Fuchs:* 76 [fig: in pag. 763]. Mästerört.

104. PASTINACA sativa, latifolia *C. B:* 115 [155]. *Tourn:* 319. Pastinaca domestica *Matth:* 500. Pastinaca *S. Pauli:* 311. Pastinaca latifolia, satiua *Dod:* 669. Palsternack.

105. ANETHUM seminibus rotundis, planis. Anethum hortense *C. B:* 147. *Tourn:* 318. Anethum *Dod:* 296. Dill *Rudb:* 8.

106. ANETHUM seminibus oblongis, convexis. Foeniculum vulgare, germanicum *C. B:* 147. *Tourn:* 311. Foeniculum *Dod:* 295. *Matth:* 517. *Tilland:* 86. Gemen fenekåhl [kåål] *Rudb:* 44.

Nemo ante nos Foeniculum et Anethum genere conjunxit; ratio fuit, qvod Botanici in seminibus characteres genericos hujus classis qvæsiverint. Longe autem meliorem, faciliorem, certiorem, magisqve naturalem [methodum] nuper detexit Exp. D. *Sirbell*, qvam merito seqvimur.

107. PIMPINELLA foliis oblongis, acuminatis.

α. Pimpinella saxifraga, major, umbella candida *C. B:* 159. Saxifraga magna *Dod:* 312. [Jfr. Hort. Cliff. p. 107]. Tragoselinum majus, umbella candida *Tourn:* 309. Tragoselinum majus *Tabern:* I. p. 242.

β. Pimpinella saxifraga major, umbella rubente *Tourn:* Stor Pimpinella *Rudb:* 90.

108. CHÆROPHYLLUM [Chærefolium] *Dod:* 688. Chærophyllum sativum *C. B:* 152. *Tourn:* 314. Cerefolium *Rivin: irr: pent.* [tab. 276]. Cerefolium semestre *Jungerman. apud Burser.* VII. 46. Kyrfwel *Rudb:* 18 [28].

B. *Involucro particulari.*

109. APIUM *Rivin: irr. pent.* [III. t. 314—317]. *Fuchs:* 745 [fig. in p. 744]. Apium dulce, Celeri Italorum *Tourn:* 305. Apium

---

103. I. Ostruthium L: Sp. pl. I. 259. II 371; Hort. Ups. 65. **104.** P. sativa *β* L: Sp. pl. I. 262, II. 376; Hort. Ups. 66. **105.** A. graveolens L: Sp. pl. I. 263, II. 377; Hort. Ups. 66. 1. **106.** A. Foeniculum L: Sp. pl. I. 263, II. 377; Hort. Ups. 66. 2. **107.** P. saxifraga major *γ* & *δ* L: Sp. pl. I 264, II. 378; saknas i Hort. Ups.; jfr Hort. Cliff. p. 107. **108.** Scandix Cerefolium L: Sp, pl. I. 257, II. 268; saknas i Hort. Ups. **109.** A. graveolens L: Sp. pl. I. 264, II. 379; Hort. Ups. 67.

palustre et Apium officinarum *C. B:* 154. *Tourn:* 305. Eleoselinum *Dod:* 683. Zeleri, Wattupärsillia *Rudb:* 10. Celeri vulgo.

110. ANISUM foliis infimis simplicibus. Anisum herbariis, semine majore [& minore] *C. B:* 158 [159]. Anisum *Rivin. pent. irr.* [III. t. 306, 307]. *Fuchs:* 62. Apium, Anisum dictum, semine svaveolenti, majori *Tourn:* 305. Anis *Rudb:* 8.

111. ANISUM foliis infimis compositis, margine plano. Apium vel Petroselinum vulgo *C. B:* 153. *Tourn:* 305. Apium hortense *Dod:* 682. *Matth:* 511. Gemen pärsilia *Rudb:* 10.

—— foliis infimis compositis, margine undulato. Apium vel Petroselinum, crispum *C. B:* 153. *Tourn:* 305. Apium crispum *Riv: irr. pent.* [III. t. 90]. *Tabern:* I. 252. Krus pärsilia *Rudb:* 10.

Petroselinum cum Aniso sine ratione sufficiente non conjunxi. Vide Fundamenta mea Botanica.

112. MYRRHIS perennis, alba, odorata *Moris:* III. [p. 301] s. 9. t. 10. f. 1. (Myrrhis major vel Cicutaria odorata *C. B:* 160. *Tourn:* 315.) Myrrhis *S. Pauli* 87. fig. Odorata *Riv: irr. pent.* [III. t. 290]. Myrrhis magno semine, longo, sulcato *J. B:* [III. 2. 77.] Spansk Kerfwel *Rudb:* 78.

113. CHÆROPHYLLUM geniculis ventricosis, seminibus striatis. Chærophyllum sylvestre *C. B:* 152. Myrrhis *Riv: irr. pent.* [III. t. 282] Myrrhis annua vulgaris, semine striato, lævi *Tourn:* 313 [315]. Myrrhis annua vulgaris, caule fusco *Moris:* III. p. 302. [s. 9. t. 10. f. 7].

114. CORIANDRUM majus *C. B:* 158. *Tourn:* 316. Coriandrum *Riv: irr. pent.* [III. t. 303—305]. *Fuchs:* 345. Coriander *Rudb:* 32.

C. *Involucro universali et particulari.*

115. PEUCEDANUM germanicum *C. B:* 149. *Tourn:* 318. Peucedanum majus, brevioribus foliis, germanicum *Moris:* III. p. 312. s. 9. t. 15. f. 2. Peucedanum [Peucedanus] *Fuchs:* 599. Håår-ört *Rudb.* 88.

116. ATHAMANTHA. Meum foliis Anethi *C. B:* 148. *Tourn:* 312. Meum vulgare, tenuifolium *Moris:* III. p. 270. Meum *Dod:* 302. Wälsk Moderört. Mösserot *Rudb:* 76.

Tournefortius Meum a Foeniculo charactere nil differre statuit, hinc Foeniculum alpinum, perenne, capillaceo folio, odore medicato

---

110. Pimpinella Anisum L: Sp. Pl. I. 264. II. 379; Hort. Ups. 67. **111.** Apium Petroselinum L: Sp. pl. I. 264, II. 379; Hort. Ups. 67. **112.** Scandix odorata L: Sp. pl. I. 256, II. 368; Hort. Ups. 64. **113.** Ch. temulum L: Sp. pl. I. 258, II. 371; saknas i Hort. Ups. **114.** C. sativum L: Sp. pl. I. 256, II. 367; Hort. Ups. 63. **115.** P. officinale L: Sp. pl. I. 245, II. 353; Hort. Ups. 60. **116.** A. Meum L: Sp. pl. I. 245, II. 353; Hort. Ups. 60; jfr. Hort. Cliff. 93.

vocat; a Foeniculo vero toto coelo differt. Conf. *Sirbelli Meth: Umbelliferar.*

117. DAUCUS sativus, radice lutea *Tourn:* 307. Staphylinus sativus *Rivin. irr. pent.* [III. t. 262]. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice lutea *C. B:* 151. Pastinaca tenuifolia sativa *Dod:* 667. Gul Morot *Rudb:* 36.

118. SIUM (tuberosum) radicibus conglomeratis. Sisarum germanorum *C. B:* 155. *Tourn:* 309. Sisarum *Rivin. irr. pent.* [III. t. 289]. *Dod:* 670. Siser [I] *Matth:* 334.. Sockerrötter *Rudb:* 106.

119. ANGELICA sativa *Matth:* 729. *C. B:* 155. Imperatoria sativa *Tourn:* 317. Then största Engelörten *Rudb:* 8.

120. LEVISTICUM foliorum pinnis a media parte externa incisis. Levisticum [Leuisticum] vulgare *Dod:* 309. Levisticum *Riv: irr. pent.* [III. t. 293]. Ligusticum vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti? *C. B:* 157. Angelica montana, perennis, Paludapii folio *Tourn:* 313. Libesticka *Rudb:* 66.

121. LEVISTICUM foliorum pinnis per totam longitudinem serratis. Cicutaria latifolia, foetida *C. B:* 161. *Tourn:* 322. Cicuta latifolia, foetida [foetidissima] *Moris:* III. p. 291. s. 9. t. 6. f. 5. Cicuta [Cicutaria] foetida. *Tabern:* II. 465.

D. *Non umbellati.*

122. ERYNGIUM latifolium, planum *C. B:* 386. *Tourn:* 327. Eryngium spurium *Dod:* 720. *Flore coeruleo.*

β. Eryngium latifolium, planum, caule viridi-albescente, flore albo *Tourn:* 327. Slätt [Släätt] Braaktistel *Rudb:* 40.

123. BETA radice caulibus crassiore. Beta rubra, radice Rapæ *C. B:* 118. *Tourn:* 502. Beta rubra *Matth:* 341 [357]. Beta rubra, romana *Dod:* 609. Rödbeta.

124. BETA radice caulibus (angustiore) tenuiore. Beta alba vel pallescens, qvæ Sicula vel Cicla officinarum *C. B:* 118. *Tourn:* 502. Beta candida *J. B:* II. 961. *Dod:* 620. Mangolt Hortulanis.

125. *RIBES vulgaris, acidus, ruber *J. B:* I. [III. p.] 97. Grossularia, multiplici acino s. non spinosa, hortensis, rubra, s. Ribes offi-

117. D. Carota *β* L: Sp. pl. I. 242, II. 348; Hort. Ups. 59. **118.** S. Sisarum L: Sp. pl. I. 251, II. 361; Hort. Ups. 62. **119.**? A. Archangelica L: Sp. pl. I. 250, II. 360; saknas i Hort. Cliff. **120.** Ligusticum Levisticum L: Sp. pl. I. 250, II. 359; Hort. Ups. 62. 1. **121.** Ligusticum peloponnesiacum L: Sp. pl. I. 250, II. 360; Hort. Ups. 62. 2. **122.** E. planum L: Sp. pl. I. 233, II. 336; Hort. Ups. 57. **123 & 124.** B. vulgaris L: Sp. pl. I. 222, II. 322; Hort. Ups. 56. **125.** R. rubrum L: Sp. pl. I. 200, II. 290; Hort. Ups. 50.

cinarum *C. B:* 455. *Tourn:* 639. Ribes vulgaris *Matth:* 135. Röda winbär [wijnbär] *Rudb:* 98.

*Ribes vulgaris, acidus, albas baccas ferens *J. B:* I. [t. II. p.] 98. Grossularia pratensis, [hortensis] fructu margaritis simili *C. B:* 455. Hwita winbär [wijnbär] *Rudb:* 100.

126. *RIBES foliis graveolentibus. Grossularia non spinosa, fructu nigro, majore *C. B:* 455. *Tourn:* 640. Swarta wijnbär, Dystrond, Disabär *Rudb:* 100.

127. *RIBES (Grossularia recta) caule erecto, fructu glabro. Grossularia spinosa, sativa *C. B:* 445. *Tourn:* 639. Grossularia majori [majore] fructu. *Clus: Hist:* 120. Slätta Krusbär [Kruusbär] *Rudb:* 120. Stickelbär. Hwita krusbär.

128. *RIBES (Grossularia recta) caule erecto [Grossularia spinosa], fructu obscure-purpurascente *J. B:* I. 48. (Grossularia ramis reclinatis). Grossularia spinosa, sativa, altera, foliis latioribus *C. B:* 445. *Tourn:* 639. Brunacktiga Krusbär [Kruusbär] *Rudb:* 120. Röda krusbär.

129. *GROSSULARIA recta, fructu hirsuto. Ludna krusbär.

130. *STAPHYLODENDRON foliis pennatis. Staphylodendron *Matth:* 201. fig. *Tourn:* 616. Pistacia sylvestris *C. B:* 401. Wildnöt *Rudb:* 108.

131. VINCA *Riv: apud Rupp:* 27. Pervinca vulgaris latifolia, flore coeruleo *Tourn:* 119. Clematis daphnoides, major *C. B:* 302. *Dod:* 401. Gemen blå sijgrön *Rudb:* 32.

132. *NERIUM [Nerion] *Tabern:* III. 144. Nerium [Nerion] floribus rufescentibus [rubescentibus] *C. B:* 464. *Tourn:* 605. Rhododendron *Dod:* 837 [839].

Exemp. Umbellatæ Tournefortii et Raji omnes. Asclepias, Plumeria. [Apocynum, Crassa].

§. TRIGYNIA.

133. *VIBURNUM *Matth:* 217 [p. 167]. *Tourn:* 607. *C. B:* 429. Lantana *Dod:* 81 [ed. 1616 p. 781].

---

126. R. nigrum L: Sp. pl. I. 201, II. 291; Hort. Ups. 51. 2. **127.** R. Uva crispa L: Sp. pl. I. 201, II. 292; saknas i Hort. Ups. **128.** R. reclinatum L: Sp. pl. I, 201, II. 291; Hort. Ups. 51. 3. **129.** Ribes Grossularia L: Sp. pl. I. 201, II. 291; Hort. Ups. 51. 4. **130.** Staphylea pinnata L: Sp. pl. I. 270, II. 386; Staphylæa Hort. Ups. 69. **131.** V. major L: Sp. pl. I. 209, II. 304; saknas i Hort. Ups **132.** N. Oleander L: Sp. pl. I. 209, II. 305; Hort. Ups. 55. **133.** V. Lantana L: Sp. pl. I. 268, II. 384; Hort. Ups. 68.

134. *RHUS foliorum pinnis (oblongis acuminatis) lanceolatis. Rhus canadensis, folio longiori, utrinqve glabro *Tourn:* 611. Rhus angustifolium *C. B:* [Pinax p.] 414. Sumach angustifolium [C. Bauh.] *Prod.* 158. Garfwarbuska *Rudb:* 98.

Plantam hanc a *Bursero* habuit C. Bauhinus, ut in Prodromo fatetur. *Burserus* in herbar. XX. 77. dicit se hanc nostram misisse sub nomine prædicto. Synonymon *Tournefortii* autem per se clarum est.

135. *TAMARISCUS narbonensis *Tourn:* 661. Tamarix altera, folio tenuiore, gallica *C. B:* 485. Tamarisk [Tamerisk] *Rudb:* 108. [Pentandria Monog. i Ifwetofta ex.]

§. PENTAGYNIA.

136. LINUM sativum *C. B:* 214. *Tourn:* 339. Lijn. Höör *Rudb.*
Exempl: Nodosa, Rorella, Cameraria, Statice.

§. POLYGYNIA.

Exempl: Myosuros.

Class. VI. HEXANDRIA.

§. MONOGYNIA.

A.

137. CEPA foliis styliformibus. Cepa sectilis, juncifolia, perennis *Tourn:* 383. Porrum sectivum, juncifolium *C. B:* [12 [72]. Gräs [Gräss]lök *Rudb:* 94.

138. CEPA sterilis *C. B:* 72. Cepa ascalonica *Matth:* 389. *Tourn:* 382. Echalottes vulgo ex gallis.

139. [Allium qvod] CEPA fissilis *C. B:* 72. *Tourn:* 382. Cepa sectilis *Camer. [Epit.] in Matth:* 170 [p. 325. fig.]. S. Johannis Löök.

140. CEPA foliis ventricosis, caule curtioribus, radice rubra. Cepa *Fuchs:* 430. Cepa vulgaris *C. B:* 71. Cepa vulgaris, floribus et tunicis purpurascentibus *Tourn:* 382.

---

134. Rh. glabra L: Sp. pl. I. 265, Rh. glabrum Sp. pl. II. 380; Hort. Ups. 68. 1. **135.** Tamarix gallica L: Sp. pl. I. 270, II. 386; Hort. Ups. 69. **136.** L. usitatissimum L: Sp. pl. I. 277, II. 397; Hort. Ups. 71. **137.** Allium Schoenoprasum L: Sp. pl. I. 301, II. 432; Hort, Ups. 78. 8. **138.** Allium Ascalonicum L: Sp. pl. II. 429; Hort. Ups. 79. 9. **139.**? »Allium qvod Cepa fissilis Cam. epit. 326.» Hort. Ups. 79. 10. **140.** Allium Cepa L: Sp. pl. I. 300, II. 431; Hort. Ups. 77. 3.

—— foliis ventricosis, caule curtioribus, radice alba. Cepa vulgar: floribus et tunicis candidis. *Tourn:* [382].

141. CEPA foliis ventricosis, longitudine caulem æqvantibus. Cepa oblonga *C. B:* 71. *Dod:* 675. *Tourn:* 382. Snedlök, kål-lök, piplök *Rudb:* 94.

142. PORRUM commune *Matth:* 386. Porrum commune, capitatum *C. B:* 72. *Tourn:* 382. Porrum *Tabern:* II. 192. Purlök *Rudb:* 16 [26]. Purio *Hortul.*

143. PORRUM petiolo circumvoluto, capite bulbifero. Allium sativum, alterum s. Allioprasum, caulis summo circumvoluto *C. B:* 73. *Tourn:* 383. *Moris:* II. p. 383. [387] s. 4. t. 15. f. 10. Råckenbåll.

144. ALLIUM sativum *C. B:* 73. *Tourn:* 387 [383]. Hwitlök.

145. MOLY pyrenaicum, flore luteo *Rupp:* 138. Moly latifolium, luteum, odore Allii. 1. *C. B:* 75. *Moris:* II. p. 393. s. 4. t. 16. f. 3 [4]. Moly flavo flore *Swert:* I. tab. 60. f. 2. Allium latifolium, luteum. *Tourn:* 384. Gul bärg-wildlök *Rudb:* 76.

146. MOLY alpinum, caule maculato *Rupp:* 138. Allium montanum, latifolium, maculatum *C. B:* 74. Allium alpinum, Victorialis mas *Tabern:* II. 195. Victorialis longa *Besl. Vern:* 4. fol. 13. Homeri wildlök *Rudb:* 76.

147. LEUCOJUM spatha uniflora (Leirocodon *Rudb.* [*Rupp:* enl. L. Phil. Bot. p. 146]). Leucojum bulbosum, vulgare *C. B:* 55. *Rudb: Camp. El.* II. 85. [f. 1]. Leucojum [Leucoion] bulbosum, hexaphyllum[on] *Dod:* 230. Narcisso-Leucojum vulgare *Tourn:* 387. Narcissus VII. *Matth:* 770. Viola alba *Fuchs:* 468 et 469 [486 et 487]. Stora Lökfioler *Rudb:* 64.

Calyx est spatha compressa, latere dehiscens. *Petala* 6 æqvalia, in formam campanæ digesta, ovata. *Stamina* 6 sparsa, apices totidem apicibus suis dehisc: *Pistillum* 1, apice obtuso cum levi acumine, ab apicibus liberum. *Pericarpium* ovatum, basi sc. angustiori, triloculare infra florem constitutum. *Semina* multa.

148. GALANTHOS. Leucojum [Leucoium] bulbosum, minus *C. B:* 56. *Rudb. Camp. El:* II. 96. [fig. 4]. Leucojum [Leucoion] bulbosum, triphyllum[on] *Dod:* 230. Leucojum bulbosum, præcox,

141. Allium fistulosum L: Sp. pl. I. 301, II. 432; Hort. Ups. 78. 7. **142.** Allium Porrum L: Sp. pl. I. 295, II. 423; Hort. Ups. 77. 4. **143.** Allium Scorodoprasum *β* L: Sp. pl. I. 297, II. 425; Hort. Ups. 77. 5. **144.** A. sativum L: Sp. pl. I. 296, II. 425; Hort. Ups. 76. 2. **145.** Allium Moly L. Sp. pl. I, 301, II. 432; Hort. Ups. 76. 1. **146.** Allium Victorialis L: Sp. pl. I. 295, II. 424; saknas i Hort. Ups. **147.** L. vernum L: Sp. pl. I. 289, II. 414; Hort. Ups. 74. **148.** Galanthus nivalis L: Sp. pl. I. 288, II. 413; Hort. Ups. 73.

minus *Clus: Pan.* 182. Narcisso-leucojum trifolium, minus *Tourn:* 387. Narcissus s. Leucojum bulbosum, minus, præcox, tribus petalis albis, majoribus [minoribus], cingentia [cingentibus] terna minora herbacei coloris *Moris:* II. p. 364. s. 4. t. 9. f. 23. Galanteer.

In charactere a priori omnibus fructificationis partibus diversa, hinc necesse sit, ut novum ab hac construatur genus. — Galanthos dixi a *γαλα* lac et *ανθοσ* flos, ob colorem floris lacteum et album. *Calyx* est spatha compressa, latere dehiscens, propria. *Petala* 6, qvorum 3 alterna ovalia, concava, 3:a interiora, emarginata, constituunt cylindrum antecedentibus dimidio minorem. *Stamina* 6 et totidem apices a latere dehiscentes. *Pistillum* 1 acutum, ab apicibus undiqve compressum. *Pericarpium* membr: globosum, 3 loculare, infra florem positum. *Semina* plurima.

149. NARCISSUS (flore singulari) spatha uniflora, corolla petalis æqvali, *fl. simplici.* Narcissus sylvestris, pallidus, calyce [calice luteo] *C. B:* 52. *Tourn:* 353 [356]. Narcissus luteus, sylvestris [silvestris] *Dod:* 227. Pseudo-Narcissus luteus, simplici [& gemino] flore *Tabern:* II. 311. Blekgul Narcis med long kalk *Rudb:* 78.

—— fl: singulari, corolla petalis æqvali, *fl. pleno.* Narcissus multiplex, totus flavus *C. B:* 54. *Tourn:* 357.

150. NARCISSUS flore singulari, corolla petalis breviori, *fl. simplici.* Narcissus albus, circulo purpureo *C. B:* 48. *Tourn:* 353. Narcissus medio purpureus *Dod:* 222. Gemena hwita Narcisser *Rudb:* 78.

—— (flore singulari) spatha uniflora, corolla petalis breviori, *flore pleno.* Narcissus totus niveus, multiplex *C. B:* 54. *Tourn:* 357. Narcissus albus, pleno flore *Swert:* I. tab. 26. f. 5. Dubbla hwita Narcisser [*Rudb:* 78]. Påsklilior.

151. NARCISSUS (floribus pluribus) spatha multiflora, corolla petalis breviori. Narcissus medio-luteus, copioso flore, odore gravi *C. B:* 50. *Rudb. Camp. El:* II. 37 [p. 57. fig. XI]. *Tourn:* 354. Narcissus medio luteus alter *Dod:* 224. Mångblommat hwit [hwijt] Narciss med safrans kalk *Rudb:* 78.

152. TRADESCANTIA s. Ephemerum virginianum *Rupp:* 55. Ephemerum phalangoides, tripetalum, [non repens] virginianum, gramineum, flore coeruleo, minore *Moris:* III. p. 606. s. 15. t. 2. f. 4. Moly s: Phalangium virgineanum *Rudb. Camp. El:* II. 166 [fig. XVIII].

---

149. N. Pseudo-Narcissus L: Sp. pl. I. 289, II. 414; Hort. Ups. 74. 2. **150.** N. poëticus L: Sp. pl. I. 289, II. 414; Hort. Ups. 74. 1. **151.** N. Tazetta L: Sp. pl. I. 290, II. 416; Hort. Ups. 74. 3. **152.** T. virginiana L: Sp. pl. I. 289, II. 411; Hort. Ups. 73.

Allium s. Moly virginianum *C. B. App:* 516. Kort nöje. Wirginisk Spessört blå *Rudb:* 88.

Tradescantia probe distinguenda sit a *Commelina*, ambæ enim sub Ephemeri nomine a qvibusdam numerantur.

B.

153. PHALANGIUM in caule simplici floribus sparsis. Phalangium non ramosum, minus *Rudb. Camp. El.* II. 183. Phalangium parvo flore s. minus, [non] ramosum *C. B:* 29. *Tourn:* 368. Phalangium pulchrius non ramosum *J. B:* II. 635. Ogrenug Spessört *Rudb:* 88.

154. ORNITHOGALUM floribus in caule sparsis, homomallis. Ornithogalum majus, spicatum, flore albo *C. B:* 70. *Tourn:* 379. Ornithogalum spicatum, albo flore, monspessulanum *J. B:* II. 628. Neapolitanisk Stierneblomma *Rudb:* 84.

155. ORNITHOGALUM floribus in umbellam congestis. Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium *C. B:* 70. *Tourn:* 378. Ornithogalum spicatum *Swert:* I. t. 57. f. 2. Eliocarmos [*Ηλιοχαρμος*] *Reneal:* 88 [tab. 87]. Stierneblomma gemen *Rudb:* 82.

156. SCILLA floribus per caulem sparsis. Ornithogalum coeruleum, byzantinum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, coeruleus, amoenus *C. B:* 46. Peruwianisk Hyacint blå *Rudb:* 54.

157. SCILLA floribus in spicam congestis, stellatis. Ornithogalum bifolium, germanicum, coeruleum *Tourn:* 380. Hyacinthus stellaris, bifolius, germanicus *C. B:* 45. Twåbladig stiern-Hyacint blå *Rudb:* 54.

158. SCILLA floribus in spicam congestis, (cirrosis) scirrhosis. Hyacinthus comosus, hispanicus *C. B:* 42. *Rudb: Camp. El:* II. 22 [fig. IV]. Grenful Hyacint *Rudb:* 56.

Flores hactenus non examinavi, hinc incertus sum, utrum ad hoc genus pertineat vel ad seqvens.

159. MUSCARI (floribus globosis) petalo globoso. Muscari arvense, juncifolium, coeruleum, minus *Tourn:* 348. Hyacinthus racemosus, coeruleus, minor, juncifolius *C. B:* 43. Hyacinthus racemosus *Dod:* 217. Hyacinthus Botryoides, coeruleus *Clus: Pan.* 205. Drufwe Hyacint blå *Rudb:* 54.

---

153. Anthericum Liliago L: Sp. pl. I. 310, II. 445; Hort. Ups. 83. 4. **154.** O. narbonense L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 312, Sp. pl. II. 440; saknas i Hort. Ups. **155.** O. umbellatum L: Sp. pl. I. 307, II. 441; Hort. Ups. 84. 2. **156.** Sc. amoena L: Sp. pl. I. 309, II. 443; saknas i Hort. Ups. **157.** Sc. bifolia L: Sp. pl. I. 309, II. 443; saknas i Hort. Ups. **158.**? Hyacinthus? **159.** Hyacinthus racemosus L: Sp. pl. I. 318, II. 455; saknas i Hort. Ups. eller Hyacinthus botryoides L: Sp. pl I. 318, II. 455; Hort. Ups. 85. 4.

160. MUSCARI (floribus ovatis) petalo ovato. Muscari obsoletiore flore *Tourn:* 348. Muscari *Clus: Panon.* 201. Hyacinthus racemosus, moschatus *C. B:* 43. *Rudb. Comp. El.* II. 25 [fig. VIII]. Bulbus vomitorius *Matth:* 415. Desmans Hyacint askferga *Rudb:* 54.

161. HYACINTHUS orientalis, caule maculato *C. B:* 44. *Tourn:* 345. Hyacinthus orientalis *Matth:* 669. Hyacinthus orientalis, exalbidus *Tourn:* 345. Turkiska Hyacinter *Rudb:* 52 et 54.

Variationes hujus plantæ innumeræ propemodum et infinitæ qvoad colorem, plenitudinem, tempusqve florendi existunt, qvas recensere otiosis hortulanis merito relinqvimus.

162. ALOË apice foliorum in aculeum desinente. Aloë folio in oblongum aculeum abeunte *C. B:* 286. *Tourn:* 366. *Moris:* II. p. 415. s. 4. t. 22. f. 2 et 3. Aloë mucronato folio, americana, major. *Munt: Aloid:* p. 8 *[De vera antiquorum Herba Britannica]* fol. 3. Aloë ex America *Dod:* 355. Aloë spuria *Rupp:* 364.

Floruit NORÆ [Noor i Knifsta socken och Upsala län] 1708 a Septembri per totam hyemem gelidissimam, cujus figuram dedit *Soph. Elis. Brenner Poëtiska dichter* pag. 222 et 229 [224].

163. ALOË africana, flore rubro, folio maculis ab utraqve parte albicantibus notato *Commel: H. var.* t. II. p. 15. f. 8.

164. ALOË vulgaris *C. B:* 286. *Tourn:* 366. Aloë. *Matth:* 463. Aloë vera, vulgaris *Munt: Aloid.* p. 17. *[De vera antiqu. Herba Brit.]* Sempervivum Hortulanis. Gemen Aloë.

In conclave suspensus, oleo interdum irrigatus, per totum annum solo aëre nutritur et vivit.

165. ALOË verrucis osseis glabrisqve exasperata. Aloe africana, margaritifera, minor *Rupp:* 261.

166. ALOË foliis in capitula coniformia, laxa, echinata congestis. Aloë humilis, africana, arachnoidea *Munt: Al:* fig. 27.

167. ALOË foliis oblongis, obtusis, spinis destitutis sibimet a dorso seqventibus. Aloe africana humilis, folio ex albo et viridi variegato *Munt: Al:* fig. 28.

---

160. Hyacinthus Muscari L: Sp. pl. I. 317, II. 454; Hort. Ups. 85. 3. **161.** H. orientalis L: Sp. pl. I. 317, II. 454; Hort. Ups. 85. 1. **162.** Agave americana L: Sp. pl. I. 323, II. 461; Hort. Ups. 87. **163.** A. disticha L: Sp. pl. I. 321, II. 459; Hort. Ups. 86. 4. **164.** A. perfoliata* vera L: Sp. pl. I. 319, π vera L: Sp. pl. II. 458; Hort. Ups. 86. 2. **165.** A. pumila margaritifera γ L: Sp. pl. I. 322, II. 460; saknas i Hort. Ups. **166.** A. pumila δ Arachnoidea L: Sp. pl. I. 322, II. 460; Hort. Ups. 86. 5. β. **167.** A. variegata L: Sp. pl. I. 321, II. 459; Hort. Ups. 87. 9.

168. GLORIOSA. Yucca [Yuca] foliis Aloës *C. B:* 91. *Dill: Nov. pl. gen:* [pag.] 111. char. [tab. V]. *Moris:* II. p. 419. s. 6 [4]. t. 23. f. 1. Indianisk mångblomat Jucka *Rudb:* 120.

Flores accurate examinati monopetali sunt, ut recte pronunciavit *Boerhaave in Indice altero.*

C.

169. HEMEROCALLIS (Tuberosa) floribus luteis. Liliasphodelus luteus *Clus: Pan.* 144. Lili-Asphodelus luteus *Tourn:* 344. [Liliosphodelus luteus] *Swert:* I. t. 47. Lileum luteum, Asphodeli radice *C. B:* 80. Asphodelus liliaceus, luteus [I] *Tabern:* II. p. 346. Assphodel lillior gula *Rudb:* 66.

170. HEMEROCALLIS (Tuberosa) floribus fulvis. Lilio-Asphodelus phoeniceus *Tourn:* 344. Lileum rubrum, Asphodeli radice *C. B:* 80. Asphodelus liliaceus, luteus [rubens II] *Tabern:* II. 346. Assphodel Lillior röda *Rudb:* 66.

171. TULIPA petalis ovatis, obtusis, (varie coloratis). Tulipa præcox, varia *C. B:* 57. Tulpaner af åtskillig coleurer *Rudb:* 114.

Tot variationes hujus plantæ qvoad colorem petalorum qvot dies in anno, si non plures, qvas Hortulanis committimus. Vid. *Tournefort.* etc.; sufficiat idcirco nominare seqventem.

—— petalis ovato obtusis, laciniatis et punctatis. Tulipa lutea, lituris qvibusdam viridibus et sangvineis distincta, flore maximo, laciniato *Tourn:* 376. Tulipa flore luteo, rubro variegato, petalis laciniatis *Rudb. Camp. El.* II. 108. Monstrosa *Hortul.*

172. TULIPA petalis (oblongis) ovato-acutis. Tulipa præcox, lutea *C. B:* 57.

173. FRITILLARIA flore unico, ore patente, *fl. albis.* Fritillaria alba, præcox *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Hwit [Hwijt] daamblomma *Rudb:* 44.

—— fl. unico, ore patente, *fl. albo maculis purpurascent.* Fritillaria alba, variegata *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Lifärga Daamblomma *Rudb:* 46.

---

168. Yucca gloriosa L: Sp. pl. I. 319, II. 456; Hort. Ups. 88. 1. **169.** H. Lilio Asphodelus *α* flavus L: Sp. pl. I. 324, H. flava Sp. pl. II. 462; Hort. Ups. 88. 1. *β.* **170.** H. Lilio Asphodelus *β* fulvus L: Sp. pl. I. 324, H. fulva Sp. pl. II. 462; Hort. Ups. 88. 1. *α.* **171—172.** T. gesneriana L: Sp. pl. I. 306, II. 438; Hort. Ups. 82. **173—174.** Fr. Meleagris L: Sp. pl. I. 304, II. 436; Hort. Ups. 81. 1.

—— fl. unico, ore patente, *fl. purpurascente, maculis albis.* Fritillaria præcox, purpurea, variegata *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Meleagris *Dod:* 233. *Reneal:* 147.

—— fl. unico, ore patente, *fl. pleno.* Fritillaria præcox, foliolis octonis aut duodenis *C. B:* 64. Dubbel Daamblomma *Rudb:* 46. Damspehlsblomma.

174. FRITILLARIA floribus in summo caulis plurimis, petalis cylindraceis, ore contracto. Fritillaria polyanthos, flavo-viridis *C. B:* 64. *Tourn:* 377. Askefärga Daamblomma *Rudb:* 46.

175. IMPERIALIS. Corona imperialis *Dod:* 202. *Tourn:* 372. *S. Paul.* 45 [49]. Lilium s. Corona imperialis *C. B:* 79. Tusai sive Lilium persicum *Clus: Pan.* 123 & 126. Kejsarkrona, Kromperian, Konungzkrona *Rudb:* 34.

—— foliis stellatis.

176. MARTAGON sylvaticum *Rupp:* 118 [134], *fl: ferrugineis.* Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente *C. B:* 77. *Tourn:* 370. Lilium flore nutante, ferrugineo [duplex], majus et minus *J. B:* II. 692. Kroklilior[lillior] *Rudb:* 66.

177. MARTAGON humilius, *floribus albis.* Lilium floribus reflexis, montanum, flore albicanti *C. B:* 77. *Tourn:* 370. Hwita Krok lilior [Hwijta Krook lillior] *Rudb:* 66.

178. LILIUM ungvibus petalorum glabris et integris. Lilium album *S. Paul:* 271. Lilium *Matth:* 547. *Fuchs:* 364. Lilium album vulgare *Tourn:* 360. Lilium album, flore erecto et vulgare *C. B:* 76. Hwita Lillior *Rudb:* 66.

179. LILIUM ungvibus petalorum (canali villosa insculptis) barbatis, caule bulbifero. Lilium purpureo-croceum, majus *C. B:* 76. *Tourn:* 369. Brandgula Lillior med knoppar til blana *Rudb:* 66.

D.

180. ASPARAGUS sativa *C. B:* 489. *Tourn:* 300. Asparagus *Matth:* 349. *S. Paul:* 25. Aparagus hortensis *Dod:* 691. Spargis *Rudb:* 12.

181. *RUSCUS florem e medio nudi folii proferens. Ruscus *C. B:* 470. *Matth:* 751. Ruscus myrtifolius, aculeatus *Tourn:* 79. Lauro-

---

175. Fr. imperialis L: Sp. pl. I. 303, II. 435; Hort. Ups. 82. 3. **176—177.** Lilium Martagon L: Sp. pl. I. 303, II. 435; Hort. Ups. 81. 3 & 4. **178.** L. candidum L: Sp. pl. I. 302, II. 433; Hort. Ups. 80. 1. **179.** L. bulbiferum L: Sp. pl. I. 302, II. 433; Hort. Ups. 80. 2. **180.** A. officinalis γ altilis L: Sp. pl. I. 313, II. 448; Hort. Ups. 84. **181.** R. aculeatus L: Sp. pl. I. 1041, II. 1474; Hort. Ups. 300. 1.

taxa Myrsinites, nostras, foliorum cuspide aculeato *Pluck. Alm:* 210. Stickelgräs, Musetorn *Rudb:* 102.

182. *RUSCUS florem e medio folii sub ligula emittens. Ruscus angustifolius, fructu folio innascente *Tourn:* 79. Laurus alexandrina, fructu pediculo insidente *C. B:* 304. Hippoglossum [Hyppoglossum] *Matth:* 471 [741]. Lauro-taxa Plinii *Column.* εκφ. 166.

Florem i. e. stamina, apices et pistillum Rusci hactenus non vidi, hinc incertus sum, qvo referam.

183. *HEDERA *Cæsalp.* Hedera major sterilis *C. B:* 305. Hedera arborea *Tourn:* 613. Gundelreef, Träwefla *Rudb:* 50.

In sylvis rarissime reperitur.

184. *BERBERIS *Lob. Adv.* Berberis dumetorum *C. B:* 454. *Tourn:* 614. Crespinus *Matth:* 134. Suurbär, Berberis *Rudb:* 84.

185. ACORUS petalodes, foliis ancipitibus. Acorus verus seu calamus aromaticus officinarum *C. B:* 34. Acorum legitimum *Clus: Pan.* 259. Typha aromatica, clava rugosa *Moris:* III. 246. [s. 8. t. 13. f. 4]. Kalmus *Rudb:* 4.

[Till Gynandria Hex. i Leufsta ex.]

185½. CONVALLARIA foliis ad genicula stellatim dispositis. Polygonatum angustifolium non ramosum *C. B:* 303. *Tourn:* 78. Polygonatum angustifolium I. *Tabern:* II. 434. Smalbladigh geteram *Rudb:* 92.

Exempl. A. Commelina.
B. Stellaris Dill., Convallaria, Leontopetalum.
C. Methonica, Erythronium.
D. Smilax, Ananas.

§. TRIGYNIA.

186. COLCHICUM commune *C. B:* 67. *Tourn:* 348, fl. albis l. carneis l. purpureis. Colchicum *Fuchs:* 356 c. flore 357 cum fructu.

—— pleno flore *C. B:* [69]. *Tourn:* [349]. var. col. [Hwijt] Höst tidlösa. Nakot jungfru [Nakut iungfru] *Rudb:* 32.

Autumno floret, proxima æstate caulem, folia, fructumqve profert, qvod in plantis singulare est.

---

182. R. Hypoglossum L: Sp. pl. I. 1041, II. 1474; Hort. Ups. 300. 3. **183.** H. Helix γ L: Sp. pl. I. 202, II. 292; saknas i Hort. Ups. **184.** B. vulgaris L: Sp. pl. I. 330, II. 471; saknas i Hort. Ups. **185.** A. Calamus α vulgaris L: Sp. pl. I. 324, II. 462; saknas i Hort. Ups. [**185½.** C. verticillata L: Sp. pl. I. 315, II. 451; saknas i Hort. Ups.] **186.** C. autumnale L: Sp. pl.I. 341, II. 485; Hort. Ups. 90.

187. LAPATHUM sanguineum *Munt*; *Brit:* p. 211. descr., 113 fig. *Lob: ic.* I. tab. 290. Lapathum folio acuto, rubente *C. B:* 115. *Tourn:* 504. *Moris:* II. p. 579. s. 5. t. 27. f. 6. Blodröd hästsyra *Rudb:* 62. Blodfull hästsyra.

188. ACETOSA foliis ovatis, (ad basin auritis) hastatis. Acetosa rotundifolia, hortensis *C. B:* 114. *Tourn:* 503. *Moris:* II. p. 583. s. 5. t. 28. f. 9. Acetosa romana, rotundifolia *Munt. brit.* p. 224. fol. 200. Acetosa hortensis *S. Paul:* 154. Acetosa sativa, franca, rotundifolia [Acetosa romana] *Franck. Spec.* [ed. II, 1659 p. 1]. Oxalis satiua, franca, rotundifolia, repens *Lob: ic:* I. tab. 292. Romersk syra *Rudb:* 2. [Taam Fransk Syra *Joh. Franckenii Speculum* p. 1.]

Exempl. Triglochin.

§. HEXAGYNIA.

Exempl. Damasonium.

§. POLYGYNIA.

Exempl. Alisma.

Class. VII. HEPTANDRIA.

§. MONOGYNIA.

189. *CASTANEA foliis digitatis. Castanea folio multifido *C. B:* 479 [419]. Castanea eqvina *Matth:* 624 [163]. *Clus: Pan.* 6. Hippocastanum *Riv: irr: pent:* [t. 350]. Hippocastanum vulgare *Tourn:* 612. Castanieträ *Rudb:* 26.

Exempl. Trientalis.

Class. VIII. OCTANDRIA.

§. MONOGYNIA.

190. OENOTHERA. Onagra latifolia *Tourn:* 302. Lysimachia lutea, corniculata *C. B:* 245. *App.* 516. Lysimachia lutea, corni-

---

187. Rumex sanguineus L: Sp. pl. I. 334, II. 476; Hort. Ups. 89. 1. **188.** Rumex scutatus L: Sp. pl. I. 337, II. 480; Hort. Ups. 59. 2. **189.** Æsculus HippoCastanum L: Sp. pl. I. 344, II. 488; Hort. Ups. 92. **190.** Œ. biennis L: Sp. pl. I. 346, II. 492; Hort. Ups. 94.

culata, non papposa, virginiana, major *Moris:* II. 271. [s. 3. t. 11. f. 7]. Wirginianisk Wijdegräs *Rudb:* 70.

191. EPILOBIUM hirsutum, magno [majore] flore et specioso *Dill:* 131. Chamænerion villosum, magno flore, purpureo *Tourn:* 303. Lysimachia siliquosa, hirsuta, major, fl. [majore] purpureo *C. B:* 245. Lysimachia purpurea *Fuchs:* 491.

192. RUTA *Matth:* 493. Ruta hortensis latifolia *C. B:* 336. *Tourn:* 257. Ruta graveolens hortensis *Dod:* 119. Ruta *Rudb:* 102. Wijnruta *Hortul.*

193. MELIANTHUS africanus *H. L. B.* 414. c. fig. [p. 415]. *Tourn:* 431. Melianthus africanus, Pimpinellæ foliis, amplissimis, glaucis *Moris:* III. 517. Pimpinella spicata, africana, maxima *Bart: Act. Haffn:* II. 258 [58]. Honungs mun.

In Horto Regio ad templum S. Jacob.

194. CARDAMINDUM majus *Riv: tetr. irr. [pent.]* [tab. 324]. Cardamindum ampliore folio et majore flore *Tourn:* 430. Viola indica, scandens, Nasturtii sapore, maxima, odorata *Herm.* [p. 628 t.] 629. fig. Stor indianisk krasse.

In hortis nostris freqvens.

195. CARDAMINDUM minus. Cardamindum minus et vulgare *Tourn:* 430. Nasturtium indicum minus [majus] *C. B:* 306. Nasturtium indicum *Dod:* 420. Indianisk krasse (: then mindre :) *Rudb:* 80.

196. DAPHNE in hortis rarius floret.

Exempl. Hypopithys, Pavia, Vaccinium, Erica.

§. DIGYNIA.

Exempl: Acer, Chrysosplenium.

§. TRIGYNIA.

197. BISTORTA major, radice magis intorta *C. B:* 192. *Tourn:* 511. Serpentaria major [mas] s. Bistorta *Fuchs:* 772 fig. [p. 773]. Then större Ormaroot *Rudb:* 18.

---

191. E. hirsutum L: Sp. pl. I. 347, II. 494; saknas i Hort. Ups. **192.** R. graveolens γ L: Sp. pl. I. 383, II. 548; Hort. Ups. 102. **193.** M. major L: Sp. pl. I. 639, II. 892; Hort. Ups. 181. **194.** Tropæolum majus L: Sp. pl. I. 345, II. 490; Hort. Ups. 93. 1. **195.** Tropæolum minus L: Sp. pl. I. 345, II. 490; Hort. Ups. 93. 2. **196.**? D. Laureola L: Sp. pl. I. 357, II. 510; Hort. Ups. 94. **197.** Polygonum Bistorta L: Sp. pl. I. 360, II. 516; Bistorta Hort. Ups. 95.

198. FAGOPYRUM caule erecto. Fagopyrum vulgare erectum *Tourn:* 511. Erysimum Theophrasti, folio hederaceo *C. B:* 27. Frumentum saracenicum *Matth:* 305. Boohwete *Rudb:* 42.

In campis Scanensibus qvotannis maxima in copia seritur, heic ob superveniens frigus raro maturatur.

Exempl: Polygonum.

§. TETRAGYNIA.

Exempl: Potamogeton, Potamopithys, Arenaria, Paris.

Class. IX. ENNEANDRIA.

§. TRIGYNIA.

199. RHEUM. Raponticum thracicum *Alpin: de Rhap:* c. fig. opt. Rhabarbarum forte Dioscoridis et officinarum *Tourn:* 89. Rhabarbarum rotundifolium [fimbriatum] verum *Munt: Brit.* 192. fol. 15. Rhapoticum folio Lapathi majoris, glabro; Rha et Rheum Dioscoridis *C. B:* 116. Lapathum exoticum, folio amplissimo instar foliorum Brassicæ *Rupp: alt.* 44. Hästesyra, Munkesyra, Munke Rhabarber *Rudb:* 62.

§. HEXAGYNIA.

Exemp: Butomus.

Class. X. DECANDRIA.

§. MONOGYNIA.

200. PORTULACA foliis inverse ovatis. Portulaca sativa *Dod:* 650. Portulaca latifolia, sativa *C. B:* 288. *Tourn:* 236. Portulaca hortensis *Fuchs:* 112. Portulaca *S. Paul:* 323. Portulak *Rudb:* 92.

201. GERANIUM foliis alternatim pinnatis, petiolis multifloris. Geranium Cicutæ folio, moschatum *C. B:* 319. *Tourn:* 268. Geranium supinum *Dod:* 63. Desmans tranenääf *Rudb:* 48.

---

198. Polygonum Fagopyrum L: Sp. pl. I. 364, II. 522; Helxine Hort. Ups. 96. **199.** Rh. Rhaponticum L: Sp. pl. I. 371, II. 531; Hort. Ups. 98. **200.** P. oleracea *β* L: Sp. pl. I. 445, II. 638; Hort. Ups. 146. **201.** G. cicutarium *β* moschatum L: Sp. pl. I. 680; ?G. moschatum L: Sp. pl. II. 951; saknas i Hort. Ups.

202. GERANIUM foliis cordiformibus, marginibus laceris, obtuse-serratis. Geranium folio Althææ *C. B:* 318. *Tourn:* 268. Geranium VI *Matth:* 568. Tranenääf med Ibirootz blaad *Rudb:* 48.

203. GERANIUM foliis peltatis, laceris, petiolis bifloris. Gruinalis petalis fuscis, reflexis *Rupp:* 117. Geranium phæum s. fuscum, petalis reflexis [rectis] s. planis *Moris:* II. 516 [515]. *Tourn:* 267. Geranium montanum, fuscum *C. B:* 318. Geranium batrachoides [batrachiodes] hirsutum, flore atrorubente *C. Bauh.* [*Pin* p. 318]. *Burs:* [herb. viv. vol]. XVIII. 36. Gruinalis montana, petalis nigrofuscis et obscuris, planioribus *Rupp:* 117 [Fl. Jenens. (ed. I.) 1718 p. 117]. Bruun tranenääf thet mindre med fläckiotta blan *Rudb:* 46.

204. GERANIUM batrachioides [batrachiodes] flore variegato *C. B:* 318. *Tourn:* 267. Geranium batrachioides [album &] ex albo cum coeruleo colore varium *J. B:* III. 476. Tranenääf med blå och wijta ränder i blomman *Rudb:* 48.

Exempl: Ledum, Daphne, Pyrola, Fabago, Harmala, Tribulus.

§. DIGYNIA.

205. TUNICA hortensis varia, simplex et plena *Rupp:* 105. Caryophyllus hortensis, simplex, flore majore *C. B:* 208. Caryophyllus sylvestris, major, vulgatior *Lob: ic.* I. 440.

—— Caryoph. multiplex *C. B:* 207. Desmans Näglikor.

Variationes hujus infinitæ existunt qvoad colorem, magnitudinem et plenitudinem.

206. TUNICA perennis, floribus laciniatis, albis. Caryophyllus flore tenuissime dissecto, albo *C. B:* 210 [209]. *Tourn:* 331. Caryophyllus plumarius *Tabern:* Ic: 286.

207. TUNICA floribus plurimis in capitulum setis intertextum congestis.

Fl. rubris. Caryophyllus barbatus, hortensis, latifolius, ruber *C. B:* 208. Caryophyllus hortensis, latifolius, ruber *Tourn:* 332. Caryophyllus Carthusianorum I. *Tabern:* II. 2 [pag. 3]. Thyrsis *Reneal:* t. 47 [f. 1]. Röda bårst neglickor *Rudb:* 26.

Fl. albis. Caryophyllus barbatus, hort. latif. albus *Tourn:* 332. Hwijta bårst neglickor *Rudb:* 26.

---

202. G. malacoides L: Sp. pl. I. 680, II. 952; Hort. Ups. 198. 9. *β.* **203.** G. phæum L: Sp. pl. I. 681, II. 953; Hort. Ups. 198. 10. **204.** G. pratense var. L: Sp. pl. I. 681, II. 954; saknas i Hort. Ups. **205.** Dianthus Caryophyllus L: Sp. pl. I. 410, II. 587; Hort. Ups. 104. 1. **206.** Dianthus plumarius L: Sp. pl. I. 411, II. 589; Hort. Ups. 105. 4. **207.** Dianthus barbatus L: Sp. pl. I. 409, II, 586; Hort. Ups. 105. 6.

Fl. albis et rubris simul. Caryophyllus barbatus, hort. latifol. diversicolor *C. B: Tourn:* 332. Brokota borstnäglickor.

208. SAPONARIA foliis ovatis. Saponaria major, lævis *C. B:* 206. Saponaria vulgaris, simplex *Moris:* II [p. 547] s. 5. t. 22. f. 52. Saponaria [II] *Dod:* 179. *Tab:* II. p. 414. Lychnis sylvestris, qvæ Saponaria vulgo *Tourn:* 336. Såpegräs, Höst neglikor *Rudb:* 102.

209. SAPONARIA foliis oblongis, extrorsum latioribus. Lychnis hirsuta [hirta], minor, flore variegato *H. R. P.* 99. *T.* 338. Lychnis hirsuta, flore eleganter variegato *Raj: H.* [tom. II. lib. XIX. p.] 997.

Qvinqve vulnera Christi *Hortul:*

Exemp: Saxifraga.

§. TRIGYNIA.

210. RESEDA foliis pennatim divisis. Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo *Moris:* [III. p. 615]. *Tourn:* 423. Reseda alba *J. B:* 3. b. 467. Spirblomma hwit [hwijt] *Rudb:* 98.

[Till Polyandria Trig. i Ifwetofta ex.]

211. CUCUBALUS *Tourn:* 339. Alsine scandens, baccifera *C. B:* 250. Alsine repens Clusii *Lob:* ic. 263. Cucubalus [Cacubalum] qvibusdam, vel Alsine baccifera *J. B:* II. 175. Clusii krypande hönsegräs med stora bär *Rudb:* 6.

212. MUSCIPULA foliis sempervirentibus. Lychnis frutescens myrtifolia, Behen albo similis *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Ocymoides [Ocimoides Matthioli arboreum et] fruticosum *Camer. Hort.* p. 109 t. XXXIII. Natt Näglicka.

213. MUSCIPULA hispanica, latifolia, umbellata, lævis *Rupp:* 112. Lychnis viscosa, purpurea, latifolia, lævis *C. B:* 205. *Tourn:* 335. Viscaria sativa *Tabern:* II. 14. Armerius flos IV. *Dod:* 179 [176].

In Scania sponte. In hortis sata caules profert tenuiores, floresqve magis sparsos, ut diversam facile judicares. Ab Hortulanis pro Centaurio male habetur.

Exemp: Alsine, Sagina, Behen.

---

208. S. officinalis L: Sp. pl. I. 408, II. 584; Hort. Ups. 106. 1. **209.** Silene quinquevulnera L: Sp. pl. I. 416, II. 595; Hort. Ups. 113. 8. **210.** R. alba L: Sp. pl. I. 449, II. 645; Hort. Ups. 149. 1. **211.** C. baccifer L: Sp. pl. I. 414, C. bacciferus L: Sp. pl. II. 591; Hort. Ups. 109. 1. **212.**? Silene fruticosa L: Sp. pl. I. 417, II. 597; Hort. Ups. 111. 2. **213.** Silene Armeria L: Sp. pl. I. 420, II. 601; Hort. Ups. 110.

§. PENTAGYNIA.

214. LYCHNIS hirsuta, flore coccineo *C. B:* 203. *Tourn:* 334. Lychnis calcedonica *Tabern:* II. 9. Flos constantinopolitanus *Dod:* 178, Studenteroser *Rudb:* 68.

215. CORONARIA *fl. saturate-purpureis.* Lychnis coronaria Dioscoridis sativa, flore rubro et velut flammeo, fulgente *Tourn:* 334. Lychnis coronaria *Dod:* 70 [170]. Marieroser röda *Rudb:* 68.

—— *fl. carneis.* Lychnis coron. Diosc. sat. fl. dilute-rubente *C. B:* 203 *Tourn:* 334. Marieroser hwita [hwijta] *Rudb:* 68.

216. OXALIS caule ramosa. Oxytriphyllum ramosum. Oxys lutea *Tourn:* 88. Oxys floribus luteis *Tabern:* II. 227. Trifolium acetosum, corniculatum *C. B:* 330. Trifolium acetosum, corniculatum, luteum, minus, repens et etiam procumbens *Moris:* II. p. 183. s. 2. t. 17. f. 2. Guul haresyra *Rudb:* 84.

Exemp: Cerastium, Spergula, Sedum.

§. DECAGYNIA.

217. PHYTOLACCA americana, majori fructu *Tourn:* 299. Solanum virginianum, rubrum, maximum, racemosum, baccis torulis canaliculatis *Moris:* III. p. 522. s. 13. t. 1. f. 22. [Solanum racemosum, magnum, virginianum, rubrum *Park.*] Sminkbär.

Class. XI. DODECANDRIA.

§. MONOGYNIA.

218. ASARUM foliis orbiculatis, dissectis. Asarum *C. B:* 197. *Matth:* 32. *Tourn:* 501. *S. Paull:* 23. *Fuchs:* 10. Spyört, Hasselört *Rudb:* 12.

Exemp: Ænopodophyllum.

§. DIGYNIA.

Exemp: Agrimonia.

---

214. L. chalcedonica L: Sp. pl. I. 436, II. 625, Hort. Ups. 115. **215.** Agrostemma Coronaria L: Sp. pl. I. 436, II. 625; Hort. Ups. 115. 1. **216.** O. corniculata L: Sp. pl. I. 435, II. 623; Hort. Ups. 116. **217.** Ph. americana L: Sp. pl. I. 441, Ph. decandra L: Sp. pl. II. 631; Hort. Ups. 117. **218.** A. europæum L: Sp. pl. I. 442, II. 633; saknas i Hort. Ups.

§. POLYGYNIA.

219. SEMPERVIVUM caule undiqve folioso. Sempervivum tectorum, majus *Rupp:* 152. Sedum majus, vulgare *C. B.* 283. *Tourn.* 262. Sedum majus *Fuchs:* 32. Huslök [Huuslök] *Rudb:* 104.

220. SEMPERVIVUM caule determite [determinate] folioso. Sempervivum arborescens *Rupp:* 151. Sedum [maius] arborescens *J. B:* III.. B. 686. *T.* 262. Indianisk huuslök *Rudb:* 104.

In Horto *Piperiano.*

Class. XII. EICOSANDRIA.

§. DIGYNIA.

Exemp: Cratægus.

§. TRIGYNIA.

Exemp: Aucuparia.

§. TETRAGYNIA.

Exemp: Tetragonocarpus.

§. PENTAGYNIA.

221. *MALUS pumila, qvæ potius frutex, quam arbor *C. B:* 433. *Tourn:* 633 [634]. Paradisapel *Hortul.*

Inumeras varietates malorum, a sapore, colore, magnitudine etc. desumtas, recensere inutile fere judico.

222. *PYRUS sativa, fructu æstivo, longo [oblongo], magno, partim rubro, partim albido [odorato]. *Tourn:* 629. Bon chrestier. Boncretin päron *Rudb:* 96.

223. *PYRUS sativa, fructu autumnali, sessili, saccharato, odorato, e viridi flavescente, in ore liqvescente *Tourn:* 629. Bergamotter *Rudb:* 96.

Reliqvas infinitas Pyri varietates enumerare itidem supersedeo.

---

219. S. tectorum L: Sp. pl. I. 464, II. 664; saknas i Hort. Ups. **220.** S. arboreum L: Sp. pl. I. 464, II. 664; Hort. Ups. 118. **221.** Pyrus Malus *β* paradisiaca L: Sp. pl. I. 479, II. 686; Hort. Ups. 130. **222.** P. communis *γ* pompejana L: Sp. pl. I. 479, II. 686; Hort. Ups. 130. **223.** P. communis *β* falerna L: Sp. pl. I. 479, II. 686; Hort. Ups. 130.

224. *CYDONIA fructu breviore et rotundiore *Tourn:* 633. Mala cotonea minora *C. B:* 434. Malus cydonia *Tab:* III. p. 91. Qwitten *Rudb:* 72.

Exemp: Mespilus.

§. HEXAGYNIA.

Exemp: Stratiotes.

§. OCTOGYNIA.

Exemp: Tormentilla, qvæ raro tetragyna est.

§. POLYGYNIA.

225. *POTENTILLA caule frutescente, foliis ternariis et qvinariis. Pentaphylloides fruticosum *Raj: Hist.* I. p. 616 descr. opt. Pentaphylloides rectum, fruticosum, eboracense *Moris:* II. 193. *Tourn:* 298.

225$^1/_2$. CISTUS oelandicus *Rudb.* Hort. 29. Ölands gyllenört.

226. FRAGARIA fructu parvi pruni magnitudine *C. B:* 297 [327]. *Tourn:* 296. Fragaria fructu magno *Besl. Vern:* ord. 7. fol. 8. fig. I. Stora hwijta jordgubbar *Rudb:* 44.

227. RUBUS idæus, fructu albo *C. B:* 479. *Tourn:* 614. Hwita Hallon *Rudb:* 102.

228. RUBUS caule aneoli (?), foliis ternariis [Leufsta ex.]. (Rubus caule ramoso, glabro). Rubus humilis, Fragariæ folio, fructu rubro *Rudb: fil. Act. Lit. Svec.* 1720 p. 99. *Iter lap.* 9. Fragaria Svetorum [Svevorum] fruticans *Rudb:* H. 43. Åckerbär från Norland *Rudb:* It. lap. 8. Åkerbär, honingsbär [håningzbäär] *Rudb:* H. 44.

In Helsingia sponte, unde in hortum *Celsianum* translatus. — De hac planta integram dissertationem habuit [anno 1716 *Dan. Kjellander*] *Kellander* sub præsid. Nobil. et Gen. Prof. *Ol. Rudbeck fil.*

Exemp: Qvinqvefolium, Benedicta.

---

224. Pyrus Cydonia L: Sp. pl. I. 480, II. 687; saknas i Hort. Ups. **225.** P. fruticosa L: Sp. pl. I. 495, II. 709; saknas i Hort. Ups. **225$^1/_2$.** Cistus oelandicus L: Sp. pl. I. 526, II. 741. **226.** F. vesca *β* sativa L: Sp. pl. I. 495, F. vesca *β* pratensis L: Sp. pl. II. 709; Hort. Ups. 133. **227.** R. idæus *β* L: Sp. pl. I. 493, II. 706; Hort. Ups. 133. **228.** R. arcticus L: I. 494, II. 708; saknas i Hort. Ups.

Class. XIII. POLYANDRIA.

§. MONOGYNIA.

229. *PRUNUS sativa vulgaris *Rupp:* [*Fl. Jenens. ed. alt.* p.] 106. Prunus fructu magno, crasso, subacido *Tourn:* 622. Gemena plomon.

230. *PRUNUS fructu maximo, rotundo, flavo et dulci *Tourn:* 622. Gula plommon.

231. *PRUNUS fructu minori, austero *Tourn:* 623. Pruna augusto [Augusto] maturescentia, minora et acida [austeriora] *C. B:* 443. Krikon.

232. *PRUNUS sylvestris, præcox, altior *Tourn:* 623. Pruna sylvestria, præcocia *C. B:* 444. Tyska Slånon.

233. *CERASUS sativa, fructu rotundo, rubro et acido *Tourn:* 625. Cerasus *Fuchs:* 425. Morel, Kiörssebär *Rudb:* 26.

234. *CERASUS fructu acido, serotino, succi sangvinei *Tourn:* 625. Blodkiörsebäär.

235. *CERASUS pumila *C. B:* 450. Dwärg kiörsebär.

236. *CERASUS uno pediculo plura ferens *J. B:* I [A] 223. Cerasus racemosa, hortensis *C. B:* 450. Klaas Kiörsebäär *Rudb:* 26.

237. *PERSICA molli carne et vulgaris, viridis et alba *C. B:* 440. *Tourn:* 624. Persica mala *Matth:* 182. Malus Persica. *S. Paul:* 83. Persicer *Rudb:* 72.

238. *ARMENIACA fructu majori, nucleo amaro [dulci] *Tourn:* 623. Armeniaca malus *Matth:* 199 [184]. Mala Armeniaca majora [nucleo dulci] *C. B:* 442. Appricoser *Rudb:* 72.

239. *PADUS exotica, folio amplo, crasso, sempervirente *Rupp:* 122. Cerasus folio laurino *C. B:* 450. Laurocerasus *Clus: Pan.* II et

---

229. P. domestica γ hungarica
230. » » ϑ maliformis } L: Sp. pl. I. 475, II. 680; Hort. Ups. 124.
231. » » ι augustana

232. P. insititia L: Amoen. Acad. Vol. IV. p. 273, Sp. pl. II. 680; saknas i Hort. Ups.

233. Prunus Cerasus α caproniana
234. » » η austera
235. » » ϑ pumila } L: Sp. pl. I. 474, II. 679; Hort. Ups. 125. 1.
236. » » ι avium

237. Amygdalus Persica L: Sp. pl. I. 472, II. 676; Hort. Ups. 123. 2.
238. Prunus Armeniaca L: Sp. pl. I. 474, II. 679; Hort. Ups. 124. 2.
239. Prunus LauroCerasus L: Sp. pl. I. 474, II. 678; Padus Hort. Ups. 126. 1.

app. *Camer: Hort.* p. 86. f. XXIII. *Tourn:* 628. Lagerbärsträ med körsbärsblan *Rudb:* 64.

240. *AMYGDALUS sativa, fructu majori *C. B:* 441. *Tourn:* 627. Amygdalæ *Matth:* 199. [fig. p. 200]. Mandelträ *Rudb:* 8.

241. *AMYGDALUS nana *Munt:* Hist. 34. Amygdalus pumila *Moris: Hort. Bles.* [p. 13].

242. *MYRTUS latifolia, boetica I vel foliis laurinis *C. B:* 469. *Tourn:* 640. Myrtus boetica, latifolia, domestica [sive Laurea secunda Clusii] *Lob:* ic. [II tab.] 127. Myrten bredbladig *Rudb:* 78.

243. *MYRTUS minor, vulgaris *C. B:* 469. *Torn:* 640. *Lob:* ic. 127.

244. *MYRTUS foliis minimis et mucronatis *C. B:* 469. *Tourn:* 640. Myrtus nova [nona], angustifolia *Lob:* ic. 188 [128]. Myrtus angustifolia minor *J. B:* I A. p. 513.

245. *PHILADELPHUS. Philadelphus Athenæi et Rivini *Rupp:* 79. Syringa alba s. Philadelphus Athenæi *C. B:* 398. *Tourn:* 617. Syringa alba *Tab.* III p. 133. Syringa *Lob:* ic. 102. Blomklase. Hwit [Hwijt] wild jassmin *Rudb:* 108.

246. ACTÆA. Christophoriana americana, ramosa [racemosa], baccis niveis [& rubris] *Moris:* II p. 8. s. 2. t. 1 [s. 1. t. 2.] f. 7. *Tourn:* 299. Aconitum baccis niveis *Cornut:* 76 [t. 77]. Amerikanisk drufwemunckar *Rudb:* 4.

247. CEREUS erectus, altissimus, surinamensis. *Herm: Par. Bat:* 116. Mångkant.

In horto Ulriksdahl.

248. OPUNTIA foliis subrotundis, procumbens. Opuntia vulgo herbariorum *Tourn:* 239. Ficus indica, spinoso folio, fructu majori *C. B:* 458. Ficus indica *Matth:* 211. Indianisk fikon de mindre *Rudb:* 44.

249. OPUNTIA foliis oblongo-ovalibus, spinosis, erecta. Opuntia maxima, folio spinoso, latissimo et longissimo *Tourn:* 240. Indianisk fikon *Rudb:* 44.

---

240. A. communis L: Sp. pl. I. 473, II. 677; Hort. Ups. 123. 1. **241.** A. nana L: Sp. pl. I. 473, II. 677; Hort. Ups. 124. 3. **242.** M. communis β bœtica L: Sp. pl. I. 471, M. comm. δ boetica L: Sp. pl. II. 673; Hort. Ups. 123. 1. δ. **243.** M. communis γ tarentina L: Sp. pl. I. 471, M. communis β L: Sp. pl. II. 673; Hort. Ups. 123. 1. γ. **244.** M. communis δ mucronata L: Sp. pl. I. 471, M. comm. η mucr. L: Sp. pl. II. 674; Hort. Ups. 123. 1. β. **245.** Ph. coronarius L: Sp. pl. I. 470, II. 671; Hort. Ups. 122. **246.** A. spicata β alba L: Sp. pl. I. 504, II. 722; Hort. Ups. 138. **247.** Cactus hexagonus L: Sp. pl. I. 466, II. 667; Hort. Ups. 119. 4. **248.** Cactus Opuntia L: Sp. pl. I. 468, II. 669; Hort. Ups. 120. 6. **249.** Cactus Ficus indica L: Sp. pl. I. 468, II. 669; Hort. Ups. 120. 7.

250. PAPAVER caule hispido. foliis pennatim divisis, acutis. Papaver erraticum majus, 'ῥοίας Dioscoridi, Theophrasto, Plinio *C. B:* 171. *Tourn:* 218 [238]. Större främmande åkerwaldmod *Rudb:* 86.

—— caul: hisp: foliis pennat: divis: acut. *fl. plenis.* Papaver erraticum, pleno flore *C. B: Tourn:* Dubbel åkerwaldmod *Rudb:* 86.

251. PAPAVER caule glabro, foliis obtuse laceris, *petalis integris, albis, flore simplici.* Papaver hortense, semine albo, sativum Diosc. album Plinio *C. B:* 170. *Tourn:* 237. Waldmod hwit [hwijt] *Rudb:* 84.

—— . . . . . *petalis integris, albis, flore pleno.* Papaver flore pleno, album *C. B:* 170 [171]. *Tourn:* 238. Dubbel Waldmod hwit [hwijt] *Rudb:* 86.

—— . . . . . *petalis integris, rubris, flore simplici.* Papaver hortense, nigro semine, sylvestre Dioscoridi, nigrum Plinio. *C. B:* 170. *Tourn:* 237.

—— . . . . . *petalis integris, rubris, fl: pleno.* Papaver pleno flore, nigrum *C. B:* 171. *Tourn:* 238. Dubbel röd Waldmod *Rudb:* 86.

—— . . . . . *petalis laciniatis, rubris, fl: simplici.*

—— . . . . . *petalis laciniatis, rubris, fl: pleno.*

—— . . . . . *petalis exterioribus integris, interioribus laciniatis.* Papaver cristatum *C. B:* 171. *Tourn:* 237.

252. PAPAVER fructu siliqvoso, cylindraceo. Glaucium flore luteo *Tourn:* 254. Papaver corniculatum, luteum *C. B:* 17 [171]. Papaver corniculatum, majus *Dod:* 445 [ed. 1583 p. 444 in ed. 1616].

Exemp: Capparis, Cistus, Nymphæa, Nepenthes, Genipa, Tilia.

§. DIGYNIA.

253. PÆONIA folio nigricante, splendido, qvæ mas *C. B:* 323. *Tourn:* 273. Pion han med purpur blommor. Pingstroser *Rudb:* 84.

254. PÆONIA communis vel foemina *C. B:* 323. *Tourn:* 274. Pæonia foemina, flore multiplici *Dod:* 187 [ed. 1616 p. 195]. Pingstroser med enkla blomor.

—— foemina, flore pleno, rubro, majore *C. B:* 324. *Tourn:* 274.

Qvamqvam Botanici Pæoniam in marem et foeminam distingvunt, ea tamen dioeciam non præbet. Communiter est digyna, sede sæpe etiam trigyna. (*Tournefortius* pentagynam pingit.)

---

250. P. Rhoeas L: Sp. pl. I. 507, II. 726; Hort. Ups. 136. 5. **251.** P. somniferum L: Sp. pl. I. 508, II. 726; Hort. Ups. 135. **252.** Chelidonium Glaucium L: Sp. pl. I. 506, II. 724; Hort. Ups. 137. 2. **253—254.** P. officinalis L: Sp. pl. I. 530, II. 747; Hort. Ups. 149.

255. BIPENNULA. Poterium caule spinis destituto. Sangvisorba minor, montana, lævis, hirsuta *Rupp:* 58. Pimpinella Sangvisorba, minor, hirsuta *C. B:* 160. *Tourn:* 157. *Moris:* III. p. 263. s. 8. t. 18. f. 1. [Pimpinella] Sangvisorba *Dod:* 105. Pimpinella *S. Paul:* 107.

§. **TRIGYNIA.**

256. TITHYMALUS foliis ad umbellas universales ternis, particulares geminis. Tithymalus palustris, fruticosus *C. B:* 292. *Tourn:* 87. Tithymalus maximus, oelandicus *Rudb:* H. 109. Esula palustris *Riv:* irr. tetrap. [tab. 116]. Ezula maior *Dod:* 370. Oelands Reformsgrääs *Rudb:* 110.

257. TITHYMALUS foliis ad umbellas universales plurimis, particulares geminis. Tithymalus cyparissias *C. B:* 291. Tithymalus amygdaloides, angustifolius *Tourn:* 86. Tithymalus cypressinus s. humipinus *Lob:* ic. I. 256. Esula folio Amygdali angusto *Rupp:* 261. Utlensk Reformsgräs *Rudb:* 110.

258. LUTEOLA *Dill:* 92. Reseda foliis integris. Luteola herba, Salicis folio *C. B:* 100. *Tourn:* 423. Pseudo-struthium *Matth:* 406. Lutum herba *Dod:* 81. Spyört *Rudb:* 68.

259. ACONITUM coeruleum s. Napellus I *C. B:* 183. *Tourn:* 425. *Moris:* III. p. 463. s. 12. t. 3. f. 9. Napellus flore coeruleo *Rupp:* 276. Napellus. *S. Paul:* 88. Stormhat. Fuulört medh stoor blå blomma *Rudb:* 2.

260. ACONITUM salutiferum s. Anthora *C. B:* 184. *Tourn:* 425. Napellus flore luteo *Rupp:* 275. Stormhat med gula blommor. Gifftdöda, gifftläkia *Rudb:* 2.

261. ACONITUM s. Napellus primus, flore ex coeruleo et albo variegato *C. B:* 183. *Tourn:* 425. Stormhattar med brokota blommor. Brokogh Munckekappa *Rudb:* 2.

262. ACONITUM lycoctonum, albis pallidisve floribus *C. B:* 183. Aconitum VI Matthioli *Tabern:* II. 296 [292]. Aconitum lycoctonum, fl. purpureo, fol. Plantani [Platani] *Rudb:* 1. Stormhattar med rödbleka blomor. — Fläck, lusört, ulfzgifft, ulfzroot *Rudb:* 2.

Medelpadiæ et Lapponiæ sylvis indigena est.

---

255. Poterium Sanguisorba L: Sp. pl. I. 994, II. 1411; Hort. Ups. 288. 1. **256.** Euphorbia palustris L: Sp. pl. I. 462, II. 662, saknas i Hort. Ups. **257.** Euphorbia Cyparissias L: Sp. pl. I. 461, II. 661; Hort. Ups. 142. 15. **258.** Reseda Luteola L: Sp. pl. I. 448, II. 643; saknas i Hort. Ups. **259.** A. Napellus L: Sp. pl. I. 532, II. 751; saknas i Hort. Ups. **260.** A. Anthora L: Sp. pl. I. 532, II. 751; Hort. Ups. 152. 3. **261.**? A. variegatum L: Sp. pl. I. 532, II. 750; Hort. Ups. 151. **262.** A. lycoctonum L: Sp. pl. I. 532, II. 750; saknas i Hort. Ups.

263. DELPHINIUM caule recto, ascendente. Variationes seqventes præbet. Delphinium hortense, flore majori et simplici, coeruleo, purpureo *Tourn:* 427. Consolida regalis, hortensis, flore majori et simplici *C. B:* 142.

—— hortense, flore majore et simplici, albo *Tourn:* 427.

—— . . . . . multiplici purpureo *Tourn:* 427.

—— . . . . . albo *Tourn.* 427.

—— elatius, flore incarnato *Tourn:* 427.

Riddarsporra *Rudb:* 36.

Exemp: Hypericum.

§. PENTAGYNIA.

264. AQUILEGIA *Dod:* 181.

Floribus melisolenis instructis.

Aqvilegia flore albo, simplici *Tourn:* 428.

—— hortensis, simplex, flore incarnato *C. B:* 144. *Tourn:* 428.

—— hort. simplex, fl. coeruleo *C. B: T:*

Floribus melisolenis destitutis.

Aqvilegia stellaris [stellata], flore violaceo *C. B:* 145. *Tourn:* 429.

—— flore roseo, multiplici *C. B: Tourn:.*

265. NIGELLA foliis qvinis flori suppositis. Nigella [angustifolia] flore majori, simplici, coeruleo *C. B:* 143 [145] *Tourn:* 258. Melanthium damascenum *Dod:* 301. Melanthium sylvestre *Matth:* 528. Damassens enfaldigt högmod *Rudb:* 74.

—— flore majori, pleno, coeuruleo *C. B: Tourn:* Damassens mångfaldigt högmod *Rudb:* 74.

266. NIGELLA foliis nullis suppositis. Nigella arvensis, cornuta *C. B:* 145. *Tourn:* 258. Melanthium sylvestre II *Matth:* 525 [528]. Lille högmod *Rudb:* 74.

267. AIZOUM qvod Ficoides afra, erectior, folio Calendulæ, flore aureo. *Boerh:*I. 290 [*Ind. alt.* pars prima p. 291]: Mesembrianthemum aliis. Middags blomma.

In Horto Ulriksdahl.

---

263. D. Ajacis L: Sp. pl. I. 531, II. 748; Hort. Ups. 150. 1. Jfr. Hort. Cliff. 213. **264.** A. vulgaris L: Sp. pl. I. 533. II. 752; Hort. Ups. 152. **265.** N. damascena L: Sp. pl. I. 534, II. 753; Hort. Ups. 153. 1. **266.** N. arvensis L: Sp. pl. I. 534, II. 753; saknas i Hort. Ups. **267.**? Mesembryanthemum bicolor L: Sp. pl. I. 485; M. bicolorum L: Sp. pl. II. 695; saknas i Hort. Ups.

268. *SPIRÆA foliis oblongis, serratis. Spiræa Salicis folio *Tourn:* 618. Frutex spicatus, foliis salignis, serratis *C. B:* 475. Rosespira *Rudb:* 108.

269. *SPIRÆA foliis rotundis, integerrimis. Spiræa Hyperici folio [non crenato] *Tourn:* 618. Pruno sylvestri affinis, canadensis *C. B:* 517 desc. *Pluck* phyth. CCXVIII. 5. fig. opt.

Exemp: Ascyrum.

§. HEPTAGYNIA.

Exemp: Ulmaria.

§. OCTOGYNIA.

270. CENTELLA. FLAMMULA *Rupp:* 61. *Dod:* 400. Clematis s. Flammula repens *C. B:* 300. *Tourn:* 294 [293]. Dyrt confect.

§. DODECAGYNIA.

Exemp: Filipendula.

§. POLYGYNIA.

271. ATROGENA. VITICELLA *Dill: Nov. pl. gen.* 165. Clematis [Clematitis coerulea vel] purpurea, repens *C. B:* 300. *Tourn:* 294. Clematis altera *Matth:* 617.

272. CLEMATIS [CLEMATITIS] coerulea, erecta *C. B:* 300. *Tourn:* 294. Clematis pannonica, flore coeruleo [surrecta] *J. B:* II. 129. Flammula pannonica, erecta, folio Vincetoxici, flore amplo *Rupp:* 62. Pannonisk blå sygrön *Rudb:* 30.

273. HEPATICA *Dill: nov. pl. gen.* 108. *fl. pleno.* Hepatica flore pleno, coeruleo *Rupp:* 146. Ranunculus tridentatus, vernus, fl. pleno, coeruleo *Tourn:* 287. Trifolium hepaticum, flore pleno *C. B:* 330.

—— fl. pleno, purpureo *Rupp:* 146. Ranunculus tridentatus, vernus, fl. pleno, purpureo *Tourn:* 287.

—— fl. pleno, albo [raro vel numquam occurrit *Rupp:* p. 146]. Lefwerört *Rudb:* 52.

268. S. salicifolia L: Sp. pl. I. 489, II. 700; Hort. Ups. 131. 1. **269.** S. hypericifolia L: Sp. pl. I. 489, II. 701; Hort. Ups. 131. 2. **270.** Clematis Flammula L: Sp. pl. I. 544, II. 766; saknas i Hort. Ups. **271.** Cl. Viticella L: Sp. pl I. 543, II. 765; saknas i Hort. Ups. **272.** Cl. integrifolia L: Sp. pl. I. 544, II. 767; Hort. Ups. 156. **273.** Anemone Hepatica L: Sp. pl. I. 538, II. 758; Hepatica Hort. Ups. 155.

274. ADONIS petalis subrotundis, concavis. Adonis hortensis, flore minore, atrorubente *C. B:* 178. Adonis [Eranthemum] *Dod:* 260. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore minore, atrorubente *Tourn:* 291. Bruna flickan *Hortul.*

275. ADONIS petalis oblongis, planis. Adonis montanus, perennis, flore amplo, luteo *Rupp:* 144. Adonis Hellebori radice, Buphthalmi flore *Boerh:* I. [Ind. alt. pars prima p.] 35.Adonis præcox, perennis, flore luteo, calyce plano. *Moris:* III. p. 26. s. 6. t. 9. f. 1. Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice *Tourn:* 291. Helleborus niger, tenuifolius, Buphthalmi flore *C. B:* 186. Helleborus Hippocratis *Tabern:* II. 398. Niusört [Niussroot] med fenickelsblad [Fenikåls bladh] *Rudb:* 40.

276. RANUNCULUS seminibus planis, echinatis. Ranunculus echinatus, arvensis *C. B:* 179. *Tourn:* 289. *Moris:* II. p. 440. s. 4. t. 29. f. 23. Igelkotz Smörblomster *Rudb:* 96.

277. RANUNCULUS hortensis, erectus, flore pleno *C. B:* 179. *Tourn:* 290. Ranunculus erectus, hortensis, flore pleno. *Besl: vern.* [ord. 1.] fol. 14 [13 fig. II]. Dubbla Smörblomster med rak stielk.

278. RANUNCULUS dulcis, flore pleno. *C. B:* 179. *Tourn:* 290. Dubbla smörblomster krypande.

279. RANUNCULUS (montanus) folio Aconiti, flore albo, multiplici *C. B:* 179. *Tourn:* 290. Ranunculus albus, flore denso. *J. B:* III. *app.* 860.

An ad genus Ranunculi sit referendum, pro certo determinare neqveo, flores enim simplices non vidi.

280. HELLEBORUS caule multifloro, folioso, foliis digitatis. Helleborus niger, hortensis, flore viridi *C. B:* 185. *Tourn:* 272. Helleborus niger, sylvestris, ramosus, latiore folio, deciduo *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 4. f. 4. [5.]. Elleborus niger [adulterinus], hortensis *Fuchs:* [274]. Veratrum nigrum secundum *S. Paul:* 10. Swart prustört *Rudb:* 40. Swart prustrot.

281. HELLEBORUS caule multifloro, a foliis (digitatis) distincto. Helleborus niger, foetidus *C. B:* 185. *Tourn:* 272. (Helleborus niger,

---

274. A. annua *β* atrorubens L: Sp. pl. I. 547; A. autumnalis L: Sp. pl. II. 771; Hort. Ups. 156. **275.** A. vernalis L: Sp. pl. I. 547, II. 771; saknas i Hort. Ups. **276.** R. arvensis L: Sp. pl. I. 555, II. 780; saknas i Hort. Ups. **277.** R. acris *β* L: Sp. pl. I. 554, II. 779; saknas i Hort. Ups. **278.**? R. amplexicaulis L: Sp. pl. I. 549, II, 774; saknas i Hort. Ups. **279.** R. aconitifolius L: Sp: pl. I. 551, II. 776; Hort. Ups. 156. 1. **280.** H. viridis L: Sp. pl. I. 558, II. 784; Hort. Ups. 158. 2. **281.** H. foetidus L: Sp. pl. I. 558, II. 784; saknas i Hort. Ups.

angustioribus foliis *Tourn:* 272.) (Helleborus niger, flore roseo. *C. B:* 185.) Helleborus [Elleborus] niger, sylvestris [siluestris], adulterinus, etiam hyeme [hieme] virens *J. B:* III. *app.* 880. Niuseört *Rudb:* 40.

282. HELLEBORUS caule unifolio et uniflore, foliis peltatis. Helleborus niger, tuberosus, Ranunculi folio, flore luteo *Tourn:* 272. Helleborus ranunculoides, præcox, tuberosus, flore luteo *Moris:* III. p. 459. s. 12. t. 2. f. 4. Helleboroides hyemalis *Boerh:* I [Ind. alt. pars prima pag.] 291. Aconitum *Rupp:* 249 [ed. 1718 p. 149, ed. 1726 p. 130]. Aconitum unifolium, luteum, bulbosum *C. B:* 183. Winterfägnad. Wintermunncke *Rudb:* 2.

283. *ROSA maxima, multiplex *Tourn:* 637. Rosa hollandica, rubella, [plena,] qvibusdam centifolia, spinoso frutice *J. B:* II. 37. Prowins rosor *Rudb:* 100.

284. *ROSA flore albo, pleno *Tourn:* 637. Dubbla Hwita Trägålsroser *Rudb:* 100.

285. *ROSA rubra, multiplex *C. B:* 481. *Tourn:* 637.

286. *ROSA lutea, multiplex *C. B:* 483. *Tourn:* 638. Rosa lutea, flore pleno *J. B:* II. 48.

In horto Carlbergensi.

287. *ROSA versicolor *C. B:* 481. *Tourn:* 637. Rosa semiplena, flore variegato *Volck:* [*Fl. Norib.* p. 359.]. Rödpurpur isprängda roser *Rudb:* 100.

287$^{1}/_{2}$. *ROSA sylvestris, foliis odoratis *C. B:* 485. *Tourn:* 638. Rosa aglanteria [Eglenteria IX.] *Tabern:* III. 170 [169]. Wällucktande blaadroser *Rudb:* 100. Ängelsk törne.

288. *ROSA sylvestris, flore pleno *C. B:* 483. *Tourn:* 638. Rosa eglanteria [eglentina], flore pleno *J. B:* II. 43. Gula dubbla Roser *Rudb:* 100.

289. *ROSA punicea *Cord:* [*Corn:* Canadens. plant. hist. pag.] 11. *Virg.* Ecl. V.

In horto Jacobino.

Exemp: Benedicta, Caltha, Anemone.

---

282. H. hyemalis L: Sp. pl. I. 557, II. 783; Hort. Ups. 158. 3. **283.**? R. centifolia L: Sp. pl. I. 491, II. 704; Hort. Ups. 132. *ι*. **284.** R. alba *β* L: Sp. pl. I. 492, II. 705; Hort. Ups. 132. *ϑ*. **285.** R. gallica L: Sp. pl. II. 704; Hort. Ups. 132. *β*. **286.** R. gallica *β* versicolor L: Sp. pl. II. 704; Hort. Ups. 132. *η*. **287—288.** R. eglanteria L: Sp. pl. I. 491, II. 704; Hort. Ups. 132. *ζ*. *ϰ*. **289.**? R. centifolia var.?

Classis XIV. DIDYNAMIA.

§. TETRANDRIA.

A.

290. SALVIA major, an Sphacelus Theophrasti. *Tourn:* 180. *C. B:* 237. Salvia major *Dod:* 290. Tysk Salwia *Rudb:* 102.

291. SALVIA coma purpurea. Horminum coma purpureo-violacea *Tourn:* 178. Horminum sativum *C. B:* 238. Skarlak. *Rudb:* 52.

292. HORMINUM pratense *Riv: mon. irr.* [I tab. 36.]. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore coeruleo *Tourn:* 197 [179]. Horminum pratense, foliis serratis *C. B:* 238. *Moris:* III. p. 393 [s. 11. t. 13. f. 10.].

B.

293. MOLDAVICA foliis simplicibus, foliis ad alas nullis, *fl. coeruleis.* Moldavica Betonicæ folio, flore coeruleo *Tourn:* 184. Melissa peregrina, folio oblongo *C. B:* 229. Melissa moldavica *Matth:* 550. Cedronella *Riv: apud Rupp:* 219. Pseudo-Melissa *Rivin: mon. irr.* [I tab. 73].

—— foliis simplicibus, foliolis ad alas nullis, *fl. albis.* Moldavica Betonicæ folio, flore albo *Tourn:* 184. Turkisk Melis blå och hwit *Rudb:* 74.

294. MENTHA spicata, foliis rotundis, crispis. Mentha crispa *Riv: mon. irr.* [I. tab. 50]. Mentha rotundifolia, crispa, spicata *C. B:* 227. *Tourn:* 189. Mentha crispa, danica s. germanica *Moris:* III. p. 367, s. 11, t. 6. f. 5. Kruse [Cruse] mynta *Rudb:* 74.

295. MENTHA spicata, foliis oblongis, subtus hirsutis. (Mentha sylvestris, rotundiore folio *C. B:* 227. *Tourn:* 189). Mentha sylvestris longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis. Mentha spicata, folio longiore, acuto, glabro, nigriori *J. B:* III. 2. 219 [220]. (Menthastrum folio rugoso, spontaneum, flore spicato *J. B:* III. [2.] 219.) Spirmynta *Rudb:* 74.

---

290. S. officinalis L: Sp. pl. I. 23, II. 34; Hort. Ups. 10. 1. **291.** S. Horminum L: Sp. pl. I. 24, II. 34; saknas i Hort. Ups. **292.** Salvia pratensis L: S. pl. I. 25, II. 35; Hort. Ups. 10. 2. **293.** Dracocephalum Moldavica L: Sp. pl. I. 595, II. 830; Hort. Ups. 166. 3. **294.** M. crispa L: Sp. pl. I. 576, II. 805; Hort. Ups. 168. 1. **295.** M. spicata γ rotundifolia L: Sp. pl. I. 576, M. rotundifolia L: Sp. pl. II. 805; saknas i Hort. Ups.

296. MENTHA verticillata, glabra, ad summum apicem usqve flores emittens. Mentha palustris, spicata *Riv: mon. irr.* [I. tab. 49]. Mentha rotundifolia, palustris, s. aqvatica major *C. B:* 227. *Tourn:* 182. [189]. Edel mynta *Rudb:* 74.

297. MENTHA verticillata, foliis ovalibus, integerrimis. Mentha aquatica s. Pulegium vulgare *Tourn:* 187. Pulegium *Riv: mon. irr.* [I. tab. 23]. Pulegium latifolium *C. B:* 222.

298. MENTHA verticillata, foliis ovato-acutis, medio serratis. Mentha crispa, verticillata *C. B:* 227. Mentha verticillata *Riv: mon. irr.* [I. tab. 48].

C.

299. MELISSA hortensis *C. B:* 229. *Tourn:* 193. Melissa *Riv: mon. irr.* [I. tab. 45]. Citron Melis *Rudb:* 74.

300. OCYMUM [OCIMUM] vulgatius *C. B:* 226. *Tourn:* 204. Ocymum [Ocimum] magnum *Tabern:* II. 55. Basilika *Rudb:* 82.

301. OCYMUM [OCIMUM] minimum *C. B:* 226. *Tourn:* 204. Ocymum minimum, caryophyllatum *Besl: æst.* [ord.] 7. fol. 10. f. 3. Mindre Basilika *Rudb:* 82.

In horto *Golnitziano.*

302. MAJORANA vulgaris *C. B:* 224. *Tourn:* 199. Majorana *Riv: mon. irr.* [I. tab. 58]. Amaracus *Matth:* 487. Mejran *Rudb:* 70.

303. HYSSOPUS foliis oblongis, integris, planis et glabris. Hyssopus officinarum, coerulea, spicata *C. B:* 217. *Tourn:* 200.

—— vulgaris, alba *C. B:* 218. *Tourn:* 201.

—— flore rubro *C. B:* 217. *Tourn:* 201.

—— floribus incanis.

Ultima hæc variatio apud Botanicos annotata non reperitur; a venerando meo Patre charissimo colitur in Stenbrohult Smolandiæ, cum multis aliis plantis raris. Flores hujus etiam minores sunt qvam antecedentium, in reliqvis exacte conveniunt.

Hyssop blå, hwit, röd *Rudb:* 56 och grå.

304. SATUREJA *Riv: mon. irr.* [I. tab. 44]. Satureja [Satureia] sativa *Tourn:* 197. Satureja sativa [Satureia] hortensis, s. Cunila sativa [Plinij] *C. B:* 218. Kyndil *Rudb:* 102. Safwer *Smolandis.*

---

296. M. aqvatica L: Sp. pl. I. 576, II. 805; saknas i Hort. Ups. **297.** M. Pulegium L: Sp. pl. I. 577, II. 807; saknas i Hort. Ups. **298.** M. sativa L: Sp. pl. II. 805; saknas i Hort. Ups. och Sp. pl. I. **299.** M. officinalis L: Sp. pl.I. 592, II. 827; Hort. Ups. 163. **300.**? Ocimum Basilicum L: Sp. pl. I. 597, II. 833; Hort. Ups. 168. **301.** Ocimum minimum L: Sp. pl. I. 597, II. 833; Hort. Ups. 169. **302.** Origanum Majorana L: Sp. pl. I. 590, II. 825; Hort. Ups. 161. **303.** H. officinalis L: Sp. pl. I. 569, II. 798; Hort. Ups. 162. **304.** S. hortensis L: Sp. pl. I. 568, II. 795; Hort. Ups. 161. 1.

305. LAVENDULA foliis integris. Lavendula [Lavandula] angustifolia *C. B:* 216. *Tourn:* 198. Lavendula *Matth:* 29. Smalbladig Lawendel *Rudb:* 64.

306. LAVENDULA foliis multifidis. Lavendula [Lavandula] folio dissecto *C. B:* 216. *Tourn:* 198. Krussbladig Lawendel *Rudb:* 64.

307. THYMUS vulgaris, folio latiore *Tourn:* 196. Thymus vulgaris, folio latiore, flore purpureo *C. B:* 219.

—— vulg. folio latiore, flore albicante *C. B:* 219. Timian *Rudb:* 100 [110].

308. *ROSMARINUS hortensis, angustiore folio *C. B:* 219 [217]. *Tourn:* 195. Rosmarinus *Riv: mon. irr.* [I. tab. 39]. Rosmarinum coronarium *Matth:* 524. Gemen Rosmarin *Rudb:* 100.

309. MASTICHINA *Boerh:* I. [Ind. alt. pars prima p.] 156. Marum *Riv: mon. irr.* [I. tab. 40]. Marum vulgare s. Clinopodium *Dod:* 270 [271]. Sampsucus s. Marum mastichen redolens *C. B:* 224. Thymbra hispanica, Majoranæ folio *Tourn:* 197.

310. BETONICA *Dod:* 40. *Riv: mon. irr. Tilland.* 203. [p. 9. tab. 35]. *Fl. rubris.* Betonica purpurea *C. B:* 235. *Tourn:* 203. Betonica *Fuchs:* 350.

Fl. albis. Betonica alba *C. B:* 235. *Tourn:* 203. Betonika brun och hwit [wijt] *Rudb:* 18.

D.

311. MARUM *Matth:* 489. Pseudo-Marum *Riv: irr. mon.* [I. tab. 13]. Chamædrys maritima, incana, frutescens, foliis lanceolatis. *Tourn:* 205. Tragoriganum latifolium *C. B:* 145 [223].

312. SCORDIUM *C. B:* 247. *Knaut: meth.* 88. Chamædrys palustris, canescens, s. Scordium officinarum *Tourn:* 205. Swetteört, giftdöda *Rudb:* 104.

313. TRISSAGO (CHAMÆPITHYS) foliis trifidis. Chamæpithys [Chamæpitys] lutea, vulgaris s. folio trifido *C. B:* 249. *Tourn:* 208. Chamæpithys [Chamæpitys] *Riv: mon. irr.* [I. tab. 14]. Chamæ-

---

305. Lavandula Spica L: Sp. pl. I. 572, II. 800; Hort. Ups. 162. 1. **306.** Lavandula multifida L: Sp. pl. I. 572, II. 800; Hort. Ups. 162. 2. **307.** Th: vulgaris *β* L: Sp. pl. I. 591, II. 825; Hort. Ups. 160. 1. **308.** R. officinalis L: Sp. pl. I. 23, II. 33; Hort. Ups. 11. **309.** Thymus Mastichina L: Sp. pl. II. 827; Hort. Ups. 160. **310.** B. officinalis L: Sp. pl. I. 573, II. 810; Hort. Ups. 164. **311.**? Teucrium Marum L: Sp. pl. I. 564, II. 788; Hort. Ups. 159. 3. **312.** Teucrium Scordium L: Sp. pl. I. 565, II. 790; saknas i Hort. Ups. **313.** Teucrium Chamæpitys L: Sp. pl. I. 562, II. 787; Hort. Ups. 160. 4.

pithys [Chamæpitys] prima *Dod:* 46. Ju längre, ju [iu länger, iu] kärare *Rudb:* 18.

Exemp: LABIATÆ *Tournef:* s. VERTICILLATÆ *Raj:* omnes.

TETRANDRIA.

314. DIGITALIS purpurea *Dod:* 169. *Tourn:* 165. Digitalis purpurea, folio aspero *C. B:* 243.

—— flore magno, candido *Tourn:* [165]. Digitalis aspera [alba], flore candido [aspero] *C. B:* 244. Röd och hwijt fingerbor *Rudb:* 38.

315. SCROPHULARIA foliis cordiformibus, obtusis, villosis, irregulariter serratis, petiolis communibus ab alis egredientibus. Scrophularia flore luteo *C. B:* 236. *Prod:* 112. *Tourn:* 166. *Riv: irr. mon.* [I. tab. 107]. Scrophularia annua, folio Lamii, flore luteo *Moris:* II. p. 486. [482.] s. 5. t. 8. f. 2. Lille swijnört *Rudb:* 104.

316. SCROPHULARIA foliis cordiformibus, acutis, glabris, petiolis communibus ab alis egredientibus. Scrophularia folio Urticæ *C. B:* 236 [*Tourn:* 166]. Scrophularia peregrina *Cam. h.* [p. 15] tab. XLIII. Scrophularia flore rubro Camerarii *J. B:* III. B. 422. Fremmande swijnört *Rudb:* 104.

317. ANTIRRHINUM spicatum, calcari destitutum, foliis lanceolatis. Antirrhinum flore albo, oris luteis *Tourn:* 168. Antirrhinum majus, alterum, folio longiore *C. B:* 211. Antirrhinum I. *Tabern:* II. 524. Hwijt kalfnäsa den större *Rudb:* 8.

318. ANTIRRHINUM calcaratum, ramosum, foliis oblongis, flores ex alis demittens. Antirrhinum arvense, minus *C. B:* 212. Linaria pumila, vulgatior, arvensis *Tourn:* 169. Then minsta kalfnäsa *Rudb:* 10.

319. VERBENA communis, coeruleo flore *C. B:* 269. *Tourn:* 200. Verbena [Verbenaca] *Matth:* 667. Jernört, Kyskört *Rudb:* 116.

320. ACANTHUS foliis spinis destitutis. Acanthus sativus s. mollis Virgilii [Vergilii] *C. B:* 283. [383.]. *Tourn:* 176. Acanthus sativus [satiuus] *Dod:* 707. Acanthus lævis, [folia habens pingvia,

---

314. D. purpurea L: Sp. pl. I. 621, II. 866; Hort. Ups. 178. 1. **315.** S. vernalis L: Sp. pl. I. 620, II. 864; Hort. Ups. 177. 2. **316.** S. peregrina L: Sp. pl. I. 621, II. 866; Hort. Ups. 177. 3. **317.** A. majus L: Sp. pl. I. 617, *β*, II. 859; Hort. Ups. 175. 8. **318.** A. minus L: Sp. pl. I. 617, II. 852; saknas i Hort. Ups. **319.** V. officinalis L: Sp. pl. I. 20, II. 29; saknas i Hort. Ups. **320.** A. mollis L: Sp. pl. I. 639, II. 891; Hort. Ups. 181.

lata, nitentia, e viridi nigricantia] *Besl. æst.* [ord.] II. fol. 2. f. 3. Biörnaklor, Biörneram [Biörnerama] *Rudb:* 2.

Exempl. Dodartia, (Dortmanna), Fistularia, Pedicularis, (Odontites), (Crista), Melampyrum, Euphrasia, Chelone, Sqvamaria.

Classis XV. TETRADYNAMIA.

§. HEXANDRIA.

A. *Utero vel ovario subrotundo.*

321. NASTURTIUM erectum, foliis oblongis, laciniatis, *planis.* Nasturtium hortense, vulgatum *C. B:* 103. *Tourn:* 213. Nasturtium hortense *Fuchs:* 362. Nasturtium *Matth:* 394. Krassa *Rudb:* 80.

—— erectum, foliis oblongis, laciniatis, *crispis.* Nasturtium hortense, crispum. *C. B:* 104. *Tourn:* [213]. Kruskrassa *Rudb:* 80.

322. THLASPIDIUM foliis Iberidis *Rupp:* 259. Thlaspidium [Thlaspi] creticum qvibusdam, flore rubente *Tourn:* 213. Thlaspidium [Thlaspi] umbellatum, creticum, Iberidis folio *C. B:* 106. Thlaspi VI [IIII] *Matth:* 395. Draba s. Arabis aut Thlaspi Candiæ *Dod:* 701 [in ed. 1583, p. 713 ed. 1616]. Cretisk penningegräs *Rudb:* 110.

Hanc humanitati S. S. Theol. Doct. Ol. Celsii debeo, qvi ob summum favorem, qvo memet amplexus fuit, plures alias contribuit.

323. COCHLEARIA foliis infimis rotundis, summis oblongis, integris, sinuatis. Cochlearia folio subrotundo *C. B:* 110. *Tourn:* 215. Cochlearia major batavica, subrotundo folio *Moris:* II. p. 308. s. 3. t. 2 [20.] f. 1. Cochlearia *Dod:* 583. *S. Paul:* 206. Leffelkrut, Tysk skiörbiuggegrääs *Rudb:* 32.

324. ARMORACIA *Rivin: apud Rupp.* 77. Cochlearia folio cubitali *Tourn:* 215. Raphanus rusticanus *C. B:* 96. Raphanus sylvestris *Fuchs:* 660. Raphanus rusticanus sive vulgaris *Matth:* 333. Pepparroot *Rudb:* 96.

325. LEPIDIUM foliis ovato-acumnatis, serratis, glabris. Lepidium latifolium *C. B:* 97. *Tourn:* 216. Lepidium *Fuchs:* 484. Bittersaltza.

---

321. Lepidium sativum L: Sp. pl. I. 644, II. 899; Hort. Ups. 183. 1. **322.** Iberis umbellata L: Sp. pl. I. 649, II. 906; Hort. Ups. 184. 2. **323.** C. officinalis L: Sp. pl. I. 647, II. 903; saknas i Hort. Ups. **324.** Cochlearia Armoracia L: Sp. pl. I. 648, II. 904; saknas i Hort. Ups. **325.** L. latifolium L: Sp. pl. I. 644, II. 899; saknas i Hort. Ups.

B. *Utero vel ovario oblongo.*

326. ERUCA maxima, canadensis *Cornut:* 15. *Moris:* II. 230. Herba Doria *Dod:* 141. tantum qvoad figuram.

327. BRASSICA capitata, alba *C. B:* 111. *Tourn:* 219. Brassica capitata, albida *Dod:* 612 [ed. 1583]. Brassica capitata *Matth:* 345. Hwit Hufwudkåål *Rudb:* 18.

328. BRASSICA alba vel viridis *C. B:* 111. Brassica vulgaris, sativa *Dod:* 610 [ed. 1583].

329. BRASSICA capitata, rubra *C. B:* 111. *Dod:* 621 [ed. 1616]. Rödkåål. Blåkåål *Rudb:* 18.

330. BRASSICA sabauda, rugosa *J. B:* II. 829 [828]. Brassica alba, crispa *C. B:* 111. Brassica sabauda *Dod:* 624 [ed. 1616]. Brassica undulata *Renealm:* 131. Safåikåål *Rudb:* 20.

331. BRASSICA cauliflora *C. B:* 111. *Tourn:* 219. *Dod:* 613 [ed. 1583]. Brassica multiflora *J. B:* II. 828. Blomkåål *Rudb:* 20.

332. BRASSICA radice Napi s. non caulescens *Rupp: alt.* 59. Napobrassica *C. B:* 111. *Prod:* 54. Rootkåål *Rudb:* 18.

333. BRASSICA Rapæ caulem gerens *Dod:* 625. [ed. 1616]. Brassica gongylodes *C. B:* 111. Kåål rabi. Brassica caulorapa *Rudb: H.* p. 19. Roofkåål *Rudb: H.* p. 20.

334. BRASSICA fimbriata *C. B:* 112. Brassica tophosa *Tabern. ic.* 401. [*Hist.* II. p. 113]. Brassica sabellica *Renealm:* 134. Riddarkåål.

335. BRASSICA foliis multifidis, *laciniis latioribus.* Brassica selenisia, latifolia *Rupp:* 68. Brassica crispa *Renealm:* 131. Kruuskåål med tunna bladh *Rudb:* 20.

—— . . *laciniis angustissimis.* Brassica selenisia, angustifolia *Rupp:* 68.

Qvod autem hæ Brassicæ diversæ sunt species, vix credere possum, cultura enim multas difformavit. Ex hisce omnibus Brassica gongylodes nostris in hortis rarissima est.

326.?	Brassica Eruca L: Sp. pl. I. 667, II. 932; Hort. Ups. 190. 5.								
327.	Br. oleracea	δ capitata	L: Sp. pl. I. 667, II, 932; H. Ups. 189. 1. δ.						
328.	Br. oler.	β viridis	»	»	»	»	»	»	189. β.
329.	Br. oler.	γ rubra	»	»	»	»	»	»	189. 1. γ.
330.	Br. oler.	ε sabauda	»	»	»	»	»	»	189. 1. ε.
331.	Br. oler.	ι botrytis	»	»	»	»	»	»	189. 1. ϑ.
332.	Br. oler.	$\varkappa$ Napobrassica	»	»	»	»	»	»	189. 1. ι.
333.	Br. oler.	λ gongylodes	»	»	»	»	»	»	189. 1. $\varkappa$.
334.	Br. oler.	ϑ sabellica	»	»	»	»	»	»	189. 1. ξ.
335.	Br. oler.	η selenisia	»	»	»	»	»	»	190. λ.

336. NAPUS sativa, radice alba *C. B:* 95. *Tourn:* 229. Napus *Dod:* 663 [ed. 1583. *Matth:* p. 331.]

337. RAPA sativa, rotunda, radice candida *C. B:* 89. *Tourn:* 228.

—— sativa, oblonga, s. foemina *C. B:* 90. Rofwa *Rudb:* 98.

338. RAPHANUS radice glabra, terra abscondita, *fl. purpurasc.* Raphanus major orbicularis vel rotundus *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Raphanus I. *Matth:* 332. Raphanus s. Radicula sativa [*Dod:* ed. 1583 p. 655, ed. 1616 p. 676]. Raphanus sativus *Fuchs:* 659.

—— . . . . *floribus albis.* Raphanus major, orbicularis vel rotundus, floribus candidis *C. B. T.* Månads Rättika.

339. RAPHANUS radice rugosa. Raphanus niger *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Winter Rätticka.

340. RAPHANUS radice supra terram conspicua. Raphanus niger [minor], oblongus *C. B:* 96. *Tourn:* 229. Raphanus II. *Matth:* 337 [p. 332.] Radicula satiua, minor *Dod:* 655 [ed. 1583 p. 665, ed. 1616 p. 676].

341. HESPERIS caule hispido. Hesperis montana, pallida, odoratissima *C. B:* 202. *Tourn:* 222. Hesperis [odoratissima montana] *Clus: pan.* 334 [333]. Witsioe. Nattfiol. Morgonstierna *Rudb:* 52.

342. HESPERIS caule glabro. *Floribus purpurascentibus.* Hesperis hortensis *C. B:* 202. Hesperis hortensis, flore purpureo *Tourn:* 222. *Moris:* II. p. 251. s. 3. t. 10. f. 1. Hesperis 2:dus *Clus: pan.* 336. [H. altera, pannonica, inodora, silvestris *Clus: pan.* 335].

—— . . *fl. albis.* Hesperis hortensis, flore candido *Tourn:* [222]. Viola hyemalis, flore albo *Tabern:* II. 25.

—— . . *fl. plenis, albis.* Hesperis hortensis, flore pleno, albo *Tourn:* [222]. Winter Fioler *Rudb:* 118.

343. SINAPIS arvensis [SINAPI arvense] præcox, semine nigro *Moris:* II. 216. Rapistrum flore luteo, foliis incisis vel sinuatis *C. B:* 75 [95].

344. SINAPIS [SINAPI] album, siliqva hirsuta, semine albo [& ruffo] *J. B:* [*J. Bauh: Hist.* II. p. 856]. Sinapi Apii folio *C. B:* 99.

345. KEIRIS [LEUCOJUM] foliis acutis, glabris, *fl. simpl.* Leucojum luteum, vulgare *C. B:* 202. *Tourn:* 221. Keiri luteum,

---

336. Brassica Napus *β* L: Sp. pl. I. 666, II. 931; Hort. Ups. 190. 4. **337.** Brassica Rapa L: Sp. pl. I. 666, II. 931; Hort. Ups. 190. 3. **338—340.** R. sativus L: Sp. pl. I. 669, II. 935; Hort. Ups. 188. **341.** H. tristis L: Sp. pl. I. 663, II. 927; Hort. Ups. 187. 1. **342.** H. matronalis L: Sp. pl I. 663, II. 927; Hort. Ups. 188. 2. **343.** S. arvensis L: Sp. pl. I. 668, II. 933; saknas i Hort. Ups. **344.** S. alba L: Sp. pl. I. 191, II. 933; Hort. Ups. 191. **345.** Cheiranthus Cheiri L: Sp. pl. I. 661, II. 924; Hort. Ups. 187. 2.

vulgare *Rupp:* 70. Leucojum aureum *Matth:* 575. Gula Fioler *Rudb:* 64.

—— . . . *fl. plenis.* Leucojum luteum, flore pleno, majus *Tourn:* 222. Leucojum luteum, flore pleno, minus *Tourn:* [222]. Dubbla gula Fioler *Rudb:* 64.

346. KEIRIS [LEUCOJUM] foliis obtusis, incanis. Leucojum hyemale, et diu durans [hiemale diu durans] flore albo, folio viridi & liuido, glabro *J. B:* II. 874.

—— Leucojum incanum majus *C. B:* 200. *Tourn:* [220]. fl. albis.

—— Leucojum purpureum vel rubrum *C. B: T:*

—— Leucojum incanum, majus, coccineum *T: Moris:* II. 250 [p. 240.]

—— Leucojum violaceum *T:*

—— Leucojum incanum, majus, multiplex, flore rubro *C. B: T:*

—— Leucojum incanum, majus,multiplex, fl. purpureo *C. B: T:*

—— Leucojum incanum, majus, multiplex, fl. albo *T:*

—— Leucojum incanum, majus, coccineum, multiplex *Moris:*

Ludna bladiga Fioler af åtskillig färg *Rudb:* 64.

Exempl. A. Subularia, Bursa, Draba, Camelina, Lunaria, Coronopus.
B. Turritis, Dentaria, Sisymbrium, Sophia, Sinapi, Cardamine.

§. OCTANDRIA.

347. *DAPHNE foliis ovali-lanceolatis, floribus petiolo communi insidentibus. Thymelæa Lauri folio, sempervirens s. Laureola mas *Tourn:* 595. Laureola *Dod:* 365. Laureola semper virens, flore viridi, qvibusdam Laureola mas *C. B:* 462. Laureola semper virens, flore luteolo *J. B:* I. 564. Lille tysk Lagerbärsträd, Källerhals [Källarhals] *Rudb:* 64.

In horto *Piperiano.*

In animum habui [Classem] *Polydynamiam* constituere, qvæ in duas divideretur sectiones, qvarum §. 1. DECANDRIAM (: Saxifraga, Oxytriphyllum :) §. 2. DODECANDRIAM (: Salicaria :) sed cum classis hæc admodum fieret, illas ad Class. 10, has ad Cl. 11 amandavi.

Classis XVI. MONODELPHIA.

348. *CITRUS petiolis foliorum cordiformibus. Aurantium acri medulla, vulgare *Tourn:* 620. Aurantia mala *Matth:* 186. Malus

346. Cheiranthus incanus L: Sp. pl. I. 662, II. 924; Hort. Ups. 187. 1. **347.** D. Laureola L: Sp. pl. I. 357, II. 510; Hort. Ups. 94. **348.** C. Aurantium L: Sp. pl. I. 782, II. 1100; Hort. Ups. 236. 2. *α.*

aurantia [Arantia] major *C. B:* 436. Malus aurantia [Anarantia] *Dod:* 780 [ed. 1583, p. 792 in ed. 1616]. Pomerantzträd.

348½. *CITRUS petiolis foliorum marginatis, fructu globoso. Aplesin.

349. *CITRUS petiolis foliorum nudis, simplicibus. Citreum vulgare *Tourn:* 621. Malus medica *C. B:* 435. *Dod:* 779. Citronträd.

350. MALVA mauritanica [mauritiana] *Rupp:* 13. Malva folio Ficus. *Prod:* 137. Altera *C. B:* 315. Alcea rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, nigricante et aspero *Tourn:* 98. Utländsk Kattost.

351. MALVA foliis inferioribus sinuatis, superioribus ad petiolum usq. multifidis. Alcea folio rotundo, laciniato *C. B:* 316. *Tourn:* 97. *Flor. albis.* Alcea vulgaris major, fl. candidiore *C. B:* 316. *Tourn:* 97. *Flor. rubris.* Alcea vulg. maj. fl. ex rubro roseo *C. B: Tourn:* Wälluchtande kattost.

352. MALVA foliorum margine crispo et undulato. Malva foliis crispis *C. B:* 315. *Tourn:* 95. Malva crispa *Dod:* 642 [in ed. 1583, p. 653 in ed. 1616]. *Besl. æst:* [ord.] 6. fol. 9 [fig. I]. Malva mesenterica vulgo. Krus kattost *Rudb:* 70.

MALVÆ character genericus mihi est: calyx duplex, qvorum inferior trifolius; superior autem monophyllus, qvinqvefidus.

353. ALTHÆA Dioscoridis *Breyn: Prod.* II. 12. Althæa Dioscoridis et Plinii *C. B:* 315. *Tourn:* 97. Althæa *Matth:* 600. Althæa, Ibiscus *Dod:* 614 [p. 644 in ed. 1583, p. 655 in ed. 1616]. Gemen Ibisrot heller dubbel kattost *Rudb:* 6.

ALTHÆÆ calyx exterior monophyllus in 9 lacinias divisus, interior monophyllus, qvinqvefidus.

354. ALCEA foliis palmatis. Alcea rosea, hortensis, maxima, folio Ficus, flore luteo *Tourn:* 98. Malva rosea, folio Ficus *C. B:* 315. Ståckroser med handlika blad.

355. ALCEA foliis sinuatis. Malva major [maior] *Matth:* 339. Malva rosea, folio subrotundo *C. B:* 315.

—— . . . . flore ex rubro nigricante *T:* [95].

—— . . . . flore simplici, luteo *T:*

348½. C. Aurantium *β* sinensis L: Sp. pl. I. 783, II. 1101; Hort. Ups. 236. 2. *β*. **349.** C. Medica L: Sp. pl. I. 782, II. 1100; Hort. Ups. 236. 1. **350.** M. mauritiana *β* L: Sp. pl. I. 689, II. 970; Hort. Ups. 200. 3. **351.** M. moschata L: Sp. pl. I. 690, II. 971; Hort. Ups. 202. **352.** M. verticillata *β* crispa L: Sp. pl. I. 689, M. crispa Sp. pl. II. 970; Hort. Ups. 200. 2. **353.** A. officinalis L: Sp. pl. I. 686, II. 966; Hort. Ups. 204. **354.** A. ficifolia L: Sp. pl. I. 687, II. 967; Hort. Ups. 204. 2. **355.** A. rosea L: Sp. pl. I. 687, II. 966; Hort. Ups. 204. 1.

—— . . . . flore candido *T:*
—— . . . . flore pleno, incarnato *T:*
—— . . . . flore pleno, nigricante *T:*
—— . . . . flore pleno, luteo et subluteo *T:*
—— . . . . flore pleno, albo *T:*
Ståckroser. Bonderoser, [Romersk kattost] *Rudb:* 70.
ALCEÆ calyx exterior monophyllus, sexfidus,
interior monophyllus, qvinqvefidus.

356. TRIONUM *Theophr:* BAMMIA *Riv: apud Rupp:* 38. Ketmia vesicaria, vulgaris *Tourn:* 101. Alcea vesicaria *C. B:* 317. *Dod:* 643 [p. 646 in ed. 1583, p. 657 in ed. 1616]. Hypechoum [Hypecoum] *Matth:* 673. Förgängeligheter. Wenedisk Sigmarsört medh blåsor *Rudb:* 4.
BAMMIÆ calyx exterior polyphyllus, duodefidus
interior monophyllus, qvinfidus [qvinqvefidus].

357. *IBISCUS. Malva arborea, veneta dicta, parvo flore *C. B:* 315. Althæa maritima [arborea] veneta *Tourn:* 97. Indianisk höga bondroser *Rudb:* 72.
IBISCUS calyx exterior monophyllus, trifidus
interior monophyllus, qvinqvefidus.

358. *KETMIA Syrorum qvibusdam *C. B:* 316. *Tourn:* 99. Alcea arborescens, syriaca *C. B:* 316. Alcea arborescens, glabra, Ketmia dicta *J. B:* II. 957.

359. *KETMIA aegyptiaca, semine moschato *Tourn:* 100. Alcea aegyptiaca, villosa *C. B:* 317. Althæa aegyptiaca, moschata, Abelmosch dicta *Moris:* II. 533. Dessman fröö *Rudb:* 2. Moscus *offic.*
Æxempl: Abutilon, Malacoides.

Class. XVII. DIDELPHIA.

§. HEXANDRIA. (AEQVALIS).

360. FUMARIA caule simplici, coma integra, *fl. rubris.* Fumaria bulbosa, radice cava, major *C. B:* 143. Flore rubro dilutiore *Tourn:* 422. Fumaria bulbosa *Tilland:* 52. fig. Fumaria altera *Matth:*

---

356. Hibiscus Trionum L: Sp. pl. I. 697, II. 981; Hort. Ups. 206. 6. **357.** Lavatera arborea L: Sp. pl. I. 690, II. 972; Hort. Ups. 202. 1. **358.** Hibiscus syriacus L: Sp. pl. I. 695, II. 978; Hort. Ups. 205. 3. **359.** Hibiscus Abelmoschus L: Sp. pl. I. 696, II. 980; Hort. Ups. 206. 4. **360.** F. bulbosa α cava L: Sp. pl. I. 699, II. 983; saknas i Hort. Ups.

722. Pseudo-fumaria *Riv: irr. tetr.* [II. tac. 198]. Split radice rotunda, cava *Riv: apud Rupp:* 257. Pistolochia *Fuchs:* 91.

—— . . . . *fl. albis.* Fumaria bulbosa, radice cava, maj. flore albo *C. B: T:* Purpurlett Jordröök med löökrötter, lille Hollört *Rudb:* 46.

Has duas varietates in Scania spontaneas observavi.

361. FUMARIA caule simplici, coma laciniata. Fumaria bulbosa, radice solida, calcari et folio cristato *J. B:* III A. 205. Fumaria bulbosa, radice non cava, major *C. B:* 144. *Tourn:* 214 [422]. Brun Jordröök, *Rudb:* 46.

§. DECANDRIA (INÆQVALIS).

362. PHASEOLUS convolvens. Phaseolus vulgaris *Tourn:* 412. Phaseolus *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 155]. Smilax hortensis s. Phaseolus major *C. B:* 339. Turkiska bönor hwijta *Rudb:* 88.

363. PHASEOLUS vulgaris, fructu albo, nigris venis et lituris distincto *Tourn:* 412. Hwitblå spräkluta Turkeska bönor *Rudb:* 88.

364. PHASEOLUS vulgaris, fructu ex rubro et nigro variegato *Tourn:* 412. Indianiska brokuga bönor *Rudb:* 90. [Varietates].

PHASEOLUS non scandens.

365. PHASEOLUS puniceo flore *Tourn:* 414. Phaseolus indicus, flore coccineo s. puniceo *Moris:* II. p. 69. s. 2. t. 5. f. 4. Röda Turkiska bönor *Rudb:* 88.

366. LUPINUS caule subdiviso. Lupinus sativus, flore albo *C. B:* 347. *Tourn:* 392. Lupinus flore albo *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 150]. Lupinus *Matth:* 328. *Tilland* 90. Hwijt Wargböna *Rudb:* 68.

367. LUPINUS caule fulcrato, *fl. coeruleis.* Lupinus angustifolius, coeruleus, elatior *Tourn:* 392. Blå wargböna, bäskböna *Rudb:* 68.

—— . . *floribus luteis.*

367½. LUPINUS sylvestris, flore luteo *C. B:* 348. *Tourn:* 392. Lupinus flore luteo *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 151]. Gul wargböna *Rudb:* 68.

—— . . *fl. purpureis.*

367⅔. LUPINUS sylvestris, purpureo flore, semine rotundo, vario *Tourn:* 392. Lupinus sylvestris, flore coeruleo *C. B:* 348. Wargböna med purpurfärgade blommor.

---

361. F. bulbosa *γ* solida L: Sp. pl. I. 699, II. 983; saknas i Hort. Ups. **362—364.** Ph. vulgaris L: Sp. pl. I. 723, II. 1016; Hort. Ups. 213. 1. **365.** Ph. coccineus L: Sp. pl. I. 724, Ph. vulgaris *β* coccineus Sp. pl. II. 1016; Hort. Ups. 213. 3. **366.** L. albus L: Sp. pl. I. 721, II. 1015; Hort, Ups. 209. 1. **367.** L. angustifolius L: Sp. pl. I. 721, II. 1015; saknas i Hort. Ups. **367½.** L. luteus L: Sp. pl. I. 722, II. 1015; Hort. Ups. 209. 3. **367⅔.** L. varius L: Sp. pl. I. 721, II. 1015; Hort. Ups. 209. 2.

368. FABA major, seminibus albis l. rubris. Faba flore candido, lituris nigris conspicuo *C. B:* 338. *Tourn:* 391. Faba major *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 148].

—— fructu ex purpura nigrescente *Tourn:* 362. Hwita och röda bönor the större *Rudb:* 42.

369. FABA minor, seminibus albis l. rubris. Faba rotunda, oblonga s. cylindracea, minor s. eqvina, alba *Tourn:* 392. Faba minor s. eqvina *C. B:* 338.

—— rotunda obl. s. cylindr. min. s. eqvina nigra *Tourn:* 393 [392]. Hwita och röda [swarta] bönor the mindre *Rudb:* 42.

370. PISUM hortense, majus *C. B:* 343 [342].

—— hort. maj. flore fructuqve variegato *Tourn:* 394. Brokuta stora ärter *Rudb:* 90.

—— hort. [maximum] fructu nigra linea maculato *Tourn:* 394. Prickade ärter *Rudb:* 90.

—— hort. siliqva maxima *Tourn:* Stora ärter *Rudb:* 90.

—— cortice eduli *Tourn:* 394. Pisa sine cortice duriore *C. B:* 343. Pisa leptoloba, qvæ simul cum folliculis comeduntur *Volck:* 335 [333]. Socker ärter *Rudb:* 90.

371. PISUM arvense, fructu viridi *C. B:* 343. *Tourn:* 394. Grön ärter *Rudb:* 90.

—— arvense, fructu albo *Tourn:* 394. Små gemena ärter *Rudb:* 90.

372. LATHYRUS petiolis multifloris, foliis ovalibus. (Lathyrus geminifolius, petiolo ex alis multifloro, foliis ovatis.) Lathyrus arvensis, repens, tuberosus *C. B:* 334 [344]. *Tourn:* 395. Lathyrus arvensis *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 167]. Lathyrus arvensis, radice tuberosa, repente *Moris:* II. p. 51. s. 2. t. 2. f. 1. Pseudo-Apios *Matth:* 785. Apios *Fuchs:* 131. Jordmös, Jordållon, Jordmandlar *Rudb:* 62.

373. LATHYRUS petiolis bifloribus, foliis ovato-acuminatis. (Lathyrus geminifolius petiolo ex alis bifloro.) Lathyrus siculus *Riv: apud Rupp:* 251. Lathyrus distoplatyphyllus, hirsutus, mollis, magno et peramæno flore, odoro. *Comel.* h. rar. [Hort. Amstelod.] T. II. p. 159. fig. 80. [*Boerh.* Ind. alter Hort. Acad. Lugd. Bat. pars alt. p. 42.] Wälluchtande kantärter.

368—369. Vicia Faba L: Sp. pl. I, 737, II. 1039; Hort. Ups. 218. 1. **370.** P. sativum L: Sp. pl. I. 727, II. 1026; Hort. Ups. 215. 1. **371.**? P. arvense L: Sp. pl. I. 727, II. 1027; saknas i Hort. Ups. **372.** L: tuberosus L: Sp. pl. I. 732, II. 1033; Hort. Ups. 216. 1. **373.** L. odoratus α siculus L: Sp. pl. I. 732, II. 1032; Hort. Ups. 216. 4.

374. LATHYRUS petiolis bifloribus, foliis oblongis, acutis. Lathyrus sativus, flore purpureo *C. B:* 344. *Tourn:* 395. Lathyrus flore purpureo *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 170]. Röda kantärter *Rudb:* 62.

375. LATHYRUS foliis alternatim pennatis, petiolis unifloribus. Lathyrus angustissimo folio, americanus, variegatus *C. B:* 344. *Tourn:* 395.

375½. CLYMENUM hispanicum, flore vario, siliqva plana *Tourn:* 396. Kantärter med ojämna skidor.

376. CICER *Brunf: floribus albis.* Cicer sativum, flore candido *C. B:* 347. *Tourn:* 389.

—— *floribus rubris.* Cicer sativum, semine rufo *C. B: T:* [Cicer sativum, flore ex purpura rubescente, semine rubro *C. B:* 347. *Tourn:* 389]. Cicer rubrum *Tilland* 105. Kijkärt *Rudb:* 30.

377. HEDYSARUM clypeatum, flore suaviter rubente *Tourn:* 401. Hedysarum *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 223]. Onobrychis semine clypeato, aspero, major *C. B:* 350. Onobrychis major, perennis, siliculis articulatis, asperis, clypeatis, recta junctis, flore ruberrimo [et albo] *Moris:* II. p. 129. s. 2. t. 2. [11.] f. 7. Horneärter med sköldeskal *Rudb:* 52.

378. ASTRAGALUS luteus, perennis, procumbens, vulgaris s. sylvestris *Moris:* II. 107. *Tourn:* 416. Glycyrrhiza sylvestris, floribus luteo-pallescentibus *C. B:* 352. Widöpen kootört ten mindre med trehörniga skijdor *Rudb:* 14.

379. *COLUTEA *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 145]. *Matth:* 520. *Dod:* 772. *Fuchs:* 446. Colutea vesicaria *C. B:* 396. *Tourn:* 649. Italiansk Senesblad *Rudb:* 32.

380. *COLUTEA aethiopica, flore purpureo *Breyn: Cent.* I. 70. *Tourn:* 650 [649]. Colutea aethiopica *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 146].

381. *CERCIS foliis rotundis. Siliqvastrum *Tourn:* 646 [647]. Siliqva sylvestris, rotundifolia *C. B:* 402. Arbor Judæ. *Dod:* 786 [ed. 1616]. Judeträ *Rudb:* 12.

---

374. L. Cicera L: Sp. pl. I. 730, II. 1030; saknas i Hort. Ups. **375.** L. articulatus L: Sp. pl. I. 731, II. 1031; Hort. Ups. 217. 5. **375½.** L. Clymenum L: Sp. pl. I. 732, II. 1032; Hort. Ups. 217. 6. **376.** C. arietinum L: Sp. pl. I. 738, II. 1040; Hort. Ups. 224. 1. **377.** H. coronarium L: Sp. pl. I. 750, II. 1058; Hort. Ups. 231. 1. **378.** A. glycyphyllos L: Sp. pl. I. 758, II. 1067; saknas i Hort. Ups. **379.** C. arborescens L: Sp. pl. I. 723, II. 1045; Hort. Ups. 228. 1. **380.** C. frutescens L: Sp. pl. I. 723, II. 1045; Hort. Ups. 228. 2. **381.** C. Siliqvastrum L: Sp. pl. I. 374, II. 534; Hort. Ups. 99. 1.

382. *GENISTA juncea *Tourn:* 643. Genista *Matth:* 764. Spartium arborescens, seminibus Lenti similibus *C. B:* 396. Macrolobion *Reneal:* [tab.] 33 [descript. p. 34]. Spanskt Prengräs *Rudb:* 46.

383. *NEPA *Raj.* Genistella spinosa *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 192]. Genistella [aculeata] *Tabern:* II. 184. Genista *Tabern:* ibd. Genista Spartium minus, germanicum *Tourn:* 644 [645]. Genista spinosa minor, germanica *C. B:* 395. Prengräs med taggar *Rudb:* 46.

384. *LABURNUM *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 187]. Cytisus alpinus, latifolius, flore racemoso, pendulo *Tourn:* 648. Anagyris non foetida, major l. alpina *C. B:* 391. Bönträ *Rudb:* 60.

385. *FALCATA frutescens. Falcata incana *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 210]. *Dill: N.* pl. g. 130. Medica [Medicago] trifolia, frutescens, incana *Tourn:* 412. Cytisus incanus, siliqvis falcatis *C. B:* 389. »Cytisus ut existimatur» *Dod:* 559 [ed. 1583]. Getewäpling *Rudb:* 35.

386. FOENUMGRÆCUM sativum *C. B:* 348. *Tourn:* 409. Foenum græcum *Tilland:* 138. Foeno-græcum *Matth:* 317. *Fuchs:* 798. Båkzhorn *Rudb:* 44.

387. TETRAGONOLOBUS *Knaut: meth.* 188. Lotus tetragonolobos, flore ruberrimo [rubro] *Riv: tetr. irr.* [II. tab. 205]. Lotus ruber, siliqva angulosa *C. B:* 332. *Tourn:* 403. Lotus siliqvosa, flore fusco, tetragonolobus *J. B:* II. 358. Klöfwergräs med röd blomma *Rudb:* 68.

388. MELILOTUS caule erecto, floribus in spicas digestis, *fl. luteis.* Melilotus officinarum Germaniæ *C. B:* 331. *Tourn:* 407. Trifolium odoratum s. Melilotus vulgaris, flore luteo *J. B:* II. 370. Gul welucktande klöfwer *Rudb:* 74.

In Scania sponte provenit.

—— . . . . . *fl. albis.* Melilotus officinarum Germaniæ, flore albo *C. B:* 331. *Tourn:* 407. Melilotus siliculis pendentibus, curtis, candida, major *Moris:* II. p. 161. s. 2. t. 16. f. 2. Söt wepling, wellucktande klöfwer *Rudb:* 74.

389. MELILOTUS caule erecto, floribus in capitula digestis. Melilotus major, odorata, violacea *Moris:* II. p. 162. s. 2. t. 16. f. 10. *Tourn:* 409 [407]. Melilotus coerulea *Riv: irr. tetr.* [II. tab. 134].

---

382. Spartium junceum L: Sp. pl. I. 708, II. 995; Hort. Ups. 208. 1. **383.** Genista germanica L: Sp. pl. I. 710, II. 999; saknas i Hort. Ups. **384.** Cytisus Laburnum L: Sp. pl. I. 739, II. 1041; Hort. Ups. 210. **385.** Medicago arborea L: Sp. pl. I. 778, II. 1096; Hort. Ups. 230. 5. **386.** Trigonella Foenum græcum L: Sp. pl. I. 777, II. 1095; Hort. Ups. 229. 2. **387.** Lotus tetragonolobus L: Sp. pl. I. 773, II. 1089; Hort. Ups. 220. 1. **388.** Trifolium Melilotus officinalis L: Sp. pl. I. 765, II. 1089; Hort. Ups. 223. 8. **389.** Trifolium Melilotus coerulea L: Sp. pl. I. 764, II. 1077; Hort. Ups. 223. 7.

Lotus hortensis, odorata [odora] *C. B:* 331. Lotus sylvestris *Matth:* 724. Söt wäpling med blåachtig blomma.

Exempl. Polygala, Papilionaceæ herbæ et arbores *Tourn:* omnes, Ternatea [*Tourn: Act. Paris.* 1706, p. 84].

Classis XVIII. SYNGENESIA.

§. MONOGAMIA. (CONJUGIUM PURUM).

A.

390. TRAGOPOGON foliis integris, glabris, fl. violaceis. Tragopogon purpureo-coeruleum, Porri folio, qvod Artifi vulgo *C. B:* 274. *Tourn:* 477. Tragopogon alterum *Matth:* 380. Bruna Bockskegg *Rudb:* 112.

391. SCORZONERA latifolia, sinuata *C. B:* 275. *Moris:* III. 81. *Tourn:* 476. Ormemörda *Rudb:* 104.

392. PILOSELLA cauliculis repentibus, petiolis multifloris, foliis obtusis. Pilosella indica *Cornut:* 209. Pilosella peregrina, flore saturate-croceo *Rupp:* 196. Pilosella polyclonos, repens, major, [syriaca,] flore amplo, aurantiaco *Moris:* III. p. 78. s. 7. t. 8. f. 7. Hieracium hortense, floribus atropurpurascentibus *C. B:* 128. *Tourn:* 471. *Pont: diss.* [V. p.] 89. Musöron med wäluchtande safransblomma.

393. LACTUCA sativa *C. B:* 122. *Tourn:* 473. Lactuca florescens *Matth:* 371. Gemen salat *Rudb:* 60.

—— capitata *C. B:* 122 [123]. *Tourn:* 473. Hufwud Salat. Hufwud Laktuk.

—— crispa *C. B:* 122 [123]. [crispa laciniata] *Tourn:* 473. Kruus salat *Rudb:* 60. Krus Lachtuk.

394. SONCHUS paludosus, altissimus, hastato folio *Moris:* III. 61. Sonchus tricubitalis, folio cuspidato *Raj: S.* 163. Sonchus asper, arborescens *C. B:* 124. *Tourn:* 474. Afrikanisk miölktistel *Rudb:* 108.

395. CICHORIUM sylvestre *Matth:* 361, *fl. coeruleis.* Cichorium sylv. et officinarum *C. B:* 125. *Tourn:* 479.

---

390. T. porrifolium L: Sp. pl. I. 789, II. 1110; Hort. Ups. 243. 2. **391.** S. hispanica L: Sp. pl. I. 791, II. 1112; Hort. Ups. 242. 1. **392.** Hieracium aurantiacum L: Sp. pl. I. 801, II. 1126; Hort. Ups. 238. 3. **393.** L. sativa L: Sp. pl. I. 795, II. 1118; Hort. Ups. 242. **394.** S. palustris L: Sp. pl. I. 793, II. 1116; Hort. Ups. 244. 1. **395—396.** C. Intybus L: Sp. pl. I. 813, II. 1142; saknas i Hort. Ups.

—— sylvestre, flore albo *C. B:* 126. Blå wägwarda [Guul wägwarda, wil Cichorieört, blåbinke Soolwända] *Rudb:* 30.

In campis Lundensibus sponte proveniunt copiosissime.

396. CICHORIUM sativum *C. B:* 125. *Tourn:* 479. Blå binke. Bincke, Cichorien *Rudb:* 30.

397. CICHORIUM latitolium s. Endivia vulgaris *Tourn:* 479. Intybus sativa, latifolia s. Endivia vulgaris *C. B:* 125. Endivia. Endiwia, wintersalat, lefwertistel *Rudb:* 30.

398. HIERACIUM Dentis leonis folio, flore suaverubente *C. B:* 127. *Tourn:* 469. Chondrilla purpurascens [foetida] *C. B:* [Pin. p.] 130. *Prod:* 68. fig. Purpurlet solhwarfwel, soolwenda *Rudb:* 18 [28].

399. SILYBUM albis maculis notatum, flore purpureo *Vaill: Ac. Reg. Sc.* [Paris] 1719 p. 219. [1718 p. 172]. Carduus albis maculis notatus, vulgaris *C. B:* 381. *Tourn:* 442. Carduus Leucographus *Dod:* 710 [ed. 1583]. Sempertin med brun blomma *Rudb:* 22.

400. CINARA hortensis, foliis non aculeatis *C. B:* 383. *Tourn:* 442. Carduus non aculeatus *Matth:* 454. Ärtskåcker öfwer jorden med otagguge blad.

401. CINARA hortensis, aculeata *C. B:* 383. *Tourn:* 442. Carduus s. Scolymus sativus, spinosus *J. B:* III. A. 48. Ärtskåcker öfwer jorden med taggota blad.

402. CNICUS sqvamis capitulorum in spinas ramosas productis. Cnicus sylvestris, hirsutior s. Carduus benedictus *C. B:* 378. *Tourn:* 450. Carduus luteus, procumbens, sudorificus et amarus *Moris:* III. p. 160. s. 7. t. 34. f. 1. Atractylis hirsutior *Fuchs:* 122. Carduus benedictus *Matth:* 541. *Tilland:* 28. Cardbenedikt tijstel *Rudb:* 22.

403. CNICUS caule erecto, foliis inferioribus laciniatis, superioribus integris, serratis. Cnicus pratensis, Acanthi folio, flore flavescente *Tourn:* 450. Carduus pratensis, latifolius *C. B:* 376. Cirsium acanthoides, pratense, flore ochroleuco *Vaill: Paris.* 38. Cirsium fibrosum, foliis latioribus, divisis, viridibus, floribus albicantibus *Moris:* III. p. 150. s. 7. t. 20 [29. fig. 20]. Tysk Tistell.

---

397. C. Endivia L: Sp. pl. I. 813, II. 1142; Hort. Ups. 247. **398.** Crepis rubra L: Sp. pl. I. 806, II. 1132; Hort. Ups. 239. 2. **399.** Carduus syriacus L: Sp. pl. I. 823, II. 1153; Hort. Ups. 250. 3. **400—401.** Cynara Scolymus L: Sp. pl. I. 827, II. 1159; Hort. Ups. 251. **402.** Cnicus benedictus L: Sp. pl. I. 826; Centurea benedicta L: Sp. pl. II. 1296; Cnicus Hort. Ups. 250. **403.** C. oleraceus L: Sp. pl. I. 826, II. 1156; saknas i Hort. Ups.

404. SPHÆROCEPHALUS radice perenni. Echinopus *Tourn:* 463. Major, fl. candido, staminibus in medio coeruleis *Tourn:* ibd. Carduus sphærocephalus, latifolius, vulgaris *C. B:* 381. Carduus sphærocephalus *Dod:* 710 [ed. 1583]. Tistel båll. Blårund hufwudtistel *Rudb:* 24.

405. CARTHAMUS [CARTAMUS] *Fuchs:* 409, *floribus fulvis.* Carthamus officinarum, flore croceo *Tourn:* 457. Cnicus sativus s. Carthamus officinarum *C. B:* 378. Cnicus s. Carthamus *Dod:* 359 [p. 358 in ed. 1583, p. 362 in ed. 1616]. Cnicus *Matth:* 797. Will safran [Saffran] *Rudb:* 24.

406. SERRATULA foliis pennatim sectis, æqvaliter serratis. Rhaponticoides annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore *Vaill. Act. Reg. Sc.* [Paris] 1718. p. 228 [179.] Crupina Belgarum *Knaut:* 142. *Rupp:* 173. Jacea annua, foliis laciniatis, serratis, purpurascente flore *Tourn:* 444. Chondrilla fol. laciniatis, serratis, purpurascente flore *C. B:* 130. Chondrilla hispanica *Tabern:* I. 469.

407. XERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore *Tourn:* 499. Stoebe *Riv: apud Rupp.* 206. Jacea Oleæ folio, capitulis simplicibus *C. B:* 272. Ptarmica altera [Ptarmice austriaca] *Dod:* 698 [ed. 1583.] Flos æternitatis *Hort.*

408. CHRYSOCOME *Dill. N. pl. g.* 167. Coma aurea, germanica *Boerh:* I. 121. Conyza Linariæ folio *Tourn:* 455. Linaria folioso capitulo, luteo, minor *C. B:* 213. Virga aurea, Linariæ folio, floribus congestis et umbellatim dispositis *Moris* III. p. 125. Krone Lijngräs *Rudb:* 66.

409. PETASITES major et vulgaris *C. B:* 197. *Tourn:* 451. Petasites *S. Paul:* 104. fig. cum flore. Pestilensört, Niekraftroot *Rudb:* 88.

410. ELICHRYSUM perenne, calycibus (argenteis) albis. Elichrysum americanum, latifolium *Tourn:* 453. Gnaphalium latifolium, americanum *C. B:* 263. Helichrysum s. Chrysochome repens, foliis deciduis, flore externe albo, intus flavescente *Moris:* III. p. 88. Wästindiska kattfötter [west indisk katfötter] *Rudb:* 48.

---

404. Echinops sphærocephalus L: Sp. pl, I. 814, II. 1314; Hort. Ups. 248. 1. **405.** Carthamus tinctorius L: Sp. pl. I. 830, II. 1162; Hort. Ups. 251. 1. **406.** Centaurea Crupina L: S. pl. I. 909, II. 1285; Hort. Ups. 271. 4. **407.** X. annuum L: Sp. pl. I. 857, II. 1201; Hort. Ups. 255. **408.** Chrysocoma Linosyris L: Sp. pl. I. 841, II. 1178; saknas i Hort. Ups. **409.** Tussilago Petasites L: Sp. pl. I. 866, II. 1215; saknas i Hort. Ups. **410.** Gnaphalium margaritaceum L: Sp. pl. I. 850, II. 1198; Hort. Ups. 255.

411. ELICHRYSUM orientale *Tourn:* 453. *C. B:* [*Pin.* p.] 264 [Helichryson] *Prod:* 123. Gnaphalium luteum, peregrinum, specioso flore *Volck:* 193. Gyllene kattefötter.

412. ABROTANUM mas, angustifolium, majus *C. B:* 136. *Tourn:* 459. Abrotanum mas *Dod:* 21. Gemen Abrodd *Rudb:* 2.

413. *SANTOLINA foliis teritibus *Tourn:* 460. Abrotanum foemina, foliis teretibus *C. B:* 136. Abrotanum foemina *Matth:* 468. Cyparisk Abrodd *Rudb:* 2.

414. TANACETUM foliis pennatim divisis, crispis. Tanacetum foliis crispis *C. B:* 132. *Tourn:* 461. Krusug Renefana *Rudb:* 108.

415. TANACETUM foliis integris, serratis. Tanacetum hortense, foliis et odore Menthæ *Tourn:* 461. Balsamita major *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. f. 1. *Boerh:* I. 125. *Vaill: Act. Reg. Sc. [Paris.]* 1719 p. 369. Mentha hortensis, corymbifera *C. B:* 226. Swänsk Salwia *Rudb:* 102.

Exempl. A. Picris, Artemisia, Lampsana, Chondrilla, Taraxacum.
B. Absinthium, Conyza, Eupatorium, Senecio, Carduus, Lappa, Carlina, Artemisia.

§. POLYGAMIA. ADULTERIUM SUPERFLUUM. (CONJUGIUM IMPURUM PER SCORTA SUPERFLUA.)

416. JACOBÆA foliis crassis, subtus niveis. Jacobæa maritima *C. B:* 131. *Tourn:* 486. Jacobæa marina s. cinerea [Cineraria] *J. B:* II. 1058. [1056]. Grå Jacobzblomma *Rudb:* 58.

417. JACOBÆA africana, frutescens flore amplo, purpureo, elegantissimo, Senecionis folio *Volck:* 225 fig. et descr. Jacobæa africana, annua, minor, Senecionis folio, flore purpureo [floribus suave rubentibus] *Volck:* 225. fig. Jacobsblomma med purpurblomor.

418. SOLIDAGO foliis serratis, floribus in umbellam congestis. Solidago sarracenica [saracenica] *Dod:* 141. Jacobæa alpina, foliis longioribus, serratis *Tourn:* 485. Virga aurea angustifolia, serrata *C. B:* 268. Doria [altera] *Dill: N. pl. gen.* 144. Herdespö med kronor.

---

411. Gnaphalium orientale L: Sp. pl. I. 853, II. 1195; Hort. Ups. 256. 3. **412.** Artemisia Abrotanum L: Sp. pl. I. 845, II. 1185; Hort. Ups. 257. 2. **413.** S. Chamæ Cyparissus L: Sp. I. 842, II. 1179; Hort. Ups. 252. 1. **414.** T. vulgare β crispum L: Sp. pl I. 845, II. 1184; saknas i Hort. Ups. **415.** T. Balsamita L: Sp. pl. I. 845, II. 1184; Hort. Ups. 255. **416.** Othonna maritima L: Sp. pl. I. 925; Cineraria maritima L: Sp. pl. II. 1244; Othonna L: Hort. Ups. 273. 2. **417.** Senecio elegans L: Sp. pl. I. 869, II. 1218; Hort. Ups. 260. 2. **418.** Senecio sarracenicus L: Sp. pl. I. 871; S. sarracenicus L: Sp. pl. II. 1221; Hort. Ups. 260. 1.

Solidaginis vocabulum, ad evitandum nomen genericum Virgæ aureæ, recipio, cujus species genuina etiam recensita planta est, ut unicuiqve inspiciente facile patebit.

419. SOLIDAGO foliis integris, floribus homomallis. Virga aurea mexicana *C. B:* 154 [App. 517] descr. Virga aurea, Limonii folio, panicula uno versu disposita *Tourn:* 484. Mexikanisk herdespö.

420. AMELLUS foliis lanceolatis, scabris, ternis utrinqve crenis communiter notatis. Amellus *Virg:* Aster atticus, coeruleus, vulgaris *C. B:* 267. *Tourn:* 481. *Pont. Diss:* [IX. pag.] 226. *Virgilius: Georg.* L. IV. v. 271.

Est etiam flos in pratis, cui nomen amello
Fecere agricolæ; facilis quærentibus herba:
Namque uno ingentem tollit de cespite silvam
Aureus ipse: sed in foliis, qvæ plurima circum
Funduntur, violæ sublucet purpura nigræ.

420½. AMELLUS disci floris diametro longitudinem radii bis superante. Aster pratensis, autumnalis, Conyzæ folio *Tourn:* 488. Conyza media, Asteris flore luteo, l. tertia Dioscoridis *C. B:* 265. Conyza media Matthioli, flore magno, luteo, humidis locis proveniens *J. B:* II. 1050. Conyza media *Dod:* 52. Krislogräs med stor blomma.

421. HELENIUM officinarum *Rupp:* 163. Helenium vulgare *C. B:* 276. Aster omnium maximus, Helenium dictus *Tourn:* 483. Enula campana *Till:* 136. Ålandzroot, lineroot, Alunaroot *Rudb:* 40.

422. ASTER perennis, foliis lanceolatis, serotinus. Aster virginianus, angustifolius, serotinus, parvo, albente flore *Rupp:* 168. Aster serotinus, procerior, ramosus, Bellidis sylvestris flore *Tourn:* 482.

423. ASTER annuus, foliis inferioribus latioribus, crenis qvibusdam instructis, superioribus integris. Aster ramosus, annuus, canadensis *Tourn:* 482. Bellis ramosa, umbellifera *Cornut:* 193 [fig. in p. 194].

424. ANTHEMIS. Chamæmelum nobile s. Leucanthemum odoratius *C. B:* 135. *Tourn:* 494. Chamæmelum odoratum *Dod:* 259 [ed. 1583]. Romersk Chamilleblomma *Rudb:* 88. Sötblomster.

—— nobile, flore multiplici *C. B:* 135. *Tourn:* 494. Chamæmelum romanum, flore multiplici *Tabern:* I. 156. [p. 56]. Romersk dubbel kamilleblomma.

---

419. S. mexicana L: Sp. pl. I. 879, II. 1234; saknas i Hort. Ups. **420.** Aster Amellus L: Sp. pl. I. 873, II. 1226; saknas i Hort. Ups. **420½.** Inula dysenterica L: Sp. pl. I. 882, II. 1237; saknas i Hort. Ups. **421.** Inula Helenium L: Sp. pl. I. 881, II. 1236; saknas i Hort. Ups. **422.** A. tradescanti L: Sp. pl. I. 876, II. 1230; Hort. Ups. 262. 2. **423.** A. annuus L: Sp. pl. I. 875, II. 1229; Hort. Ups. 262. 1. **424.** Anthemis nobilis L: Sp. pl. I. 894, II. 1260; saknas i Hort. Ups.

425. MATRICARIA vulgaris s. sativa *C. B:* 133. *Tourn:* 493. Matram, Modergräs *Rudb:* 72.

—— foliis florum fistulosis *Tourn:* 493. Matricaria latifolia, petalis fistulosis, simplex *Moris:* III. p. 32. s. 6. t. 6. f. 10. Matram med mångdubbel blomma *Rudb:* 72.

426. BELLIS caule nudo, uniflora, *fl. simplici.* Bellis sylvestris, minor *C. B:* 261. *Tourn:* 491. Bellis minor *Matth:* 393 [p. 593]. Den mindre Marieblomma *Rudb:* 16.

In Scania prope Lundinum in campis et vallibus copiose.

—— . . . *fl. pleno, albo:* Bellis hortensis, flore pleno eoqve magno, albo *Tourn:* 491. Hwit dubbla Mariblomma den mindre*Rudb:* 16.

—— . . . *fl. pleno, incarnato.* Bellis hortensis, pleno flore eoqve magno, incarnato *Tourn.* Bellis hortensis *Dod:* [ed. 1583 p. 265, ed. 1616 p. 265].

—— . . . *floris radio fistuloso.* Bellis hortensis, rubra, flore multiplici, fistuloso *Tourn:* 491. Tusenskiön.

427. PTARMICA foliis integris, lanceolatis, serratis, fl. simplicibus. Ptarmica vulgaris, folio longo, serrato, fl. albo *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis, serrato folio *C. B:* 98. Dracunculus pratensis, viridis s. Ptarmica vulgaris, folio serrato *Moris:* III. p. 40. s. 6. t. 12. f. 1. Nysegräs *Rudb:* 94.

In Scania sponte provenit.

—— . . . . *floribus plenis.* Ptarmica vulgaris, pleno flore *Tourn:* 496. Dracunculus pratensis, flore pleno *C. B:* 98. Nysegräs med dubbla blommor *Rudb:* 96.

428. CHRYSANTHEMUM folio minus secto, glauco. *Tourn:* 492. Bellis lutea, foliis profunde incisis, major *C. B:* 262. Solsicker.

In Scania inter segetes sponte floret.

429. CHRYSANTHEMUM foliis Matricariæ *C. B:* 134. *Tourn:* 491. Chrysanthemum majus, folio valde laciniato, flore croceo *J. B:* II. [III. A.] 104. Chrysanthemum majus, folio profundius laciniato, magno flore *C. B:* 134. *Tourn:* 491.

—— flore partim candido, partim luteo *C. B:* [134]. *Tourn:* 192 [492].

—— flore pleno, partim candido, partim luteo *C. B: Tourn.* Gullblomma.

---

425. M. Parthenium L: Sp. pl. I. 890, II. 1255; Hort. Ups. 263. **426.** B perennis L: Sp. pl. I. 886, II. 1248; Hort. Ups. 265. **427.** Achillea Ptarmica L: Sp. pl. I. 898, II. 1266; Hort. Ups. 265. 1. **428.** Chr. segetum L: Sp. pl. I. 889, II. 1254; saknas i Hort. Ups. **429.** Chr. coronarium L: Sp. pl. I. 890, II. 1254; Hort. Ups. 263.

430. DIMORPHOTHECA foliis incisis, ovariis minoribus *Vaill: Act. Reg. Sc.* [*Paris* 1720 p. 280. tab. 9. fig. 21 & 22]. Calendula humilis africana, flore intus albo, extus [floris] violaceo, simplici *H. L. B.* [p. 104] c. figura [p. 105]. Caltha africana, flore intus albo, extus [floris] violaceo *Tourn:* 499. Tijdwäxlan. Dag och natt.

431. CALENDULA *Dod:* 254 [ed. 1616], *flor. simplicibus.* Caltha vulgaris, flore pallido *C. B:* 275. *Tourn:* 498.

—— *floribus plenis.* Caltha polyanthos, major *C. B: T.* Caltha polyanthos, maxima *C. B: T.*

—— *floribus proliferis.* Caltha prolifera, minoribus floribus *C. B. T.* Calendula prolifera *Tilland* 146. Ringblomma.

432. TAGETES caule subdiviso, *flor. simplicibus.* Tagetes indicus minor, simplici flore, s. Caryophyllus indicus s. Flos africanus *Tourn:* 488. Tanacetum africanum s. Flos africanus minor *C. B.* 133. Flos africanus *Dod:* 254 [in ed. 1583, p. 255 in ed. 1616].

—— . . *flor. plenis.* Tagetes indicus minor, multiplicato flore *Tourn.* Små bruna Samets blomer.

433. TAGETES caule fulcrato, *fl. simplicibus.* Tagetes maximus rectus, flore simplici ex luteo-pallido *Tourn:* 488. Tanacetum africanum majus, simplici flore *C. B.* 133.

—— . . *fl. plenis.* Tagetes maximus, rectus, flore maximo, multiplicato *Tourn.* Tanacetum s. flos africanus major, flore pleno *C. B:* 132. Caryophyllus indicus, major *Matth:* 430.

—— . . *radio tubulato.* Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso *Tourn:* [489]. Tanacetum s. Flos mexicanus, flore fistuloso [simplici] *C. B.*

—— . . radio et disco tubuloso. Tagetes indicus, flore fistuloso, duplicato *Tourn:* 489. Stora gula samets blomor af åtskillig art.

Exemp: Arnica, Tussilago, Buphthalmum.

§. POLYGAMIA. ADULTERIUM FRUSTRANEUM. (CONJUGIUM IMPURUM FRUSTRANEUM.)

434. HELIANTHUS (SOLSEQVIUM) floribus plurimis, nutantibus. (Corona multiflora, nutante flore.) Sol [annuus] amplissimo, nutante flore *Rupp:* 104 [154]. Corona solis II *Tabern: Icon:* 763

---

430. Calendula pluvialis L: Sp. pl. I. 921, II. 1304; Hort. Ups. 274. 2. **431.** C. officinalis L: Sp. pl. I. 921, II. 1304; Hort. Ups. 274. 1. **432.** T. patula L: Sp. pl. I. 887, II. 1249; Hort. Ups. 267. 1. **434.** T. erecta L: Sp. pl. I. 887, II. 1249; Hort. Ups. 267. 2. **435.** H. annuus L: Sp. pl. I. 904, II. 1276; Hort. Ups. 268. 1.

[*Hist.* II. p. 442]. *Tourn:* 489. Helenium indicum, maximum *C. B:* 276. Chrysanthemum indicum, annuum, maximum, ramosum, s. Flos solis major, ramosus *Moris:* III. p. 19. s. 6. t. 6. f. 37. Soolblomma. Soolkrona *Rudb:* 44.

435. HELIANTHUS (SOLSEQVIUM) pumilus. (Corona pumila.) Corona solis minor, foemina *Tabern:* II. 443. *Tourn:* 489. Helenium indicum, minus *C. B:* 277.

436. HELIANTHUS (SOLSEQVIUM) tuberosus. *[Adonis Stenbrohultensis.]* (Corona radice tuberosa.) Sol altissimus, radice tuberosa, esculenta *Rupp:* 155. Corona solis, parvo flore, tuberosa radice. *Tourn:* 489. Helenium [Helianthemum] indicum, tuberosum *C. B:* 276 [277]. Chrysanthemum perenne, majus, foliis integris, americanum, tuberosum *Moris:* III. p. 23. s. 6. t. 7. f. 59. [tab. 6. fig. 57]. Ärtskåcker under jorden.

Raro imo rarissime flores hisce in oris profert, unicam tantum mense Novembri 1727 Lundini florentem observavi.

437. RUDBECKIA foliis divisis, laciniis foliorum latioribus. Corona solis, foliis amplioribus, laciniatis *Tourn:* 490. Doronicum americanum, laciniato folio *C. B:* [App. p.] 516. Chrysanthemum americanum, perenne, foliis divisis, dilute [dilutius] virentibus, majus *Moris:* III. p. 22. s. 6. t. 6. f. 52 [53]. Obeliscotheca Hydrophylli folio, lobis latioribus. *Vaill: Act. Reg. Sc.* [*Paris*] 1720 p. 426.

RUDBECKIA est plantæ genus flore radiato sive composito ex flosculis et tubulatis planis simul.

Perianthium e gemino ordine foliorum sibi incumbente constat, qvorum qvisqve sex communiter foliis instruitur iisqve obtusis.

Radius 12 plerumqve flosculis planis, ligulatis, pistilloqve destitutis, embryone abortiente impositis componitur.

Disci ipsius flosculi tubulati, qvinqvefidi, androgyni sunt.

Semina disci flosculis succedunt, paralele qvadragona, oblonga, apice levi margine membranaceo coronata; radii autem flosculi semina nulla producunt.

Placenta pyramidalis, sqvamulis deciduis, singulis seminibus subjectis et interpositis, instructa est.

Tornefortius eam ad CORONAM SOLIS (: mihi SOLSEQVIUM l. HELIANTHUS :) refert, a qva, ut facie externa et viribus, ita etiam partibus fere omnibus generatione assignatis, differt, ut HELIANTHI l. SOLSEQVII.

435.? H. multiflorus L: Sp. pl. I. 905, II. 1277; Hort. Ups. 268. 2. **436.** H. tuberosus L: Sp. pl. I. 905, II. 1277; Hort. Ups. 268. 3. **437.** R. laciniata L: Sp. pl. I. 906, II. 1279; Hort. Ups. 269. 1.

Perianthium sqvamis innumeris, in acutum desinentibus, componitur.

Flosculi tubulati ventriculo ampliato omnibus sui classis generibus diversi evadunt.

Radius flosculis planis, innumeris instruitur.

Semina obliqve-qvadrangularia s. compresso-qvadragona sunt, corona membranacea destituta.

Placenta plana s. potius concava.

Generi huic novo a Sene Venerabili, Botanico Excellenti, Nobilissimo ac Generosissimo D:no Doct. Olavo Rudbeck Filio in Acad. Upsaliensi Botanices Professore Publico, nomen indere volui; nec non a Beato Patre ejusdem nominis et muneris. Qvi qvantum Botanicen locupletarunt, patet e *Parentis Horto Upsaliensi; Filii* autem *Diss. de Fundamentali pl. notitia*, peregrinatione in Laponiam historiæ naturalis ergo suscepta, *Itinere laponico* tom. 12, qvorum 11 periere, *Catal. pl. laponicarum* rariorum in Act. Lit. Svec. 1720 exhibito, nec non *utriusqve* vastissimo opere Botanico *Camporum Elysæorum*, qvorum tomi 10 ab incendio ferali Upsaliensi consumti sunt, relictis tantum duobus.

438. CYANUS foliis inferioribus dentatis, superioribus integris, annuus, floribus maxime varians.

—— segetum, atropurpurascente flore *Vaill:* [*Act. Reg. Sc. Paris.* 1718 pag. 184 spec.] 4.

—— segetum, flore rubro *Tourn:* 446.

—— segetum, disco coeruleo cum corona candida *Tourn:* 446.

—— segetum, disco carneo cum corona candida *Tourn:* 446.

—— segetum, flore albo *C. B:* 273. *Tourn:* 446. Klint, kornbloma af åtskillig färg *Rudb:* 34.

439. CYANUS foliis omnibus laciniatis, *floribus luteis.* Cyanus floridus, odoratus, turcicus s. orientalis major, flore luteo *Tourn:* 446. Amberboi flore luteo, odorato *Vaill: Act. Reg. Sc.* [*Paris.*] 1719 p. 230. [1718 p. 181.]. Turkisk dessmans kornblomma purpurlett *Rudb:* 34.

—— . . *fl. coeruleis.* Cyanus florid. odorat. turcicus s. orient. major, flore [coeruleo] purpureo [incarnato] *Tourn:* [446]. Turkisk dessmans kornblomma *Rudb:* 34.

440. CYANUS foliis integris, perennis. Cyanus montanus, latifolius vel Verbasculum Cyanoides *C. B:* 273. *Tourn:* 445. Cyanus

438. Centaurea Cyanus L: Sp. pl. I. 911. II. 1289; saknas i Hort. Ups.
439. Centaurea moschata L: Sp. pl. I. 909, II. 1286, Hort. Ups. 271. 5.
440. Centaurea montana L: Sp. pl. I. 911, II. 1289; Hort. Ups. 270. 1.

major *Dod:* 250 [ed. 1583]. Cyanus montanus, perennis, latifolius, flore grandi *Moris:* III. [pag. 134.] s. 7. t. 25. f. 1. Winterblåklint medh breda bladh *Rudb:* 34.

Exemp: Jacea.

§. POLYGAMIA. ADULTERIUM NECESSARIUM. (CONJUGIUM IMPURUM NECESSARIUM.)

441. TARCHUM (TARCHON) foliis integris. Abrotanum Lini folio, acriore & odorato *Tourn:* 459. Draco [Dracunculus] hortensis. *C. B:* 98. Draco herba [*Dod:* ed. 1616 p. 709. Taracon seu Tarchon] *Moris:* III. p. 3. s. 6. t. 1. Dragoncellus *Matth:* 410.

[Dragnællus i Ifwetofta ex.]

Drakaört, Draguner, Kungz salat *Rudb:* 38.

442. TARCHUM (TARCHON) foliis multifidis. Absinthium ponticum, tenuifolium, incanum *C. B:* 138. *Tourn:* 457. Absinthium tenuifolium *Dod:* 24. Absinthium ponticum *Matth:* 465. Romersk Malört. Matckieört *Rudb:* 2.

Class. XIX. GYNANDRIA.

§. DIANDRIA.

Exemp: Orchis, Satyrium, Serapias, Calceolus, Ophris.

§. PENTANDRIA.

443. APOCYNUM erectum, foliis ovalibus. Apocynum erectum, latifolium, incanum, syriacum, floribus parvis, obsolete-purpurascentibus *Tourn:* 91. Apocynum [latifolium] syriacum, incanum, floribus umbellatis, minoribus, obsolete-purpurascentibus, siliqvis folliculatis, rugosis. *Herm: H. L. B.* 53 [52]. Apocynum medium, peregrinum, flore umbellato ex obsoleto dilute-purpurascente, petalis reflexis [*Breyn: Prod.* p. 2.] *Moris:* III. p. 69 [609] §. 2 descr. Flugsnara *Rudb:* 16. [Bechium s. Tussilago *Rudb:* 15].

[Obs. Till Pentandria Digynia i Ifwetofta ex.]

Muscæ carnivoræ et alia insecta anelytra infirmiora cum ex hujus floribus mel colligunt, jucundo sane spectaculo, pedibus foramini ipsius pistilli implicatis tenentur, ut aufugere nequeant.

---

441. Artemisia Dracunculus L: Sp. pl. I. 849, II. 1189; Hort. Ups. 256.
442. Artemisia pontica L: Sp. pl. I. 847, II. 1187; Hort. Ups. 257. 3.
443. Asclepias syriaca L: Sp. pl. I. 214, II. 313; Hort. Ups. 53. 2.

444. CRASSA Rivini *Rupp:* 26. Apocynum humile [aizoides], siliqvis erectis, africanum [*Herm:*] *H: L. B.* [p. 52. fig. in p. 53]. Asclepias africana, aizoides *Tourn:* 94. Fritillaria crassa promontorii Bonæ Spei *Stapel.* 335. Apsyn *Rudb: Hort.* p. 10.

[Pentandria Dig. i Ifwetofta ex.]

Exemp: Asclepias.

§. HEXANDRIA.

445. ARISTOLOCHIA clematitis recta *C. B:* 307. *Tourn:* 162. *Moris:* III. p. 509. s. 12. t. 7. [17.] f. 5. Aristolochia multiflora *Riv: mon. irr.* [I. tab. 116]. Aristolochia saracenica *Dod:* 324. [ed. 1583]. Hålört medh löpande rötter *Rudb:* 12.

446. ACORUS petalodes, foliis ancipitibus. Acorus verus s. Calamus aromaticus officinarum *C. B:* 34. Acorum legitimum *Clus: Pan.* 258 [sine iulo] et 259 [cum suo iulo]. Typha aromatica, clava rugosa *Moris:* III. 246. [s. 8. t. 13. f. 4.]. Kalmus *Rudb:* 4.

[Hexandria Monog. i Ifwetofta ex.].

§. POLYANDRIA.

447. ARUM vulgare. *C. B:* 195 Arum vulgare non maculatum *Tourn:* 158. Arum. *Riv: mon. irr.* [I. tab. 124.] *Fuchs:* 69. Aronsrot *Rudb:* 12.

Flos Ari, ab omnibus in universum plantis diversus et singularis, non levem botanicorum admirationem in se contraxit. Hinc est qvod tantum a doctissimis et sane principibus nostris Botanicis fuerit examinatus, adhuc tamen, qvantum constat, nemo finem propositi obtinuit. Opere itaqve pretium duxi meam de eodem flore addere sententiam et explicationem.

Membrana ita *auriformis*, a qvibusdam pro calyce, ab aliis pro petalo habita, est calycis species, qvæ mihi (: *Fund. Bot.*) dicitur *Spatha*, a qva nil differt.

Corpus clavæforme, in medio positum, communi consensu Botanicorum pro pistillo habitum, est *placenta*, producta in clavam coloratam, nudam.

Filamenta, tuberculis imposita, pro staminibus habita, esse *embryones* monstrosos auguror.

---

444. Stapelia variegata L: Sp. pl. I. 217, II. 316; Hort. Ups. 53. **445.** A. clematitis L: Sp. pl. I. 962, 1364; Hort. Ups. 279. **446.** A. Calamus *α* vulgaris L: Sp. pl. I. 324, II. 562; saknas i Hort. Ups. **447.** A. maculatum L: Sp. pl. I. 966, II. 1370; Hort. Ups. 279.

Curiosum igitur hic ex ordine inverso *apices* intra embryones collocantur, contrario ac in aliis situ.

Referendum adeoqve est Arum ad consortium Palmarum, cumqve iis classe, non vero genere conjungendum.

Class. XX. MONOECIA.

§. TRIANDRIA.

448. MAYS spicis seminiferis, simplicibus. Mays granis aureis *Tourn:* 531. *Mont:* 23. Frumentum indicum, Mays dictum *C. B:* 25. Frumentum indicum *Matth:* 305. Turcicum frumentum *Fuchs:* 825. Turkisk hwete, Säd af Indien *Rudb:* 46.

Exemp: Carex, Cyperoides.

§. TETRANDRIA.

449. *BUXUS arborescens *C. B:* 471. *Tourn:* 578. Buxus *Dod:* 782 [ed. 1616]. *Matth:* 151. *S. Paul.* 34. Stor Buxbom.

450. *BUXUS foliis rotundioribus *C. B:* 471. *Tourn:* 578 [579]. Chamæpyxos *Tabern:* III. 141. Buxboom *Rudb:* 20.

—— . . margine foliorum lutea. Buxus minor, foliis per limbum aureis *Tourn:* 579. Buxboom med gyllende blad. *Rudb:* 20.

451. URTICA fructu in globos sphæricos digesto. Urtica pilulifera, folio profundius Urticæ majoris in modum serrato, semine magno Lini *Raj: S.* 140. Urtica urens pilulas ferens, I Dioscoridis, semine Lini *C. B:* 232. *Tourn:* 535. Urtica urens prior *Dod:* 151. Urtica romana *Fuchs:* 106. Urtica prima *Matth:* 707. Romersk Näsla, Welsk näsla med iskuren blan *Rudb:* 120.

Exemp: Alnus.

§. PENTANDRIA.

452. AMARANTHUS (spiris florum) spicis ad terram usque propendentibus. Amaranthus maximus, semine rubello, qvi granis rubris Petri Ciccæ [Ciecæ] *C. B:* 121. *Tourn:* 235. Blitum paniculis

---

448. Zea Mays L: Sp. pl. I. 971, II. 1378; Hort. Ups. 281. **449—450.** B. sempervirens L: Sp. pl. I. 983, II. 1394; Hort. Ups. 283. **451.** Urtica pilulifera L: Sp. pl. I. 983, II. 1395; Hort. Ups. 282. 2. **452.** A. caudatus L. Sp. pl. I. 990, II. 406; Hort. Ups. 285.

propendentibus, semine rubro. *Volck:* [*Volckamer* p.] 66. Rödh kiärlekzblomma med hengiande swans *Rudb:* 6.

452½. AMARANTHUS folio variegato, colore hilariori, qvæ foemina *C. B:* [121]. *Tourn:* 236. Symphonia Dalechampio s. Amaranthus tricolor *J. B:* II. 970. Trifärgat kärlekzblomma *Rudb:* 6.

§. OCTANDRIA.

Exemp: Myriophyllum, Ceratophyllum.

§. ENNEANDRIA.

Exemp: Morsus Ranæ *Dill:* secund Auctorit.

§. DECANDRIA.

Exemp: Coriaria, Betula.

§. POLYANDRIA (MONODELPHIA).

453. RICINUS vulgaris *Tourn:* 532. *C. B:* 432. Ricinus *Matth:* 771. *Fuchs:* 340. Underträ. Jonæ Kurbitz.

454. *PINUS sativa *C. B:* 491. *Tourn:* 585. Utländsk tall.

Exemp: Qvercus, Sagittaria, Abies, Typha, Sparganium.

§. ADELPHIA. (POLYDELPHIA).

455. CUCUMIS sativus vulgaris, maturo fructu subluteo *C. B:* 310. *Tourn:* 104. Cucumis vulgaris *Dod:* [ed. 1583 p.] 651. Gurkor *Rudb:* 34.

456. MELO vulgaris *C. B:* 310. *Tourn:* 104. Melo s. Melopepo vulgaris [vulgo], Cucumis Galeni *Dod:* [ed. 1683. p.] 652. Meloner *Rudb:* 34.

457. PEPO oblongus *C. B:* 311. *Tourn:* 105. Pepo major, oblongus *Dod:* [ed. 1583. p.] 654. Pompa.

452½. A. tricolor L: Sp. pl. I. 989, II. 1403; Hort. Ups. 286. 3. **453.** R. communis L: Sp. pl. I. 1007, II. 1430; Hort. Ups. 289. **454.** P. Pinea L: Sp. pl. I. 1000, II. 1419; Hort. Ups. 288. **455.** C. sativus L: Sp. pl. I. 1012, II. 1437; Hort. Ups. 292. 1. **456.** Cucumis Melo L: Sp. pl. I. 1011, II. 1436; Hort. Ups. 292. 2. **457.** Cucurbita Pepo β L: Sp. pl, I. 1010, II. 1435; Hort. Ups. 291. 2.

458. CUCURBITA longa, folio molli, flore albo *J. B:* II. 214. *Tourn:* 107. Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli *C. B:* 313. Flaskepumpor af Indien *Rudb:* 34.

459. ANGURIA Citrullus dicta *C. B:* 312. *Tourn:* 106. Anguria, Cucumis, Citrullus *Dod:* [ed. 1616 p.] 664. Wattumeloner *Rudb:* 30.

460. MOMORDICA vulgaris *Tourn:* 103. Balsamina *Matth:* 97 [793]. Balsamina rotundifolia, repens s. mas *C. B:* 306. Balsamört han *Rudb:* 16.

461. BRYONIA aspera s. alba, baccis nigris *C. B:* 297. *Tourn:* 102. Bryonia alba, baccis nigris *S. Paul:* 30. Vitis alba *Matth:* 791. Hundekurbis med swarta bäär, Moderläkia *Rudb:* 20.

In Scania sponte in sepibus, ubiqve prope Londinum.

Flores masculini a foemininis in eadem planta remoti sunt, qvidqvid alii contradicunt, qvi in diversa pronunciant.

Exemp: Bromelia, Luffa.

§. SYNGENESIA.

Exemp: Xanthium, Ambrosia.

Class. XXI. DIOECIA.

§. TRIANDRIA.

Exemp: Blitum, Empetrum, Cyperoides.

§. TETRANDRIA.

462. *MORUS foliis integris, hispidis, *mas et foemina.* Morus fructu nigro *C. B:* 459. *Tourn:* 589. Norus *Matth:* 207. Mulbärsträ *Rudb:* 76.

463. *MORUS foliis laciniatis, glabris, *mas.* Morus fructu nigro, minori, foliis eleganter laciniatis *Tourn:* 589. Mulbärsträ med glatta blan.

---

458. C. lagenaria L: Sp. pl. I. 1010, II. 1434; Hort. Ups. 291. 1. **459.** Cucurbita Citrullus L: Sp. pl. I. 1010, II. 1435; Hort. Ups. 292. **460.** M. Balsamina L: Sp. pl. I. 1009, II. 1433; Hort. Ups. 293. 1. **461.** B. alba L: Sp. pl. I. 1012, II. 1438; saknas i Hort. Ups. **462—463.** M. nigra L: Sp. pl. I. 986, II. 1398; Hort. Ups. 283. 1.

464. *LENTISCUS vulgaris *C. B:* 392 [399]. *Tourn:* 580. Lentiscus *Matth:* 94. *Dod:* [ed. 1583. p.] 859. Mastickträd.

Exemp: Gale, Urtica.

§. PENTANDRIA.

465. SPINACIA *mas.* Spinacia vulgaris sterilis *Tourn:* 533. Lapathum hortense s. Spinacia sterilis *C. B:* 115.

—— *foemina*, fructu aculeato. Spinacia vulgaris, capsula seminis aculeata *Tourn:* Lapathum hortense s. Spinacia, semine spinoso *C. B:* [114]. Lapathum hortense *Munt: Brit.* p. 263 [203] fol. 59.

—— *foemina*, fructu obtuso. Spinacia vulgaris, capsula seminis non aculeata *Tourn.* Lapathum hortense s. Spinacia, semine non spinoso *C. B:* [115] Spinacki *Rudb:* 108. Spinat.

466. CANNABIS *mas.* Cannabis foemina *J. B:* III. [B.] 447. Cannabis erratica *C. B:* 320. *Tourn:* 535. Cannabis sativa *Fuchs:* 393. Galrings hamp.

—— *foemina.* Cannabis mas *J. B:* III. [B.] 447. Cannabis sativa *C. B:* [320]. *Tourn:* [535]. Frö hamp.

467. LUPULUS *mas.* Lupulus foemina *C. B:* 298. *Tourn:* 535. Gullhumble, fröhumble.

—— *foemina*, strobilis albis. Lupus salictarius *Fuchs:* 164. Convolvulus perennis, heteroclitus, floribus herbaceis, capsulis foliaceis, strobili instar *Moris:* II. p. 37. Hwithumbla.

—— *mas* et *foemina*, strobilis ruffescentibus. Rödhumbla.

Variatio hæc strobilos minores, sed copiosiores, segniusqve maturescentes profert.

§. HEXANDRIA.

468. ACETOSA foliis oblongis, basi aperta. Acetosa hispanica, maxima *Munt: brit.* 225. fol. 213. Acetosa montana, maxima *C. B:* 114. *Tourn:* 502. Spansk Syra. Ab hac cultura tantum differre puto Acetosam pratensem *C. B:* 114.

---

464. Pistacia Lentiscus L: Sp. pl. I. 1026, II. 1455; Hort. Ups. 296. 2. **465.** S. oleracea L: Sp. pl. I. 1027, II. 1456; Hort. Ups. 296. **466.** C. sativa L: Sp. pl. I. 1027, II. 1457; Hort. Ups. 297. **467.** Humulus Lupulus L: Sp. pl. I. 1028, II. 1457; saknas i Hort. Ups. **468.** Rumex Acetosa ♂ L: Sp. pl. I. 338, II. 481; Hort. Ups. 90. 6.

§. OCTANDRIA.

469. *LAURUS vulgaris *C. B:* 460. *Tourn:* 597. Laurus mas et foemina *Tabern:* ic. 90. Smalbladigt Lagerbärsträ *Rudb:* 64.

470. *LAURUS latifolia *mas et foemina Tabern:* III. 44. Laurus latifolia *πλατυτέρα* Dioscoridis *C. B:* 460. Gement Lagerbärsträ *Rudb:* 64.

471. *LAURUS vulgaris, folio undulato *Tourn:* 597, *mas. et foemina.* Lager med blad krusade i brädden.

472. *POPULUS foliis (laciniatis) sinuatis, *mas et foemina.* Populus alba, majoribus foliis *C. B:* 429. *Tourn:* 592. Populus alba *Matth:* 115. Popelträ *Rudb:* 92.

473. *POPULUS foliis rhombo similibus, *mas et foemina.* Populus nigra *C. B:* 429. *Tourn:* 592. *Matth:* 116. Asp med fyrkantiga blad.

§. DECANDRIA.

Exemp: Lychnides nonnullæ.

§. DODECANDRIA.

474. MERCURIALIS foliis integris, caule ramoso, *mas.* Mercurialis spicata s. foemina Dioscoridis et Plinii *C. B:* 121. *Tourn:* 534. Mercurialis foemina *S. Paul:* 293.

—— . . . . *foemina.* Mercurialis testiculata s: mas Dioscoridis et Plinii *C. B:* 121. *Tourn:* 534. Mercurialis mas *S. Paul:* 292. Cynocrambe *Fuchs:* 444. Bingulgräs, Mercurs-gräs *Rudb:* 76.

475. MERCURIALIS foliis integris, caule simplici, *mas.* Mercurialis montana, spicata *C. B:* 122. *Tourn:* 534. Mercurialis sylvestris foemina *Tabern:* II. 256. Mercurialis foemina *Fuchs:* 476.

—— . . . . *foemina.* Mercurialis montana, testiculata *C. B. Tourn.* Mercurialis sylvestris, mas *Fuchs:* 475. Cynocrambe *Matth:* 798. Skogs bingulgräs. Skogz Bingelgräs *Rudb:* 76.

§. POLYANDRIA.

476. *JUNIPERUS foliis sibi ad basin incumbentibus, *mas.* Sabina folio Tamarisci [Dioscoridis] *C. B:* 487. Sabina sine baccis *Matth:* 107.

469—471. L. nobilis L: Sp. pl. I. 369, II. 529; Hort. Ups. 98. **472.** P. alba L: Sp. pl. I. 1034, II. 1463; saknas i Hort. Ups. **473.** P. nigra L: Sp. pl. I. 1034, II. 1464; saknas i Hort. Ups. **474.** M. annua L: Sp. pl. I. 1035, II. 1465; Hort. Ups. 298. **475.** M. perennis L: Sp. pl. I. 1035, II. 1465; saknas i Hort. Ups. **476.** J. Sabina L: Sp. pl. I. 1039, II. 1472; Hort. Ups. 299. 1.

*—— . . . . . *foemina.* Sabina folio Cupressi *C. B:* 487. Sabina baccifera *Matth:* 107. Säfwenbom, Hiemna *Rudb:* 102.

Class. XXII. MOECHEA.

§. MONOECIA.

A. *Adulteri.*

477. *CORYLUS sativa, fructu albo, minore s. vulgaris *C. B:* 417. *Tourn:* 581. Lambertiskt Hassel.

478. VERATRUM flore subviridi *Tourn:* 273. Helleborus albus, flore subviridi *C. B:* 186 *Moris:* III. p. 485. s. 12. t. 4. f. 1. Elleborum album *Matth:* 755. Hwit Niuseört, Prustroot *Rudb:* 40.

B. *Scorta.*

479. ATRIPLEX erecta, foliis triangularibus, pallide-virens. Atriplex hortensis alba s. pallide-virens *C. B:* 119. *Tourn:* 505.

—— . . . rufescens. Atriplex hortensis rubra *C. B: Tourn:* Trägårdszmolla hwit och röd *Rudb:* 14.

480. PARIETARIA perennis, foliis acuminatis. Parietaria officinarum & Dioscoridis *C. B:* 121. *Tourn:* 509. Parietaria *Dod:* 102. *Tabern:* II. 253. Dag ock Natt *Rudb:* Hort. p. 86. S. Pers ört.

Ex fide *Pontederæ* huc refertur.

§. DIOECIA.

Exemp: Fraxinus, Ornus.

Class. XXIII. CRYPTOGAMIA.

§. MONOECIA TRIANDRIA.

481. *FICUS humilis *C. B:* 457. *Tourn:* 663. *Dill: N. pl. g. app.* 163, ubi character. Ficus *Matth:* 221 [211]. Små Fikonträd.

---

477. C. Avellana β L: Sp. pl. I. 999, II. 1417; Hort. Ups. 286. **478.** V. album L: Sp. pl. I. 1044, II. 1479; saknas i Hort. Ups. **479.** A. hortensis L: Sp. pl. I. 1053, II. 1493; Hort. Ups. 303. 1. **480.** P. officinalis L: Sp. pl. I. 1052, II. 1492; Hort. Ups. 302. **481—482.** F. Carica L: Sp. pl. I. 1059, II. 1513; Hort. Ups. 305.

482. *FICUS communis *C. B:* 457. Ficus *J. B:* I. [A.] 128. Stora fikonträd.

§. **DORSIFERÆ** *Raj:*

Exemp: Osmunda, Ophioglossum, Filix, Polypodium, Dryopteris, Hemionitis, Phyllitis, Lonchitis, Adianthum, Trichomanes, Muraria (Eqvisetum).

§. **MUSCI** *Dill:*

Exemp: Lycopodium, Fontinalis, Sphagnum, Jungermannia, Hypnum, Bryum, Mnium, Polytrichum, Lichen, Conferva.

§. **FUNGI** *Dill:*

Exemp: Byssus, Clavaria, Merulius, Boletus, Amanita, Peziza, Coniplea, Agaricus.

Seqvuntur plantæ nonnullæ, qvarum flores examini autoptico proprio subjicere etiamnum mihi non fuit occasio.

APPENDIX.

483. *RIPHES foliis glabris, petiolis spinosis. Chamæriphes tricarpos, spinosa, folio flabelliformi *Pont: Anth.* [lib. II. cap. XX. tab. VIII]. Chamæriphes *Dod:* 820 [ed. 1616]. Palma minor *C. B:* 506. Palma humilis dactylifera, radice repente, sobolifera, folio flabelliformi, petiolo spinoso *Boerh:* II. 169. Litet Palmträd.

In Horto Ulricksdahl.

484. ANANAS aculeatus, fructu ovato, carne albida *Tourn:* 653. Carduus brasilianus, foliis Aloës *C. B:* 384. Kapa-Thakka [Kapátsjakka *H. Mal.* Tom. 11. f. 1. [& 2. pag. 1—6]. Ananas Acostæ *J. B:* III [A. p.] 95. Ananas Comel: *H. rar.* Tom. I. p. 109. f. 57.

In Horto Ulriksdahl floruit mense Majo 1729 et fructum maturavit Octobri, curante Hortulano curioso nomine Wolmero.

485. MELOCACTUS americana, minor *Boerh:* [Ind. alt. pars 2:da pag.] 83. Melocactus minor & lactescens. *Rupp:* alt. 41. Melo-

---

483. Chamærops humilis L: Sp. pl. I. 1187, II. 1657; saknas i Hort. Ups. **484.** Bromelia Ananas L: Sp. pl. I. 285, II. 408; Hort. Ups. 73. 1. **485.**? Cactus mammillaris L: Sp. pl. I. 466, II. 666; Hort. Ups. 119. 1.

carduus mammillaris, minimus, sessilis, uberior, spinulis imbecillioribus donatus *Moris:* II [III p.] 171.

Hæ tres plantæ, nostris in oris rarissimæ, cum Cereo, Aizoo, Crassa etc. conspiciuntur in Horto instructissimo Ulriksdahl.

486. *PUNICA, qvæ Malum Granatum fert *Tourn·* 636. Malus punica sativa *C. B:* 438. Granat äplen *Rudb:* 72.

487. *PALIURUS *Dod:* 756 [ed. 1616]. *Tourn:* 616. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso *C. B:* 477. Rhamnus s. Paliurus folio Jujubino *J. B:* I. [B.] 35. Christi Törnerijs *Rudb:* 84.

In Horto *Piperiano.*

488. *JUGLANS foliis pennatis, integris. Juglans *Fuchs:* 379. Nux juglans s. regia vulgaris *C. B:* 417. *Tourn:* 581. Nux juglans. *Matth:* 202. Wallnötträ *Rudb:* 80. (ad Monoeciam).

489. FAGUS flosculis masculinis in (capitula cylindracea digestis) cylindra. Castanea sativa *C. B:* 418. *Tourn:* 584. Kastanie trä. Castanieträ *Rudb:* 26 (ad Monoeciam).

490. *FAGUS floribus masculinis in (capitula globosa collectis) globulos digestis. Fagus *Dod:* 832 [ed. 1616]. *C. B:* 419. *Tourn:* 584. *Matth:* 160. Böök *Rudb:* 42 (ad Mon.).

In Smolandia et Scania vastissimas constituit sylvas, heic tantum in hortis conspicitur.

491. *CARPINUS *Matth:* 122. *Dod:* 829 [ed. 1583]. *Tourn:* 583 [582]. Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis *C. B:* 427. Aceris cognata, foliis oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedentibus; vasculis disjunctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis oppositis, plurimis, [pluribus], confertis *Pluk: Alm.* 7. Hagböök. Afwenbook. (Monoec.)

492. *OLEA sativa *C. B:* 472. *Matth:* 157. Olieträ. Olioträ *Rudb:* 82.

493. *ELÆAGNUS orientalis, angustifolius, fructu parvo, oliveæformi, subdulci *Tourn: Coroll:* 53. Eleagnus [Eleagnos] *Camer: Ep.* [pag.] 106. fig. Olea sylvestris, folio molli, incano *C. B:* 472. Skogz Olioträ *Rudb:* 82.

---

486. Punica Granatum L: Sp. pl. I. 472, II. 676; Hort. Ups. 122. **487.** Rhamnus Paliurus L: Sp. pl. I. 194, II. 281; Hort. Ups. 46. **488.** J. regia L: Sp. pl. I. 997, II. 1415; Hort Ups. 286. **489.** F. Castanea *β* L: Sp. pl. I. 997, II. 1416; Hort. Ups. 287. **490.** F. sylvatica L: Sp. pl. I. 998, II. 1416; saknas i Hort. Ups. **491.** C. Betulus L: Sp. pl. I. 998, II. 1416; saknas i Hort. Ups. **492.** O. europæa L: Sp. pl. I. 8, II. 11; saknas i Hort. Ups. **493.** E. angustifolia L: Sp. pl. I. 121, II. 176; Hort. Ups. 31.

494. *CUPRESSUS ramos extra se spargens, qvæ mas Plinii *Tourn*: 587. Cupressus *Matth:* [103].

495. *CUPRESSUS meta in fastigium convoluta, qvæ foemina Plinii *Tourn:* 587. Cupressus *Dod:* [ed. 1616 p.] 856. Cypräs, Cypres *Rudb:* 36.

496. *CEDRUS folio Cupressi, major, fructu flavescente *C. B:* 487. *Tourn:* 588. Oxycedrus lycia *Dod:* [ed. 1616 p.] 853. Cederträ.

497. *THUYA Theophrasti *C. B:* 488. *Tourn:* 587. Arbor vitæ s. Paradisiaca vulgo dicta, [odorata,] ad Sabinam accedens. *J. B:* I. [B.] 286. Liffzens trä *Rudb:* 12.

498. DRYMOPOGON Rivini *Rupp:* alt. 99. Barba capræ, floribus oblongis *C. B:* 163. *Tourn:* 265. Drymopogon primum *Tabern:* I. 458. Barba capri *Fuchs:* 181.

499. ANEMONOIDES nemorosa, trifolia *Vaill:* 12. Ranunculus nemorosus, trifolius *Tourn: Inst.* [t. I. p.] 285. Anemone trifolia, flore albo *J. B:* III. [B.] p. 412.

S. D. G.

494—495. C. sempervirens L: Sp. pl. I. 1002, II. 1422; Hort. Ups. 288.
496. Juniperus phoenicea L: Sp. pl. I. 1040, II. 1471; saknas i Hort. Ups.
497. Thuja occidentalis L: Sp. pl. I. 1002, II. 1421; Hort. Ups. 289. 1.
498. Spiræa Aruncus L: Sp. pl. I. 490, II. 702; saknas i Hort. Ups.
499. Anemone trifolia L: Sp, pr. I. 540, II. 762; Hort. Ups. 155.

17 SEP 1923
- 9 NOV 1923
22 MAR 1925
- 3 NOV 1925
20 JUN 1927
19 Dec

Regler för hemlån ur

Kalmar Stads Bibliotek.

№ 1090. 15:-

1. Låntagare skall vara bosatt inom Kalmar stad och om så fordras, lämna godkänd borgen för hemlån. För barn under 15 år fordras föräldrars eller målsmans skriftliga medgivande.

2. Samtidigt få högst tre böcker hemlånas, därav två skönlitterära. De senare återlämnas inom *två* veckor, övriga inom *fyra* veckor. Förnyelse av lån får ske *en* gång mot uppvisande av låntagen bok.

3. Återställas ej lånade böcker inom föreskriven tid, erlägges i böter 5 öre pr band och dag.

4. Böckerna skola behandlas aktsamt. Anteckningar, understrykningar och vikningar betraktas som skada och ersättas efter bibliotekariens värdering.

5. Bortkommen eller i defekt skick återställd bok ersättes med fulla värdet.

6. Vägran att erlägga böter och skadeersättning medför förlust av lånerätt.

7. Böckerna få ej av låntagare utlånas till annan person.

8. Ombyte av låntagares bostad skall genast anmälas.

9. Vid fall av smittosam sjukdom i låntagares hem, skola böckerna omedelbart återställas, och anmälan om sjukdomsfallet göras.

Åtvidabergs Snickerifabriks Kortsystem.

J.E. Bourghardt & Son
·Bokbinderi·
Stockholm

Carl von Linnés

Ungdomsskrifter